

## 1. Heti gyakorlathoz feladatok és megoldások

**2.1.** Mi az

$$y' = \frac{y}{x}$$

egyenlet általános és egy partikuláris megoldása?

**2.2.** Oldjuk meg az

$$y' = e^{x+y}$$

szétválasztható változójú differenciálegyenletet.

**2.3.** A radioaktív bomlás során a sugárzó anyag  $y(t)$  mennyisége arányos az anyag csökkenésének gyorsaságával. Írjuk fel a folyamatot leíró differenciálegyenletet. Határozzuk meg az arányossági tényezőt, ha az anyag felezési ideje 100 (másodperc), azaz ennyi idő múlva éppen fele annyi sugárzó anyag van, mint kezdetben. Mi lesz az  $y(t)$  függvény alakja, ha kezdetben 1 (kilogramm) volt anyagunkból?

**2.4.** Határozzuk meg az

$$y' = \frac{e^x}{y+1} \quad ; \quad y(0) = -4$$

Cauchy-feladat megoldását.

**2.5.** Közegben (pl. víz, levegő) nagyobb sebességgel haladó magára hagyott test sebességének négyzetével arányos módon lassul. Milyen görbe szerint alakul sebesség-idő grafikonja?

**2.6.** Keressük meg az

$$y' = \frac{1 + 2e^y}{e^y x \ln(x)}$$

szétválasztható változójú egyenlet általános és egy partikuláris megoldását.

**2.7.** Oldjuk meg az

$$(e^{-2y} - e^{-y})y' = \frac{e^{x-y} + e^{-x-y}}{e^y + 1}$$

ijesztő alakú egyenletet.

**2.8.** Oldjuk meg az

$$x + y - xy' = 0 \quad ; \quad y(1) = 1$$

változóban homogén kezdetiérték-feladatot (Cauchy-problémát).

**2.9.** Keressük meg az

$$xe^{y/x} + y = xy'$$

egyenlet összes megoldását.

**2.10.** Mely  $y(x)$  függvényekre igaz az

$$xy' = y(\ln(y) - \ln(x))$$

változóban homogén differenciálegyenlet?

**2.1. eredménye:**  $y = 0$  minden  $x$ -re, vagy  $y = \pm e^C x$ , ahol  $C$  konstans. Egy partikuláris megoldása például  $y = -3x$  amikor a mínusz érvényes és  $C = \ln(3)$ .

**2.2. eredménye:**  $y = -\ln(-e^x - C)$ , ahol  $C < 0$  konstans. A megoldás adott  $C$  mellett csak ott értelmezett, ahol  $-e^x - C > 0$  azaz  $x < \ln(-C)$ .

**2.3. megoldása:** A differenciálegyenlet

$$-\frac{dy}{dt} = Ay \quad ,$$

hiszen bal oldalon áll az anyag csökkenésének sebessége, jobb oldalon a mennyisége,  $A$  az arányossági tényező. Ez egy egyszerű szétválasztható egyenlet. "Átrendezve" és integrálva

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{y} &= -A \int dt \\ \ln(|y|) &= -At + C \quad (C \text{ konstans}) \\ y &= \pm e^C e^{-At} \quad , \end{aligned}$$

de persze csak a plusz eset azaz  $y > 0$  megoldás releváns. Mi lesz  $A$  értéke? A felezési idő értéke és definíciója szerint

$$\begin{aligned} y(100) &= \frac{1}{2}y(0) \\ e^C e^{-100A} &= \frac{1}{2}e^C \\ -100A &= \ln\left(\frac{1}{2}\right) \\ A &= \frac{\ln(2)}{100} \quad . \end{aligned}$$

A kezdeti  $y(0) = 1$  (kilogramm) feltétellel a feladat Cauchy-problémává vált.  $e^C e^{-A \cdot 0} = 1$  miatt  $e^C = 1$ ,  $C = 0$ , így ezzel a feltétellel az

$$y(t) = e^{-At} = e^{-(\ln(2)/100)t}$$

függvény írja le a sugárzó anyag mennyiségét.

**2.4. megoldása:** Az egyenletet átírva

$$\begin{aligned} \int (y+1) dy &= \int e^x dx \\ \frac{y^2}{2} + y &= e^x + C \end{aligned}$$

másodfokú egyenletre jutunk, melynek megoldása

$$y(x) = -1 \pm \sqrt{1 + 2(e^x + C)} \quad ,$$

a kezdeti feltétel szerint

$$y(0) = -1 \pm \sqrt{1 + 2C} = -4$$

tehát a megoldásban a mínusz érvényes, és  $C = 3$ . Ezzel a megoldás

$$y(x) = -1 - \sqrt{7 + 2e^x} \ .$$

**2.5. eredménye:** A felírható egyenlet

$$-\frac{dv}{dt} = A v^2$$

( $A > 0$  konstans), megoldása

$$v = \frac{1}{At + C} \ .$$

**2.6. megoldása:** A szétválasztható egyenletet átrendezve és integrálva

$$\int \frac{e^y}{1 + 2e^y} dy = \int \frac{1}{x \ln(x)} dx \ .$$

Az  $u = e^y$  és  $v = \ln(x)$  helyettesítéssel

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{1 + 2u} &= \int \frac{1}{v} dv \\ \frac{1}{2} \ln(1 + 2u) &= \ln(|v|) + C \\ \ln(1 + 2u) &= \ln(v^2) + 2C \\ u &= \frac{1}{2} (e^{2C} v^2 - 1) \\ y = \ln(u) &= \ln(e^{2C} (\ln x)^2 - 1) - \ln(2) \end{aligned}$$

az általános megoldás (olyan  $x > 0$ -ra, hogy  $(e^{2C} (\ln x)^2 - 1) > 0$  teljesüljön). Egy partikuláris megoldás a  $C = 2$  eset, ekkor

$$y = \ln(e^4 (\ln x)^2 - 1) - \ln(2) \ .$$

**2.7. eredménye:**  $y = \operatorname{arch}\left(\operatorname{sh}(x) + \frac{C}{2}\right)$  adott  $C$  konstans mellett ott, ahol  $\left(\operatorname{sh}(x) + \frac{C}{2}\right) \geq 1$ .

**2.8. eredménye:** Az egyenlet általános megoldása ( $u = \frac{y}{x}$ ) helyettesítéssel  $y = x \ln(|x| + C) = x \ln|x| + Cx$ , melyet az  $y(1) = 1$  kezdetiérték-feltételhez igazítva  $C = 1$ , így a Cauchy-feladat megoldása  $y = x \ln|x| + x$ .

**2.9. eredménye:** Szintén az előbbi helyettesítéssel  $y = -x \ln(-\ln|x| - C)$ , ahol  $x$  és  $C$  közti összefüggés olyan, hogy  $-\ln|x| - C > 0$ , azaz  $|x| < e^{-C}$ ,  $C > 0$ .

**2.10. megoldása:** Az egyenletet átírva és  $u = \frac{y}{x}$ -et majd  $z = \ln(u)$ -t helyettesítve ( $x, y > 0$ )

$$\begin{aligned} xy' &= y \ln\left(\frac{y}{x}\right) \\ y' &= u \ln(u) \\ u'x + u &= u \ln(u) \\ \int \frac{du}{u \ln(u) - u} &= \int \frac{dx}{x} \\ \int \frac{dz}{z - 1} &= \int \frac{dx}{x} \\ \ln(|z - 1|) &= \ln(x) + C \\ |z - 1| &= e^C x \ . \end{aligned}$$

Ha  $z > 1$  azaz  $y > e \cdot x$ , akkor

$$y = ux = e^z x = e^{e^C x + 1} x ,$$

míg  $y < e \cdot x$  esetén

$$y = ux = e^z x = e^{-e^C x + 1} x .$$

Ezek a megoldások előbb felírt feltételeiket magukban foglalják. Vizsgálatinkból kimaradt az  $u = e$  azaz  $y = e \cdot x$  eset (a negyedik sorban osztottunk olyan taggal, amely nullát ad ebben az esetben), mely szintén megoldása az egyenletnek.