

$$s_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2, \quad s_n^{*2} = \frac{n}{n-1} s_n^2, \quad \hat{r} = \frac{\bar{xy} - \bar{x}\bar{y}}{s_X s_Y}$$

$$y = ax + b \text{ lineáris regresszió: } \hat{a} = \hat{r} \frac{s_Y}{s_X} = \frac{\bar{xy} - \bar{x}\bar{y}}{s_X^2}, \quad \hat{b} = \bar{y} - \hat{a} \cdot \bar{x}.$$

u-próba:

$$\text{Kétoldali, egymintás: } u = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \quad u_{\varepsilon/2} = \Phi^{-1}(1 - \varepsilon/2)$$

$$\text{konfidenciaintervallum } \mu\text{-re: } \left[\bar{x} - u_{\varepsilon/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{\varepsilon/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\text{Egyoldali, egymintás: } u = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \quad u_{\varepsilon} = \Phi^{-1}(1 - \varepsilon)$$

$$\text{Kétoldali, kétmintás: } u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \quad u_{\varepsilon/2} = \Phi^{-1}(1 - \varepsilon/2)$$

$$\text{Egyoldali, kétmintás: } u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \quad u_{\varepsilon} = \Phi^{-1}(1 - \varepsilon)$$

t-próba:

$$\text{Kétoldali, egymintás: } t = \frac{\bar{x} - \mu}{s_n^*} \sqrt{n}$$

$$t_{\varepsilon/2} = a t_{n-1} \text{ eloszlás } 1 - \varepsilon/2\text{-kvantilise}$$

$$\text{konfidenciaintervallum } \mu\text{-re: } \left[\bar{x} - t_{\varepsilon/2} \frac{s_n^*}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\varepsilon/2} \frac{s_n^*}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\text{Egyoldali, egymintás: } t = \frac{\bar{x} - \mu}{s_n^*} \sqrt{n},$$

$$t_{\varepsilon} = a t_{n-1} \text{ eloszlás } 1 - \varepsilon\text{-kvantilise}$$

$$\text{Kétoldali, kétmintás: } t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^{*2} + (n_2-1)s_2^{*2}}{n_1+n_2-2}}} \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$$

$$t_{\varepsilon/2} = a t_{n_1+n_2-2} \text{ eloszlás } 1 - \varepsilon/2\text{-kvantilise}$$

$$\text{Egyoldali, kétmintás: } t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^{*2} + (n_2-1)s_2^{*2}}{n_1+n_2-2}}} \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$$

$$t_{\varepsilon} = a t_{n_1+n_2-2} \text{ eloszlás } 1 - \varepsilon\text{-kvantilise}$$

χ^2 -próba:

Illeszkedésvizsgálat:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i} \text{ összehasonlítva } \chi_{r-1} \text{-eloszlás } (1 - \varepsilon)\text{-kvantilisével}$$

Homogenitásvizsgálat:

$$\chi^2 = nm \sum_{i=1}^r \frac{\left(\frac{\nu_i}{n} - \frac{\mu_i}{m}\right)^2}{\nu_i + \mu_i} \text{ összehasonlítva } \chi_{r-1} \text{-eloszlás } (1 - \varepsilon)\text{-kvantilisével}$$

Függetlenségvizsgálat:

$$\chi^2 = n \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(\nu_{ij} - \frac{\nu_i \cdot \nu_{\cdot j}}{n})^2}{\nu_i \cdot \nu_{\cdot j}} \text{ összehasonlítva } \chi_{(r-1)(s-1)} \text{-eloszlás } (1 - \varepsilon)\text{-kvantilisével}$$

Welch:

$$t' = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{s_X^{*2}}{n_1} + \frac{s_Y^{*2}}{n_2}}}, \quad c = \frac{s_X^{*2}/n_1}{s_X^{*2}/n_1 + s_Y^{*2}/n_2}, \quad \frac{1}{f} = \frac{c^2}{n_1 - 1} + \frac{(1 - c)^2}{n_2 - 1}$$

$$\mathfrak{X}_{\varepsilon} = \{(\underline{x}, \underline{y}) : |t'(\underline{x}, \underline{y})| \geq t_{\varepsilon/2}(f)\} \quad 2\text{-oldali}$$

$$\mathfrak{X}_{\varepsilon} = \{(\underline{x}, \underline{y}) : t'(\underline{x}, \underline{y}) \geq t_{\varepsilon}(f)\} \quad 1\text{-oldali}$$