

Feladatok és megoldások a 13. hétre
Építőkar Matematika A3

1. Az alábbi függvények melyike lehet eloszlásfüggvény?

$$(a) F(x) = \begin{cases} 1 + e^{1-x} & , \text{ ha } x > -1, \\ 0 & , \text{ egyébként} \end{cases}$$

$$(b) F(x) = \begin{cases} 2 - \frac{2}{x+1} & , \text{ ha } x \geq 0, \\ 0 & , \text{ egyébként} \end{cases}$$

$$(c) F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & , \text{ ha } x \geq 0, \\ 0 & , \text{ egyébként} \end{cases}$$

$$(d) F(x) = \begin{cases} 0 & , \text{ ha } x \leq 0, \\ \frac{x}{4} \cdot (4 - x) & , \text{ ha } 0 < x \leq 2, \\ 1 & , \text{ ha } x > 2 \end{cases}$$

2. Az alábbi függvények melyike lehet sűrűségfüggvény?

$$(a) f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x} & , \text{ ha } x > 1, \\ 0 & , \text{ egyébként} \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{2} & , \text{ ha } 0 < x < 2, \\ 0 & , \text{ egyébként} \end{cases}$$

$$(c) f(x) = \begin{cases} 3^{x-1} \ln(3) & , \text{ ha } x \leq 0, \\ \frac{1}{3} \sin\left(\frac{x}{2}\right) & , \text{ ha } 0 < x < \pi, \\ 0 & , \text{ egyébként} \end{cases}$$

$$(d) f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & , \text{ ha } x > 0, \\ 0 & , \text{ egyébként} \end{cases}$$

3. Számítsuk ki az

$$f(x) = \begin{cases} 2x & , \text{ ha } 0 < x < 1, \\ 0 & , \text{ egyébként} \end{cases}$$

sűrűségfüggvényt követő X valószínűségi változó várható értékét és szórását.

4. Mennyi az előző feladatban a $\mathbb{P}\{m - \sigma < X < m + \sigma\}$ illetve a $\mathbb{P}\{m - 2\sigma < X < m + 2\sigma\}$ valószínűségek értéke, ha m jelöli a várható értéket és σ jelöli a szórását?

5. Tekintsük az

$$f(x) = \begin{cases} c(2x - x^3) & , \text{ ha } 0 < x < \frac{5}{2}, \\ 0 & , \text{ egyébként} \end{cases}$$

függvényt. Lehet-e f sűrűségfüggvény? Ha igen, milyen c érték esetén?

Ismételjük meg a vizsgálatot az

$$f(x) = \begin{cases} c(2x - x^2) & , \text{ ha } 0 < x < \frac{5}{2}, \\ 0 & , \text{ egyébként} \end{cases}$$

függvényre.

6. Egy benzinkút hetente egyszer kap benzint. Hogy ha a heti eladás (ezer literben mérve) egy valószínűségi változó

$$f(x) = \begin{cases} 5(1 - x)^4 & , \text{ ha } 0 < x < 1, \\ 0 & , \text{ egyébként} \end{cases}$$

sűrűségfüggvénnyel, akkor mekkora méretű tartály szükséges ahhoz, hogy egy adott héten a benzinkút 0.01 valószínűséggel fogyjon ki a benzinből?

7. Számoljuk ki $\mathbb{E}(X)$ értékét, ha X sűrűségfüggvénye

$$(a) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}xe^{-x/2} & , \text{ ha } x > 0, \\ 0 & , \text{ egyébként;} \end{cases}$$

$$(b) \quad f(x) = \begin{cases} c(1 - x^2) & , \text{ ha } -1 < x < 1, \\ 0 & , \text{ egyébként;} \end{cases}$$

$$(c) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{5}{x^2} & , \text{ ha } x > 5, \\ 0 & , \text{ egyébként?} \end{cases}$$

8. Egy alkatrész napokban kifejezett élettartamának sűrűségfüggvénye $f(x) = 2/x^3$, ha $x > 1$. Mi annak a valószínűsége, hogy ha január 26-án hoztuk haza a boltból, akkor február 1-én még működik? Érdemesebb-e azt az alkatrészt megvenni, melynek élettartama az $f(x) = 1/x^2$, ha $x > 1$ sűrűségfüggvényt követi? Átlagosan mennyit bír a kétféle alkatrész?
9. Mi a valószínűsége, hogy éjszaka álmomból felriadva a nagymutató az óralap képzeletbeli függőleges középvonalához képest jobbra van? És annak a valószínűsége, hogy a körív 5-ös és 6-os számjegy közötti $\frac{1}{12}$ részén van?
10. Mi a valószínűsége, hogy három független $(0, 1)$ -en választott pont közül pontosan 1-1 essen a $(0, \frac{1}{3})$, $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, $(\frac{2}{3}, 1)$ intervallumba?
11. Egy hosszú, magas kerítés egymástól L távolságra leszúrt, D átmérőjű függőleges rudakból áll. Egy d átmérőjű labdát elég messziről, csukott szemmel a kerítés felé dobunk. A labda vagy nekiütődik valamelyik rúdnak, vagy érintés nélkül átrepül közöttük. Mi a valószínűsége annak, hogy a labda a rudak érintése nélkül átrepül a rudak között?
12. A felé a vonatok 15 percenként indulnak 7:00-tól kezdve, míg B felé 15 percenként indulnak 7:05-től kezdve.

- (a) Ha egy utas 7:00 és 8:00 közötti egyenletes eloszlású időben érkezik az állomásra, majd felszáll arra a vonatra amelyik hamarabb indul, az esetek hányadrésztében megy A felé, és hányadrésztében B felé?
- (b) És ha az utas 7:10 és 8:10 közötti egyenletes eloszlású időben érkezik az állomásra?
13. Tudjuk, hogy a busz 10:00 és 10:30 közötti egyenletes időben érkezik a megállóba, ezért 10:00-ra a megállóba megyünk.
- (a) Mi a valószínűsége, hogy legalább 10 percet kell a buszra várnunk?
- (b) Ha 10:15-kor még mindig várjuk a buszt, mi a valószínűsége, hogy még legalább 10 percet fogunk a buszra várni?
14. Egy busz A és B városok között jár, mely városok egymástól 100 kilométerre vannak egymástól. Ha a busz lerobban, akkor azt egyenletes eloszlású helyen teszi a két város közötti úton. Pillanatnyilag egy buszszerviz található az A városban, egy a B városban, és egy a két város között félúton. Egy javaslat szerint ehelyett gazdaságosabb lenne a három szervizt az A várostól 25, 50, és 75 kilométerre elhelyezni. Egyetértünk-e a javaslattal? Miért? Mi lenne a szervizek legjobb elhelyezése?
15. Egy l hosszúságú ropit találomra választott pontban ketté törünk. Mi az így keletkezett darabok közül a rövidebbiknek az eloszlásfüggvénye?
16. Egy utcai telefonfülke foglalt, amikor odaérek. A beszélgetés hossza véletlen, percekben mérve $1/3$ paraméterű exponenciális eloszlású. Mi a valószínűsége, hogy 5 perc múlva sem kerülök sorra? Mi a helyzet akkor, ha tudjuk, hogy odaérkezésünkkor már 2 perce tart a beszélgetés?
17. Egy rádió élettartama években mérve exponenciális eloszlású, $\lambda = 1/8$ paraméterrel. Ha Józsi vesz egy ilyen típusú használt rádiót, mi a valószínűsége, hogy a következő nyolc évben végig működni fog?
18. Adott típusú elektromos berendezések 2%-a 1000 üzemórán belül elromlik. Tegyük fel, hogy a meghibásodásig eltelt idő exponenciális eloszlást követ. Mekkora a valószínűsége, hogy egy ilyen berendezés az átlagosnál tovább működik?
19. Egy ketyere javítási ideje (órákban mérve) exponenciális eloszlású valószínűségi változó, $\lambda = 1/2$ paraméterrel.
- (a) Mi a valószínűsége, hogy a javítás 2 óránál tovább tart?
- (b) Mi a feltételes valószínűsége, hogy a javítás összesen 10 óránál tovább tart, feltéve, hogy már 9 órája zajlik?
20. Egy örökifjú tulajdonságú villanykörteknél $2/3$ annak a valószínűsége, hogy 2000 óránál többet üzemel. Egy városban 200 ilyen égőt helyezünk el. Mi a valószínűsége annak, hogy 1000 óra elteltével éppen 150 égő világít?
21. Számítsuk ki a következő valószínűségeket, ha X standard normális valószínűségi változó:
- (a) $\mathbb{P}\{-1 < X < 1\}$

- (b) $\mathbb{P}\{-2 < X < 2\}$
 - (c) $\mathbb{P}\{-3 < X < 3\}$
22. Legyen X egy normális eloszlású valószínűségi változó $\mu = 10$, $\sigma^2 = 36$ paraméterekkel. Határozzuk meg a következő valószínűségeket:
- (a) $\mathbb{P}\{X > 5\}$;
 - (b) $\mathbb{P}\{4 < X < 16\}$;
 - (c) $\mathbb{P}\{X < 8\}$;
 - (d) $\mathbb{P}\{X < 20\}$;
 - (e) $\mathbb{P}\{X > 16\}$.
23. Tegyük fel, hogy X normális eloszlású, 5 várható értékkel. Ha $\mathbb{P}\{X > 9\} = 0.2$, közelítőleg mennyi X szórásnégyzete?
24. Tegyük fel, hogy a 25 éves fiatalemberek magassága centiméterben mérve normális eloszlású, $\mu = 180$ és $\sigma^2 = 169$ paraméterekkel. A 25 éves fiatalemberek hány százaléka magasabb 2 méternél? A két méteres klub tagjai közül hány százalék magasabb 2 méter 10 cm-nél?
25. Egy X valószínűségi változó várható értéke 0, szórása 1. Melyik esetben valószínűbb, hogy $X > 1/2$; akkor, ha X eloszlása normális, vagy akkor, ha egyenletes?
26. Legyen f a μ várható értékű és σ^2 szórásnégyzetű normális eloszlás sűrűségfüggvénye. Mutassuk meg, hogy $\mu \pm \sigma$ a függvény két inflekciós pontja.

Eredmények

1.(a) Nem, mert F csökkenő.

(b) Nem, mert $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 2$.

(c) Igen, ez az exponenciális(1) eloszlásfüggvény.

(d) Igen, folytonos, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$ és F monoton növekvő.

2.(a) Nem, f integrálja végtelen.

(b) Nem, $\int_0^2 \frac{\sin(x)}{2} dx \neq 1$.

(c) Igen, $f(x) \geq 0$, és

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 3^{x-1} \ln(3) dx + \int_0^{\pi} \frac{1}{3} \sin\left(\frac{x}{2}\right) dx = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1.$$

(d) Igen, ez az exponenciális(2) eloszlás sűrűségfüggvénye.

3.

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3},$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{D}(X) = \sqrt{\mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2} = \frac{1}{3\sqrt{2}}.$$

4.

$$\mathbb{P}\{m - \sigma < X < m + \sigma\} = \mathbb{P}\left\{\frac{4 - \sqrt{2}}{6} < X < \frac{4 + \sqrt{2}}{6}\right\} = \int_{\frac{4 - \sqrt{2}}{6}}^{\frac{4 + \sqrt{2}}{6}} 2x dx = \frac{4\sqrt{2}}{9}.$$

Mivel $m + 2\sigma > 1$, az alábbi integrálás felső korlátját le kell vágnunk 1-nél (ahol a sűrűségfüggvény nullává válik):

$$\mathbb{P}\{m - 2\sigma < X < m + 2\sigma\} = \mathbb{P}\left\{\frac{2 - \sqrt{2}}{3} < X < \frac{2 + \sqrt{2}}{3}\right\} = \int_{\frac{2 - \sqrt{2}}{3}}^1 2x dx = \frac{3 + 4\sqrt{2}}{9}.$$

5 Mindkét függvény előjelet vált az intervallum belsejében (az első függvény $\sqrt{2}$ -nél, a második 2-nél), egyik sem lehet sűrűségfüggvény.

6. A feladat szerint azt szeretnénk, hogy az X heti eladásra $\mathbb{P}\{X > V\} = 0.01$ teljesüljön, ahol V a tartály kapacitása. A feladathoz meghatározzuk az eloszlásfüggvényt:

$$F(a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx = \int_0^a 5(1-x)^4 dx = 1 - (1-a)^5, \quad 0 < a < 1.$$

Ezzel

$$0.01 = \mathbb{P}\{X > V\} = 1 - F(V) = (1-V)^5,$$

vagyis $1 - V = 0.01^{1/5}$, $V = 1 - 0.01^{1/5} \simeq 0.602$.

7.(a) Parciális integrálással

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_0^{\infty} x \cdot \frac{1}{4} x e^{-x/2} dx = \left[\frac{1}{4} x^2 \cdot (-2e^{-x/2}) \right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} x e^{-x/2} dx \\ &= [x \cdot (-2e^{-x/2})]_0^{\infty} + 2 \int_0^{\infty} e^{-x/2} dx = 4. \end{aligned}$$

Trükkösebben, legyen Y egy exponenciális($\frac{1}{2}$) valószínűségi változó. Ekkor a fenti integrál átírható a következőképpen:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2} e^{-x/2} dx = \frac{1}{2} \mathbb{E}(Y^2) = \frac{1}{2} \cdot (\mathbb{D}^2(Y) + [\mathbb{E}(Y)]^2) = \frac{1}{2} \cdot (2^2 + 2^2) = 4.$$

(b) 0, mivel a sűrűségfüggvény x -szel szorozva is integrálható, és szimmetrikus az origóra.

(c)

$$\mathbb{E}(X) = \int_5^{\infty} x \cdot \frac{5}{x^2} dx = [5 \ln(|x|)]_5^{\infty} = \infty.$$

8. Az első alkatrész élettartamának eloszlásfüggvénye

$$F(a) = \int_1^a \frac{2}{x^3} dx = 1 - \frac{1}{a^2}, \quad a > 1,$$

a második alkatrész esetén

$$F(a) = \int_1^a \frac{1}{x^2} dx = 1 - \frac{1}{a}, \quad a > 1.$$

Annak valószínűsége, hogy hat nap után működnek az alkatrészek $1 - F(6)$ azaz $1/36$ illetve $1/6$. Általában a nap után ez a valószínűség $1 - F(a)$, azaz $1/a^2$ illetve $1/a$, nagyobb a második alkatrész esetén, mint az első alkatrésznél. A második alkatrész élettartama *sztochasztikusan dominálja* az

első alkatrész élettartamát, érdemes tehát ezt megvenni. Ezt alátámasztja (de nem bizonyítja) a várható értékek kiszámolása is:

$$\mathbb{E}(X) = \int_1^{\infty} x \cdot \frac{2}{x^3} dx = 2,$$

míg a második alkatrésznél

$$\mathbb{E}(X) = \int_1^{\infty} x \cdot \frac{1}{x^2} dx = \infty.$$

9. Feltehetjük, hogy a nagymutató egyenletes eloszlású az óra lapján. Ezért annak valószínűsége, hogy a középvonaltól jobbra van $1/2$, és annak valószínűsége, hogy a körív $1/12$ részén van $1/12$.

10. Annak valószínűsége, hogy az első változó az első intervallumba esik, a második változó a második intervallumba esik, és a harmadik változó a harmadik intervallumba esik $(\frac{1}{3})^3 = \frac{1}{27}$. Azonban ez megtörténhet bármilyen más sorrendben is, így ezt az eredményt be kell szoroznunk a három változó $3! = 6$ sorrendjével, és a válasz $6/27 = 2/9$.

11. Legyen L a rudak középpontjainak távolsága. Feltesszük, hogy $L > D + d$, ellenkező esetben a valószínűség nulla. A probléma periodicitása miatt elég két szomszédos rúd középpontja között vizsgálódnunk, ahol feltehetjük, hogy a labda középpontjának X vízszintes koordinátája egyenletes eloszlású. A labda ütközik akkor és csak akkor, ha $X < \frac{D+d}{2}$ vagy $X > L - \frac{D+d}{2}$. E két halmaz együttes „hosszúsága” $D + d$, ezért az ütközés valószínűsége $\frac{D+d}{L}$, a válasz pedig $1 - \frac{D+d}{L} = \frac{L-D-d}{L}$.

12.(a) A felé indul az utas, ha érkezési ideje a $(7:05, 7:15] \cup (7:20, 7:30] \cup (7:35, 7:45] \cup (7:50, 8:00]$ halmazba esik. E halmaz „hossza” 40 perc, az A felé indulás valószínűsége tehát $40/60 = 2/3$, B felé pedig az esetek $1/3$ -ában lesz indulás.

(b) A felé indul az utas, ha érkezési ideje a $[7:10, 7:15] \cup (7:20, 7:30] \cup (7:35, 7:45] \cup (7:50, 8:00] \cup (8:05, 8:10]$ halmazba esik. E halmaz „hossza” ismét 40 perc, az A felé indulás valószínűsége tehát most is $40/60 = 2/3$, és B felé most is az esetek $1/3$ -ában lesz indulás.

13. Legyen a busz érkezési ideje X .

1. $\mathbb{P}\{X > 10:10\} = 20/30 = 2/3$.

2. $\mathbb{P}\{X > 10:25 | X > 10:15\} = \mathbb{P}\{X > 10:25\} / \mathbb{P}\{X > 10:15\} = \frac{5/30}{15/30} = 1/3$. Megjegyzés: egyenletes eloszlású várakozási idő esetén, feltéve, hogy a várt esemény még nem következett be, a hátralevő várakozási idő is egyenletes lesz (a hátralevő lehetséges intervallumon).

14. Először is tisztáznunk kell, mit jelent az a szó, hogy „gazdaságos” ebben a helyzetben. Egy jó értelmezés lehet lerobbanástól a legközelebbi szervizig mért D távolság várható értékének minimalizálása. Legyen a három szerviz $a < b < c$ távolságra A -tól. Ekkor

$$D = \begin{cases} a - X & , \text{ ha } 0 < X < a, \\ X - a & , \text{ ha } a < X < [a + b]/2, \\ b - X & , \text{ ha } [a + b]/2 < X < b, \\ X - b & , \text{ ha } b < X < [b + c]/2, \\ c - X & , \text{ ha } [b + c]/2 < X < c, \\ X - c & , \text{ ha } c < X < 100. \end{cases}$$

X egyenletes, sűrűségfüggvénye $1/100$ a két város között, így

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(D) &= \frac{1}{100} \cdot \left[\int_0^a (a-x) dx + \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x) dx \right. \\ &\quad \left. + \int_b^{\frac{b+c}{2}} (x-b) dx + \int_{\frac{b+c}{2}}^c (c-x) dx + \int_c^{100} (x-c) dx \right] \\ &= \frac{1}{100} \cdot \left[\frac{a^2}{2} + \frac{(b-a)^2}{4} + \frac{(c-b)^2}{4} + \frac{(100-c)^2}{2} \right].\end{aligned}$$

A jelenlegi helyzetben $a = 0$, $b = 50$, $c = 100$, és $\mathbb{E}(D) = 12.5$ kilométer. A javasolt elrendezésben $a = 25$, $b = 50$, $c = 75$, és $\mathbb{E}(D) = 9.375$ kilométer, eszerint tehát jobb, mint a jelenlegi elrendezés. Nem nehéz látni, hogy az optimális elrendezés (mely minimalizálja $\mathbb{E}(D)$ -t) $a = 50/3 \simeq 16.7$, $b = 50$, $c = 250/3 \simeq 83.3$.

Egy kissé nehezebb, de nem túl nehéz azt sem átgondolni, hogy a javasolt $a = 25$, $b = 50$, $c = 75$ elrendezés *sztochasztikusan jobb* a jelenlegi helyzethez képest, azaz $\mathbb{P}\{D < d\}$ minden d -re nagyobb egyenlő a javasolt elrendezésben, mint jelenleg. Érdeklődők azt is beláthatják, hogy az $\mathbb{E}(D)$ -t optimalizáló $a = 50/3$, $b = 50$, $c = 250/3$ elrendezés *sztochasztikusan is optimális*, azaz minden d -re egyszerre maximalizálja a $\mathbb{P}\{D < d\}$ valószínűséget. Ez azt jelenti, hogy a javasolt elrendezés nem csak $\mathbb{E}(D)$ tekintetében jobb a jelenleginél, illetve a harmadik elrendezés nem csak $\mathbb{E}(D)$ -t optimalizálja, hanem D -nek bármilyen monoton növekvő $g(D)$ függvényére is $\mathbb{E}(g(D))$ kisebb a javasolt elrendezésben mint jelenleg, illetve a lehető legkisebb a harmadik elrendezésben. Például biztosak lehetünk benne, hogy a javasolt elrendezés a távolság négyzete $\mathbb{E}(D^2)$ várható értékének tekintetében is jobb a jelenleginél, illetve a harmadik elrendezés $\mathbb{E}(D^2)$ -et is optimalizálja.

Ezek az állítások a feladat egyszerűségének következményei, bonyolultabb esetekben nem feltétlenül érhető el sztochasztikusan optimális megoldás. Ekkor elképzelhető, hogy valamilyen D célfüggvényre $\mathbb{E}(D)$ az egyik fajta elrendezésben lesz minimális, míg például $\mathbb{E}(D^2)$ egy másik fajta elrendezésben lesz a legkisebb, és külön tisztázni kell, hogy mit jelent a „jó” és a „kevésbé jó” elrendezés.

16. Ha X a beszélgetés hossza, akkor $\mathbb{P}\{X > 5\} = 1 - F(5) = e^{-5/3}$. Ha már 2 perce tart a beszélgetés, akkor

$$\mathbb{P}\{X > 2 + 5 \mid X > 2\} = \frac{\mathbb{P}\{X > 2 + 5\}}{\mathbb{P}\{X > 2\}} = \frac{1 - F(2 + 5)}{1 - F(2)} = \frac{e^{-[2+5]/3}}{e^{-2/3}} = e^{-5/3} = \mathbb{P}\{X > 5\}.$$

Az egyenlet az exponenciális eloszlás örökifjú tulajdonságát fejezi ki, a feltétel nem befolyásolja a hátralevő idő eloszlását.

17. Az örökifjú tulajdonság miatt a válasz ugyanaz, mintha Józsi új rádiót vásárolna: $\mathbb{P}\{X > 8\} = e^{-8 \cdot 1/8} = e^{-1}$.

18. Az átlagos működési idő $\mathbb{E}(X) = 1/\lambda$, és annak valószínűsége, hogy ennél tovább működik a berendezés $\mathbb{P}\{X > 1/\lambda\} = e^{-\lambda \cdot 1/\lambda} = e^{-1}$, λ értékétől függetlenül.

19.(a) $\mathbb{P}\{X > 2\} = e^{-2 \cdot 1/2} = e^{-1}$.

(b) Az örökifjúság miatt $\mathbb{P}\{X > 10 \mid X > 9\} = \mathbb{P}\{X > 9 + 1 \mid X > 9\} = \mathbb{P}\{X > 1\} = e^{-1 \cdot 1/2} = e^{-1/2}$.

20. Annak a valószínűsége, hogy egy adott égő világít $\mathbb{P}\{X > 1000\} = e^{-1000\lambda}$. A λ paraméter értékét pedig a megadott adatból számolhatjuk: $\frac{2}{3} = \mathbb{P}\{X > 2000\} = e^{-2000\lambda}$ amiből

$$p := \mathbb{P}\{X > 1000\} = e^{-1000\lambda} = [e^{-2000\lambda}]^{1/2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{1/2}.$$

Az 1000 óra után világító égők Y száma binomiális, ezzel a p , és $n = 200$ paraméterekkel. Ezért a kérdésre a válasz

$$\mathbb{P}\{Y = 150\} = \binom{200}{150} \cdot p^{150} \cdot [1 - p]^{50} = \binom{200}{150} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{75} \cdot \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{1/2}\right]^{50} \simeq 0.00429.$$

21. Általánosan, $x > 0$ -ra

$$\mathbb{P}\{-x < X < x\} = \Phi(x) - \Phi(-x) = \Phi(x) - [1 - \Phi(x)] = 2\Phi(x) - 1.$$

A normális eloszlás táblázatából behelyettesítve $\mathbb{P}\{-1 < X < 1\} \simeq 0.6826$, $\mathbb{P}\{-2 < X < 2\} \simeq 0.9544$, $\mathbb{P}\{-3 < X < 3\} \simeq 0.9974$.

$$22.(a) \mathbb{P}\{X > 5\} = 1 - \mathbb{P}\{X \leq 5\} = 1 - F(5) = 1 - \Phi\left(\frac{5-10}{6}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{5}{6}\right) = \Phi\left(\frac{5}{6}\right) \simeq 0.7967;$$

$$(b) \mathbb{P}\{4 < X < 16\} = F(16) - F(4) = \Phi\left(\frac{16-10}{6}\right) - \Phi\left(\frac{4-10}{6}\right) = \Phi(1) - [1 - \Phi(1)] = 2\Phi(1) - 1 \simeq 0.6826;$$

$$(c) \mathbb{P}\{X < 8\} = F(8) = \Phi\left(\frac{8-10}{6}\right) = \Phi\left(-\frac{1}{3}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{3}\right) \simeq 0.3707;$$

$$(d) \mathbb{P}\{X < 20\} = F(20) = \Phi\left(\frac{20-10}{6}\right) = \Phi\left(\frac{5}{3}\right) \simeq 0.9525;$$

$$(e) \mathbb{P}\{X > 16\} = 1 - F(16) = 1 - \Phi\left(\frac{16-10}{6}\right) = 1 - \Phi(1) \simeq 0.1587.$$

23. Adott, hogy

$$0.2 = \mathbb{P}\{X > 9\} = 1 - F(9) = 1 - \Phi\left(\frac{9-5}{\sigma}\right),$$

amiből $\Phi\left(\frac{4}{\sigma}\right) = 0.8$. A táblázatot visszafelé használva $4/\sigma \simeq 0.84$, tehát $\sigma \simeq 4.76$, és a szórásnégyzet $\sigma^2 \simeq 22.7$.

24. Jelöljük a magasságot X -szel, ekkor $\mathbb{P}\{X > 200\} = 1 - F(200) = 1 - \Phi\left(\frac{200-180}{13}\right) \simeq 0.0618$. A második kérdés egy feltételes valószínűség:

$$\mathbb{P}\{X > 210 \mid X > 200\} = \frac{\mathbb{P}\{X > 210\}}{\mathbb{P}\{X > 200\}} = \frac{1 - F(210)}{1 - F(200)} = \frac{1 - \Phi\left(\frac{210-180}{13}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{200-180}{13}\right)} \simeq 0.168.$$

25. Ha X normális, akkor $\mathbb{P}\{X > 1/2\} = 1 - \Phi(1/2) \simeq 0.309$. Ha X egyenletes, akkor a várható érték és a szórás ismeretében meg kell határoznunk azt az (α, β) intervallumot, ahol X felveszi az értékeit:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \frac{\alpha + \beta}{2} = 0, \\ \mathbb{D}(x) &= \frac{\beta - \alpha}{2\sqrt{3}} = 1, \end{aligned}$$

melyből $\alpha = -\sqrt{3}$, $\beta = \sqrt{3}$. Ezért

$$\mathbb{P}\{X > 1/2\} = \frac{\sqrt{3} - 1/2}{\sqrt{3} - (-\sqrt{3})} \simeq 0.356,$$

nagyobb, mint a normális esetben.

26. Az

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

normális sűrűségfüggvény első és második deriváltja

$$f'(x) = \frac{-(x-\mu)}{\sqrt{2\pi}\sigma^3} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \text{illetve} \quad f''(x) = \frac{-\sigma^2 + (x-\mu)^2}{\sqrt{2\pi}\sigma^5} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

A második deriváltban a mindig pozitív exponenciális tagot egy x -ben másodfokú polinom szorozza, mely a $\mu \pm \sigma$ zérushelyeinél előjelet vált, ezért itt vannak f inflekciós pontjai.