

Kalkulus 1, 2. hét

Relációk

I. Legyen $R \subseteq X \times X$ reláció. Bizonyítsuk be a következőket.

1. Az R reláció pontosan akkor reflexív, ha $\text{id}_X \subseteq R$.
2. Az R reláció pontosan akkor tranzitív, ha $R \circ R \subseteq R$.
3. Az R reláció pontosan akkor szimmetrikus, ha $R^{-1} = R$.
4. Az R reláció pontosan akkor antiszimmetrikus, ha $R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_X$.
5. Pontosán akkor teljesül, hogy $R^{-1} \circ R = \emptyset$, ha $R = \emptyset$.

II. Az alábbi relációk közül melyik reflexív, tranzitív, antiszimmetrikus, szimmetrikus, rendezés, illetve ekvivalenciareláció? Az ekvivalenciarelációknál adjuk meg az ekvivalenciaosztályokat és a faktorhalmazokat.

1. $\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$
2. $\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid xy = 1\}$
3. $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \mid \exists c \in \mathbb{R}((x_1 - x_2 = 2c) \wedge (y_1 - y_2 = 3c))\}$

III. Mutassuk meg, hogy a relációk kompozíciója asszociatív művelet. Vagyis minden $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq Y \times Z$ és $R_3 \subseteq Z \times V$ relációra

$$(R_3 \circ R_2) \circ R_1 = R_3 \circ (R_2 \circ R_1)$$

teljesül.

IV. Mutassuk meg, hogy egy háromelemű halmazon

1. a relációk száma 512;
2. a reflexív relációk száma 64;
3. a szimmetrikus relációk száma 64;
4. az antiszimmetrikus relációk száma 216;
5. a tranzitív relációk száma 171;
6. a reflexív és szimmetrikus relációk száma 8;
7. a reflexív és antiszimmetrikus relációk száma 27;
8. a reflexív és tranzitív relációk száma 29;
9. a szimmetrikus és antiszimmetrikus relációk száma 8;
10. a szimmetrikus és tranzitív relációk száma 15;
11. az antiszimmetrikus és tranzitív relációk száma 152;
12. a reflexív, szimmetrikus és antiszimmetrikus relációk száma 1;
13. a reflexív, szimmetrikus és tranzitív relációk száma 5;
14. a reflexív, antiszimmetrikus és tranzitív relációk száma 19;
15. a szimmetrikus, antiszimmetrikus és tranzitív relációk száma 8;
16. a reflexív, szimmetrikus, antiszimmetrikus és tranzitív relációk száma 1.

Függvények

I. Legyen $f : A \rightarrow B$ függvény (azaz $\text{Dom } f = A$ nem feltétlenül teljesül). Igazoljuk az alábbiakat.

1. $f(\emptyset) = \emptyset$
2. Ha $X_1 \subseteq X_2 \subseteq A$, akkor $f(X_1) \subseteq f(X_2)$.
3. Ha valamely I indexhalmazra minden $i \in I$ esetén $X_i \subseteq A$, akkor

$$f\left(\bigcup_{i \in I} X_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(X_i)$$
$$f\left(\bigcap_{i \in I} X_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in I} f(X_i)$$

teljesül.

II. Legyen $f : A \rightarrow B$ függvény (azaz $\text{Dom } f = A$ nem feltétlenül teljesül). Igazoljuk az alábbiakat.

1. $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$
2. Ha $X_1, X_2 \subseteq B$, akkor $f^{-1}(X_2 \setminus X_1) = f^{-1}(X_2) \setminus f^{-1}(X_1)$.
3. Ha $X_1 \subseteq X_2 \subseteq B$, akkor $f^{-1}(X_1) \subseteq f^{-1}(X_2)$.
4. Ha valamely I indexhalmazra minden $i \in I$ esetén $X_i \subseteq B$, akkor

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} X_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(X_i)$$
$$f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} X_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(X_i)$$

teljesül.

III. Legyen A és B tetszőleges halmaz, és legyen $H \subseteq \mathcal{F}(A, B)$ olyan részhalmaza az A halmazból B halmazba képező függvények halmazának, melyre teljesül, hogy minden $h_1, h_2 \in H$ esetén $h_1 \subseteq h_2$ vagy $h_2 \subseteq h_1$.

1. Mutassuk meg, hogy $f = \bigcup H$ függvény.
2. Mutassuk meg, hogy ha minden $h \in H$ függvény injektív, akkor az $f = \bigcup H$ függvény is injektív.

Vegyes, haladóbb feladatok

I. Mutassuk meg, hogy a kiválasztási axióma ekvivalens azzal, hogy minden függvénynek létezik jobbinverze. Azaz minden f függvényhez létezik olyan $g : \text{Ran } f \rightarrow \text{Dom } f$ függvény, hogy $f \circ g = \text{id}_{\text{Ran } f}$.

II. Legyen $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Mutassuk meg, hogy egy n elemű halmazon

1. a relációk száma $2^{\binom{n}{2}}$;
2. a reflexív relációk száma $2^{n(n-1)}$;
3. a szimmetrikus relációk száma $2^{\frac{n(n+1)}{2}}$;
4. az antiszimmetrikus relációk száma $2^n 3^{\frac{n(n-1)}{2}}$;
5. probléma: a tranzitív relációk száma¹;
6. a reflexív és szimmetrikus relációk száma $2^{\frac{n(n-1)}{2}}$;
7. a reflexív és antiszimmetrikus relációk száma $3^{\frac{n(n-1)}{2}}$;
8. probléma: a reflexív és tranzitív relációk száma¹;
9. a szimmetrikus és antiszimmetrikus relációk száma 2^n ;
10. a szimmetrikus és tranzitív relációk száma

$$\theta(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} T(k),$$

ahol $T(k)$ a 13. alfeladatban van definiálva;

11. probléma: az antiszimmetrikus és tranzitív relációk száma¹;
12. a reflexív, szimmetrikus és antiszimmetrikus relációk száma 1;
13. a reflexív, szimmetrikus és tranzitív relációk száma T_n , ahol az T_n sorozatot a $T_0 = 1$, $T_1 = 1$ kezdeti értékekkel és $n \geq 2$ esetén a

$$T_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} T_k$$

rekurzióval definiálhatjuk;

14. probléma: a reflexív, antiszimmetrikus és tranzitív relációk száma¹;
15. a szimmetrikus, antiszimmetrikus és tranzitív relációk száma 2^n ;
16. a reflexív, szimmetrikus, antiszimmetrikus és tranzitív relációk száma 1.

III. Legyen $(A_i)_I$ olyan halmazrendszer, melynek minden A_i halmaza egyelemű. Vagyis

$$\forall i \in I ((\exists x(x \in A_i)) \wedge (\forall x, y ((x \in A_i \wedge y \in A_i) \rightarrow x = y))).$$

A kiválasztási axiómára való hivatkozás nélkül mutassuk meg, hogy $\prod_{i \in I} A_i \neq \emptyset$.

¹A szerző ismerete szerint megoldatlan probléma.