

Kalkulus 1, 9. hét

Függvények határértéke I.

I. A határérték definíciójával igazoljuk az alábbi egyenlőségeket.

$$\begin{array}{lll} 1. \quad \lim_{x \rightarrow 3} (2x + 4) = 10 & 2. \quad \lim_{x \rightarrow -4} \sqrt{1 - 2x} = 3 & 3. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 3}{3x + 2} = 1 \\ 4. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{2x^2 - 3x + 4} = \infty & 5. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 2x} - x = 1 & 6. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty \end{array}$$

II. Számoljuk ki az alábbi határértékeket, ha azok léteznek.

$$\begin{array}{lll} 1. \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6} & 2. \quad \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2 - \sqrt{x-1}}{x^2 - 25} & 3. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^2}{\sqrt{x} - \sqrt{2-x}} \\ 4. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{1-x^2} - \frac{3}{1-x^3} \right) & 5. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[4]{x^3+x} - x}{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x}} & 6. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{\frac{4x^3+3x^2}{4x-3}} \right) \end{array}$$

Függvények konvexitása és folytonossága

I. Igazoljuk, hogy az $\text{id}_{\mathbb{R}} \cdot \chi_{\mathbb{Q}}$ függvény csak a 0 pontban folytonos.

II. Legyen $A = [-1, 0] \cup (]0, 1[\cap \mathbb{Q}) \cup \{3, 4, 5\}$ és legyen

$$f : A \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{ha } x < 2 \text{ és } x \notin \mathbb{Q}, \\ x & \text{ha } x < 2 \text{ és } x \in \mathbb{Q}, \\ 5 & \text{ha } x = 3, \\ 8 & \text{ha } x = 4 \text{ vagy } x = 5. \end{cases}$$

Mely pontokban folytonos az f függvény?

III. Függvény konvexitása és folytonossága.

- Legyen $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ konvex függvény az I intervallumon. Mutassuk meg, hogy ekkor az f függvény folytonos.
- Legyen $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény. Igazoljuk, hogy az f függvény pontosan akkor konvex, ha minden $x_1, x_2 \in I$ számra

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

teljesül.

Haladóbb feladatok

I. Számoljuk ki az alábbi határértékeket, ha azok léteznek.

$$\begin{aligned}
 1. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}} & \quad 2. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{x} \left((x+1)^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{2}{3}} \right) & \quad 3. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right) \\
 4. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} & \quad 5. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{\sqrt[3]{x}-1} - \frac{3}{\sqrt{x}-1} \right) & \quad 6. \quad \lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1-x} - 3}{2 + \sqrt[3]{x}}
 \end{aligned}$$

II. Fejezzük ki az alábbi sorösszegeket elemi függvényekkel (sin, cos, exp, sh, ch).

$$\begin{aligned}
 1. \quad \frac{1}{0!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{8!} + \frac{1}{12!} + \dots &=? \\
 2. \quad \frac{1}{1!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{9!} + \frac{1}{13!} + \dots &=? \\
 3. \quad \frac{1}{2!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{10!} + \frac{1}{14!} + \dots &=? \\
 4. \quad \frac{1}{3!} + \frac{1}{7!} + \frac{1}{11!} + \frac{1}{15!} + \dots &=?
 \end{aligned}$$

III. Mutassuk meg, hogy minden $x \in \mathbb{R}$ és $q \in]-1, 1[$ esetén

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k \sin(kx) = \frac{q \sin x}{q^2 - 2q \cos x + 1} \quad \text{és} \quad \sum_{k=0}^{\infty} q^k \cos(kx) = \frac{1 - q \cos x}{q^2 - 2q \cos x + 1}$$

teljesül.

V. Adott $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ esetén legyenek $p_x \in \mathbb{Z}$ és $q_x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ azon egyértelműen meghatározott számok, melyekre $x = \frac{p_x}{q_x}$, valamint p_x és q_x relatív prímek. Az

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \begin{cases} 0, & \text{ha } x \notin \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \\ \frac{1}{q_x}, & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \end{cases}$$

függvényt *Dirichlet-függvénynek* nevezzük. Igazoljuk, hogy a f Dirichlet-függvénynek

1. minden pontban létezik jobb- illetve bal oldali határértéke;
2. a 0 helyen és minden irracionális pontban folytonos;
3. minden $a \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ pontban szakadása van, úgy, hogy $\lim_{a^+} f = \lim_{a^-} f$.