

# Matematika A1

## 9. feladatsor

### A derivált alkalmazásai

#### Függvény szélsőértékei

1. Keressük meg a függvények abszolút maximumát és minimumát a megadott intervallumon. Ezután rajzoljuk fel a függvény grafikonját. Keressük meg a grafikonon az abszolút szélsőértéknek megfelelő pontokat, és számítsuk ki e pontok koordinátáit.

(a)  $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, \quad -2 \leq x \leq 3$

**Megoldás:** abszolút max: -3 az  $x = 3$ -ban; abszolút min: -19/3 az  $x = -2$ -ben

(b)  $f(x) = 4 - x^2, \quad -3 \leq x \leq 1$

**Megoldás:** abszolút max: 4 az  $x = 0$ -ban; abszolút min: -5 az  $x = -5$ -ben

(c)  $f(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1$

**Megoldás:** abszolút max: 1 az  $x = -1$ -ben; abszolút min: 1/2 az  $x = -2$ -ben

(d)  $f(x) = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$

**Megoldás:** abszolút max: 1 az  $x = \pi/2$ -ben; abszolút min: -1 az  $x = -\pi/2$ -ben

2. Keressük meg a differenciálhányadost, az összes kritikus pontot, és határozzuk meg a függvények lokális szélsőértékeit.

(a)  $y = x^{2/3}(x + 2)$

**Megoldás:**

| kritikus pont | derivált   | szélsőérték  | érték                           |
|---------------|------------|--------------|---------------------------------|
| $x = -4/5$    | 0          | lokális max. | $\frac{12}{25}10^{1/3} = 1.034$ |
| $x = 0$       | nincs ért. | lokális min. | 0                               |

(b)  $y = x\sqrt{4 - x^2}$

**Megoldás:**

| kritikus pont   | derivált   | szélsőérték  | érték |
|-----------------|------------|--------------|-------|
| $x = -2$        | nincs ért. | lokális max. | 0     |
| $x = -\sqrt{2}$ | 0          | min.         | -2    |
| $x = \sqrt{2}$  | 0          | max.         | 2     |
| $x = 2$         | nincs ért. | lokális min. | 0     |

(c)  $y = \begin{cases} 3 - x, & x < 0 \\ 3 + 2x - x^2, & x \geq 0 \end{cases}$

**Megoldás:**

| kritikus pont | derivált   | szélsőérték   | érték |
|---------------|------------|---------------|-------|
| $x = 0$       | nincs ért. | lokális min.  | 3     |
| $x = 1$       | 0          | lokális mmax. | 4     |

$$(d) y = \begin{cases} -x^2 - 2x + 4, & x \leq 1 \\ -x^2 + 6x - 4, & x > 1 \end{cases}$$

**Megoldás:**

| kritikus pont | derivált   | szélsőérték  | érték |
|---------------|------------|--------------|-------|
| $x = -1$      | 0          | max.         | 5     |
| $x = 1$       | nincs ért. | lokális min. | 1     |
| $x = 3$       | 0          | max.         | 5     |

### Optimalizálási alkalmazások

3. Egy doboz térfogatát a

$$V(x) = x(10 - 2x)(16 - 2x), \quad 0 < x < 5$$

függvény adja meg.

- (a) Keressük meg a  $V$  szélsőértékeit.  
 (b) Mit jelentenek az (a) részben megoldásul kapott számok a doboz térfogatára nézve?

**Megoldás:** (a) A maximumérték  $144x = 2$ -re; (b) A doboz legnagyobb térfogata 144 térfogategység, s ezt az értéket akkor veszi fel, ha  $x = 2$ .

4. Mennyi a maximális területe annak a derékszögű háromszögnek, amelynek átfogója 5 cm?

**Megoldás:** A lehető legnagyobb terület  $A\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right) = \frac{25}{4} \text{ cm}^2$ .

5. Tegyük fel, hogy egy adott  $t$  időpontban a váltakozó áramú áramkörben az áramerősség értéke  $i = 2 \cos t + 2 \sin t$ . Mekkora az áramerősség csúcserőssége?

**Megoldás:** Az áramerősség csúcserőssége:  $2\sqrt{2}$ , a  $t = \pi/4 + 2k\pi$ -ben.

### A Lagrange-féle középértéktétel

6. Határozzuk meg a középértéktételben szereplő  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$  egyenlőséget kielégítő  $c$  értéket vagy értékeket a megadott függvényekre és intervallumokra.

(a)  $f(x) = x^2 + 2x - 2, \quad [0, 1]$

**Megoldás:**  $1/2$

(b)  $f(x) = x^{2/3}, \quad [0, 1]$

**Megoldás:**  $8/27$

(c)  $f(x) = \sqrt{x-1}, \quad [1, 3]$

**Megoldás:**  $3/2$

7.  $a$ ,  $m$ , és  $b$  mely értékeire teljesíti az

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

függvény a  $[0, 2]$  intervallumon a középértéktétel feltételeit?

**Megoldás:**  $a = 3$ ,  $m = 1$ ,  $b = 4$

8. Mutassuk meg, hogy az alábbi függvényeknek a megadott intervallumokon pontosan egy zérushelyük van.

(a)  $f(x) = x^4 + 3x + 1$ ,  $(-2, 1]$

(b)  $f(x) = \sqrt{x} + x\sqrt{1+x} - 4$ ,  $(0, \infty)$

(c)  $f(x) = x + \sin^2\left(\frac{x}{3}\right) - 8$ ,  $(-\infty, \infty)$

9. Keressük meg az összes olyan függvényt, amelyeknek a deriváltja a megadott függvény.

(a)  $y' = x^3$

**Megoldás:**  $\frac{x^4}{4} + C$

(b)  $y' = 3x^2 + 2x - 1$

**Megoldás:**  $x^3 + x^2 - x + C$

(c)  $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

**Megoldás:**  $\sqrt{x} + C$

(d)  $y' = \sin 2x + \cos \frac{x}{2}$

**Megoldás:**  $-\frac{1}{2} \cos 2x + 2 \sin \frac{x}{2} + C$

## Monoton függvények és az első derivált teszt

10. Válaszoljunk az alábbi kérdésekre a megadott deriváltak alapján.

- Melyek  $f$  kritikus pontjai,
- Mely intervallumon növekszik, illetve csökken  $f$ ?
- Mely pontokban lehet  $f$ -nek lokális maximuma vagy minimuma?

(a)  $f'(x) = x(x - 1)$

**Megoldás:** krit. pontok: 0,1; a  $(-\infty, 0)$  és  $(1, \infty)$  intervallumokban növekvő,  $(0, 1)$ -ben csökkenő; Lokális max.  $x = 0$ -ban, lokális min.  $x = 1$ -ben.

(b)  $f'(x) = (x - 1)^2(x + 2)$

**Megoldás:** krit. pontok: -2,1; a  $(-2, 1)$  és  $(1, \infty)$  intervallumokban növekvő,  $(-\infty, -2)$ -ben csökkenő; Lokális max. nincs, lokális min.  $x = -2$ -ben.

(c)  $f'(x) = x^{-1/2}(x - 3)$

**Megoldás:** krit. pontok: 0,3; a  $(3, \infty)$  intervallumon növekvő,  $(0, 3)$ -ban csökkenő; Lokális max.  $x = 3$ -ban, lokális min.  $x = 0$ -ban.

11.
  - Keressük meg azokat az intervallumokat, amelyeken a függvény csökken illetve nő;
  - Amennyiben léteznek, határozzuk meg a függvények szélsőértékeit;

- Állapítsuk meg, hogy mely szélsőértékek abszolút szélsőértékek.

(a)  $f(x) = -x^3 + 2x^2$

**Megoldás:** Csökkenő  $(-\infty, 0)$ -ban és  $(4/3, \infty)$ -ben, növekvő  $(0, 4/3)$ -ban; Lokális max.  $x = 4/3$ -ban  $32/27$ , lokális min.  $x = 0$ -ban  $32/37$ ; nincs abszolút szélsőértéke.

(b)  $f(x) = x\sqrt{8-x^2}$

**Megoldás:** Csökkenő  $(-2\sqrt{2}, -2)$ -ben és  $(2, 2\sqrt{2})$ -n, növekvő  $(-2, 2)$ -n; Lokális max.  $x = -2\sqrt{2}$ -ban 0 és  $x = 2$ -ben 4, lokális min.  $x = -2$ -ben  $-4$  és  $x = 2\sqrt{2}$ -ben 0; abszolút max:  $x = 2$ -ben 4, abszolút min:  $x = -2$ -ben  $-4$ .

(c)  $f(x) = \frac{x^3}{3x^2+1}$

**Megoldás:** Növekvő  $(-\infty, 0)$ -ban és  $(0, \infty)$ -ben; nincsenek lokális szélsőértékei.

(d)  $f(x) = x^{1/3}(x^2 - 4)$

**Megoldás:** Növekvő  $(-\infty, -2/\sqrt{7})$ -ben és  $(2/\sqrt{7}, \infty)$ -ben, csökkenő  $(-2/\sqrt{7}, 0)$ -ban és  $(0, 2/\sqrt{7})$ -ben; lokális max:  $24\sqrt[3]{2}/7^{7/6} \approx 3.12$   $x = -2/\sqrt{7}$ -ben, lokális min:  $-24\sqrt[3]{2}/7^{7/6} \approx -3.12$   $x = 2/\sqrt{7}$ -ben; abszolút szélsőérték nincs.

12. • Határozzuk meg a függvény lokális szélsőértékeit és szélsőérték helyeit az adott tartományon.  
• Közülük mely szélsőértékek abszolút szélsőértékek?

(a)  $f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2$

**Megoldás:** Lokális max: 1  $x = 1$ -ben, lokális min: 0  $x = 2$ -ben; abszolút max: 1  $x = 1$ -ben, nincs abszolút min.

(b)  $f(x) = (x+1)^2, \quad -\infty < x \leq 0$

**Megoldás:** Lokális max: 1  $x = 0$ -ban, lokális min: 0  $x = -1$ -ben; abszolút max nincs, abszolút min: 0  $x = -1$ -ben

(c)  $f(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \leq x < \infty$

**Megoldás:** Lokális min: 0  $x = 0$ -ban; abszolút max nincs, abszolút min: 0  $x = 0$ -ban

## Konvexitás és a függvénygörbe felrajzolása

13. Ábrázoljuk a megadott függvények grafikonját; adjuk meg a szélsőértékek és az inflexiós pontok koordinátáit.

(a)  $y = x^2 - 4x + 3$

**Megoldás:** Lokális min: (2, -1)

(b)  $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$

**Megoldás:** Inflexiós pont: (0, 0), (2, 16); lokális max: (3, 27)

(c)  $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$

**Megoldás:** Inflexiós pont: (0, 0); lokális min:  $(-3/2, -27/16)$

(d)  $y = x + \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$   
**Megoldás:** Inflexiós pont:  $(\pi, \pi)$ ; max:  $(2\pi, 2\pi)$ ; min:  $(0, 0)$

(e)  $y = \frac{x^2-3}{x-2}, \quad x \neq 2$   
**Megoldás:** Lokális max:  $(3, 6)$ ; lokális min:  $(1, 2)$

14. Megadjuk egy folytonos  $y = f(x)$  függvény első deriváltját. Határozzuk meg  $y''$ -t, aztán ez alapján vázoljuk fel  $f$  grafikonjának általános alakját.

(a)  $y' = x^2 - x - 6$   
**Megoldás:**

(b)  $y' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$   
**Megoldás:**  $y'' = \frac{2}{\cos^2 x} \operatorname{tg} x$

(c)  $y' = \cos x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$   
**Megoldás:**  $y'' = -\sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

(d)  $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x & x \leq 0 \\ 2x & x > 0 \end{cases}$   
**Megoldás:**  $y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2 & x > 0 \end{cases}$