

## 1. HÁZI FELADAT

1. Legyen  $R$  tetszőleges gyűrű. Ekkor az alábbiak ekvivalensek:

- (1) Minden  $R$ -beli ideál végesen generált.
- (2) (Felszálló lánc feltétel) Minden  $R$ -beli ideálokból álló  $I_1 \subseteq \dots \subseteq I_m \subseteq \dots$  ideállánc véges sok lépésben stabilizálódik.

2. \* Legyen  $k$  tetszőleges test,  $\{S_i \mid i \in I\}$  pedig  $k[x_1, \dots, x_n]$ -beli részhalmazok. Mutassuk meg, hogy

- (1) ha  $S_1 \subseteq S_2$ , akkor  $V(S_2) \subseteq V(S_1) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ ;
- (2)  $\bigcap_{i \in I} V(S_i) = V(\bigcup_{i \in I} S_i)$ .

3. \*\* Írjuk le, hogy az  $\mathbb{A}_k^2$  affin térnek milyen algebrai részhalmazai vannak, ha  $k$  algebrailag zárt.

4. \* Ha  $X \subseteq \mathbb{A}_k^3$  a három koordinátatengely uniója, akkor adjuk meg  $X$  ideálját generátorokkal. Mutassuk meg, hogy az  $I(X) \subseteq k[x, y, z]$  ideált nem lehet háromnál kevesebb elemmel generálni<sup>1</sup>.

5. Legyen  $X$  a  $\phi : \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^3, t \mapsto (t, t^2, t^3)$  morfizmus képe. Határozzuk meg  $X$  ideálját, és döntsük el, hogy mekkora az a legkisebb  $r$  egész szám, hogy az  $I(X)$  ideál  $r$  elemmel generálható.

6. Tekintsük az  $f(x, y) = y^2 - x^3$  egyenlettel definiált  $C$  síkgörbét.

- (1) Igazoljuk, hogy  $k[C]$  minden eleme egyértelműen írható  $P(x) + Q(x)y$  alakba, ahol  $P, Q \in k[x]$ .
- (2) Mutassuk meg, hogy az  $f : \mathbb{A}^1 \rightarrow C, f(t) \stackrel{\text{def}}{=} (t^2, t^3)$  reguláris leképezés nem izomorfizmus.

7. Legyen  $f : X \rightarrow Y$  egy reguláris leképezés,

$$\Gamma_f \stackrel{\text{def}}{=} \{ (x, f(x)) \mid x \in X \}$$

pedig az  $f$  leképezés gráfja. Igazoljuk, hogy  $\Gamma_f \subseteq X \times Y$  zárt részhalmaz, továbbá hogy  $\Gamma_f \simeq X$ .

8. Legyenek  $X, Y$  affin algebrai halmazok. Ekkor a  $pr_Y : X \times Y \rightarrow Y, pr_Y(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} y$  reguláris leképezés neve az  $Y$ -ra vett vetítés (projekció).

- (1) Mutassuk meg, hogy ha  $Z \subseteq Y$  zárt halmaz,  $f : X \rightarrow Y$  egy reguláris leképezés, akkor

$$f(Z) = pr_Y(\Gamma_f \cap Z).$$

- (2) Bizonyítsuk be, hogy minden  $f : X \rightarrow Y$  affin algebrai halmazok közti reguláris leképezéshez létezik olyan  $g : X \rightarrow X \times Y$  morfizmus, hogy  $g$  izomorf módon képezi le  $X$ -et  $X \times Y$  egy zárt részhalmazára, és  $f = pr_Y \circ g$ . Röviden: minden reguláris leképezés előáll egy beágyazás és egy vetítés kompozíciójaként.

9. \* Legyenek  $X, Y \subseteq \mathbb{A}^n$  algebrai halmazok. Tekintsük az  $X \times Y \subseteq \mathbb{A}^{2n}$ , illetve a  $\Delta \stackrel{\text{def}}{=} V(x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n) \subseteq \mathbb{A}^{2n}$  algebrai halmazokat. Mutassuk meg, hogy a

$$\phi : X \cap Y \rightarrow (X \times Y) \cap \Delta, x \mapsto (x, x)$$

reguláris leképezés egy izomorfizmus.

10. Határozzuk meg az  $f : \mathbb{A}^2 \rightarrow \mathbb{A}^2, f(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} (x, xy)$  reguláris leképezés képét, és jellemezzük topológiailag.

11. Az  $X$  algebrai halmaz egy önmagával vett  $f : X \rightarrow X$  izomorfizmusát  $X$  egy automorfizmusának hívjuk. Mutassuk meg, hogy tetszőleges  $k$  test esetén  $\mathbb{A}_k^1$  minden automorfizmusa  $f(x) = ax + b$  alakú, ahol  $a, b \in k$  és  $a \neq 0$ .

12. Legyen  $\text{char}(k) \neq 2$ . Tekintsük a  $C \stackrel{\text{def}}{=} V(y^2 = x^2 + x^3) \subseteq \mathbb{A}_k^2$  síkgörbét és az  $f(x) = (x^2 - 1, x(x^2 - 1))$  képlettel definiált  $f : \mathbb{A}^1 \rightarrow C$  reguláris leképezést. Bizonyítsuk be, hogy

$$f^* : k[C] \xrightarrow{\sim} \{ g(x) \in k[x] \mid g(1) = g(-1) \} \subseteq k[x].$$

<sup>1</sup>Ez a tény azért érdekes, mert  $X \subseteq \mathbb{A}_k^3$  kodimenziója csak 2