

3. HÁZI FELADAT

1. *Ellenőrző kérdések*: bizonyítsuk be/cáfoljuk meg az alábbiakat. Minden esetben (X, τ) topologikus tér.

- Ha $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ injektív leképezés, akkor $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ injektív homomorfizmus.
- Ha $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ szürjektív leképezés, akkor $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ szürjektív homomorfizmus.
- Ha $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ injektív homomorfizmus, akkor $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ injektív leképezés.
- Ha $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ szürjektív homomorfizmus, akkor $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ szürjektív leképezés.
- Ha $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ bijektív leképezés, akkor $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ bijektív homomorfizmus.

2. Mutassuk meg, hogy minden $p : E \rightarrow B$ fedőleképezés nyílt.

3. Legyenek $i = 1, 2$ esetén $p_i : (E_i, e_i) \rightarrow (B, b_i)$ fedőleképezések. Igazoljuk, hogy

$$p_1 \times p_2 : (E_1 \times E_2, (e_1, e_2)) \rightarrow (B_1 \times B_2, (b_1, b_2))$$

is fedőleképezés.

4. Bizonyítsuk be, hogy a $p_n : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1, z \mapsto z^n$ hozzárendelés fedőleképezés és hányadosleképezés is egyben.

5. Legyenek $h, k : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ homotóp leképezések.

(1) * Lássuk be, ha $H : X \times I \rightarrow Y$ egy h -ből k -ba menő homotópia, akkor a

$$\gamma : (I, 0) \rightarrow (Y, y_0), t \mapsto H(x_0, t)$$

választás egy olyan utat ad meg, amelyre

$$k_* = \tau_\gamma \circ h_* .$$

(2) Bizonyítsuk be, hogy ha $h, k : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ homotóp leképezések, akkor h_* pontosan akkor injektív/szürjektív/triviális, ha k_* az.

(3) * Ha $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ homotóp ekvivalencia, akkor $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ izomorfizmus.

6. (Fedőleképezéshez tartozó monodrómia-reprezentáció) Legyen $p : E \rightarrow B$ egy fedőleképezés, $b_0 \in B$.

(1) Az alábbi $\rho : \pi_1(B, b_0) \times p^{-1}(b_0) \rightarrow p^{-1}(b_0)$ függvény jóldefiniált:

$$([f], e) \mapsto f \text{ e-ben kezdődő felemelésének a végpontja .}$$

(2) Tetszőleges $[f] \in \pi_1(B, b_0)$ esetén a

$$\sigma_p([f]) : p^{-1}(b_0) \rightarrow p^{-1}(b_0), e \mapsto \rho([f], e)$$

hozzárendelés $p^{-1}(b_0)$ egy permutációja.

(3) Igazoljuk, hogy a $\sigma_p : \pi_1(B, b_0) \rightarrow \text{Sym}(p^{-1}(b_0))$ függvény egy csoportok közti homomorfizmus (ezt hívjuk a p -hez tartozó monodrómia-reprezentációnak).