

2010.04.20.

REPRESENTATION THEORY/SPRING 2010/ E. Horváth and A. Küronya  
PRACTICE SESSION 11

1. Mutassuk meg, hogy ha egy  $\phi$  lineáris transzformációnak  $v$   $a_i$  sajátértékhez tartozó általánosított sajátvektora, akkor ez legfeljebb  $m_i$  indexű sajátvektor, ahol  $m_i$   $\phi$  karakterisztikus polinomjában  $(x - a_i)$  kitevője.

2. (HF) Legyen  $\delta \in \text{Der}(A)$  egy  $A$  algebra derivációja. Legyen  $a, b$   $\delta$  két sajátértéke,  $x, y \in A$ . Mutassuk meg, hogy

$$(\delta - (a + b) \cdot \text{id})^n(xy) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (\delta - a \cdot \text{id})^i x (\delta - b \cdot \text{id})^{n-i} y.$$

3. (Cartan-kritérium) A trace-lemma segítségével lássuk be: Legyen  $L \leq \mathfrak{gl}(V)$  Lie-algebra,  $\dim_F V < \infty$ ,  $F$  algebrailag zárt, 0 karakterisztikájú test. Mutassuk meg, hogy ha minden  $x \in [L, L]$  és  $y \in L$  esetén  $\text{Tr}(xy) = 0$ , akkor  $L$  feloldható.

4. Mutassuk meg, hogy ha  $L$  véges dimenziós Lie-algebra  $F$  algebrailag zárt, 0 karakterisztikájú test felett, akkor ha  $\text{Tr}(\text{adx}_y) = 0$ , minden  $x \in [L, L]$  és minden  $y \in L$  esetén akkor  $L$  feloldható.

5. Legyen  $L$  Lie-algebra  $I$  ideál  $L$ -ben.  $\kappa$  legyen  $L$  Killing-formája,  $\kappa_I$  pedig az  $I$  Lie-algebra Killing-formája. Mutassuk meg, hogy  $\kappa_I = \kappa_{I \times I}$ .

6. (HF) Számítsuk ki az  $\mathfrak{sl}(2, F)$  Killing-formájának mátrixát a standard bázisban  $(x, h, y)$ . Mutassuk meg, hogy ez nem elfajuló, ha a test karakterisztikája nem 2.

7. Mutassuk meg, hogy algebrailag zárt, 0 karakterisztikájú test feletti véges dimenziós Lie-algebra pontosan akkor féligegyszerű, ha Killing-formája nem elfajuló.

8. Mutassuk meg, hogy az a 3 dimenziós  $L = \langle x, y, z \rangle$  Lie-algebra, mely  $[x, y] = z$ ,  $[x, z] = y$ ,  $[y, z] = 0$  azonosságokkal van definiálva, feloldható, azaz  $\text{rad}(L) = L$ , de  $\text{rad}(\kappa) < L$ , ha a test karakterisztikája nem 2.

9. Mutassuk meg, hogy ha  $V$  vektortér,  $U \leq V$  altér és  $f : V \times V \rightarrow F$  bilineáris függvény, akkor

a)  $\dim U^\perp \geq \dim V - \dim U$ .

b) Ha  $(U, f)$  nem elfajuló, akkor  $U \oplus U^\perp = V$ .

10. Legyen  $L$  véges dimenziós, féligegyszerű Lie-algebra (azaz,  $\text{rad}(L) = 0$ ). Mutassuk meg, hogy

a)  $L$  véges sok egyszerű ideál direkt összege:  $L = \bigoplus_{i=1}^t L_i$ .

b) Minden  $L$ -beli egyszerű ideál valamelyik  $L_i$ -vel egyezik meg

c)  $L_i$  Killing-formája  $\kappa_{L_i \times L_i}$ .

11. Mutassuk meg, hogy ha  $L$  véges dimenziós, féligegyszerű Lie-algebra, akkor  $[L, L] = L$ .

12. Mutassuk meg, hogy ha  $L$  véges dimenziós, féligegyszerű Lie-algebra, akkor minden ideálja és homomorf képe vagy 0 vagy féligegyszerű, és minden ideál néhány  $L_i$  direkt összege.

13. Mutassuk meg, hogy ha  $\delta \in \text{Der}(L)$  és  $x \in L$ , ahol  $L$  Lie-algebra, akkor  $[\delta, \text{ad}x] = \text{ad}(\delta x)$ .

14. Mutassuk meg, hogy ha  $L$  véges dimenziós, féligegyszerű Lie-algebra akkor a Killing-forma megszorítása minden ideálra nem elfajuló.

15. Mutassuk meg, hogy ha  $L$  féligegyszerű, akkor  $\text{ad}(L) = \text{Der}(L)$ .

16. Mutassuk meg, hogy minden  $L \rightarrow \text{gl}(V)$  Lie-algebra reprezentáció egy  $L$ -modulust definiál, és minden  $L$ -modulus egy reprezentációt definiál, és ez a megfeleltetés bijektív.

17. Legyen  $M$   $L$  Lie-algebra feletti véges dimenziós modulus. Mutassuk meg, hogy ekvivalensek:

- a)  $M$  modulus véges sok irreducibilis modulus direkt összege
- b) Minden részmodulushoz van  $M$ -ben direkt kiegészítő.

18. (Schur-lemma) Mutassuk meg, hogy ha  $F$  algebrailag zárt test,  $L$  Lie-algebra  $F$  felett,  $\phi : L \rightarrow \text{gl}(V)$  reprezentáció, amely irreducibilis (azaz a megfelelő modulusnak nincs valódi részmodulusa) és  $a \in \text{End}(V)$  felcserélhető  $\phi(l)$ -l, minde  $l \in L$ -re, akkor  $a = \alpha \cdot \text{id}$ , ahol  $\alpha \in F$ .