

**Valószínűesszámítás 1. II. éves matematikus-hallgatóknak, illetve
Valószínűesszámítás (B4) II. éves mérnök-fizikus hallgatóknak
2007/2008. őszi félév, Szász Domokos**

8. feladatsor

Eloszlások (folyt.): valószínűségi változók függvényei

- 8.1 X Poisson eloszlású valószínűségi változó, λ paraméterrel. Írjuk fel az $Y := 2X + 1$ valószínűségi változó eloszlását és számítsuk ki az $\mathbf{E}(Y)$ várható értéket és a $\mathbf{D}^2(Y)$ szórásnégyzetet.
- 8.2 Legyen X a $[0, 1]$ intervallumban egyenletes eloszlású valószínűségi változó. Határozzuk meg az $Y := X^{-1}$ és a $Z := X(1 + X)^{-1}$ valószínűségi változók eloszlásfüggvényét és sűrűségfüggvényét.
- 8.3 Legyen X standard normális eloszlású valószínűségi változó. (Azaz X normális eloszlású, amelynek várható értéke 0, szórásnégyzete 1.) Határozzuk meg az $Y := 2 + |X|$ valószínűségi változó eloszlásfüggvényét és sűrűségfüggvényét.
- 8.4 Legyen $X \sim N(m; \sigma)$ normális eloszlású valószínűségi változó ($E(X) = m$, $D^2(X) = \sigma^2$).
 - (a) Határozzuk meg az $Y := a \cdot X + b$ sűrűségfüggvényét, várható értékét, szórást.
 - (b) Határozzuk meg az $Z := X^2$ valószínűségi változó eloszlásának sűrűségfüggvényét $m = 0$ esetén.
- 8.5 Legyen $X \sim N(m, \sigma)$ normális eloszlású valószínűségi változó ($\mathbf{E}(X) = m$, $\mathbf{D}^2(X) = \sigma^2$). Határozzuk meg az $Y := e^X$ log-normális eloszlású valószínűségi változó eloszlásfüggvényét és sűrűségfüggvényét.
- 8.6 Legyen X folytonos eloszlású valószínűségi változó, melynek eloszlásfüggvénye $F(x)$.
 - (a) Határozzuk meg az $Y := F(X)$ és a $Z := -\log(F(X))$ valószínűségi változók eloszlásfüggvényét.
 - (b) Bátraknak: Bizonyítsuk be, hogy ha $G : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ eloszlásfüggvény és $G^{-1} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ -et a következő képpen értelmezzük: $G^{-1}(u) := \sup\{x \in \mathbb{R} : G(x) < u\}$, akkor az $Y := G^{-1}(F(X))$ valószínűségi változó eloszlásfüggvénye pontosan G .
- 8.7 Legyen X egy valószínűségi változó amelyre $\mathbf{P}(X = 0) = 0$, és $Y := X^{-1}$. Mi a feltétele annak, hogy X és Y azonos eloszlásúak legyenek?
- 8.8 Legyen $X \sim LN(m, \sigma)$ log-normális eloszlású valószínűségi változó, melynek sűrűségfüggvénye

$$f(x) := \mathbb{1}_{(0, \infty)}(x) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp\left\{-\frac{(\log x - m)^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

- (a) Bizonyítsuk be (lehetőleg számolás nélkül), hogy ha $C > 0$ és $\alpha \neq 0$ rögzített konstansok, akkor a $Y := CX^\alpha$ valószínűségi változó szintén log-normális eloszlású, melynek papparaméterei $m' = \alpha m + \log C$ és $\sigma' = \alpha\sigma$.
- (b) Valamely homokfajta részecskéi gömb alakúak, melyeknek átmérője (milliméterben mérve) log-normális eloszlású, $m = -0.5$ és $\sigma := 0.3$ paraméterekkel. Az egész homokmennyiség hány *súlyszázaléka* áll 0.5 mm-nél kisebb átmérőjű szemcsékből?
- 8.9 Legyen az X valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \left(e^{-(x-m)^2/2} + e^{-(x+m)^2/2} \right).$$

(Ez azt jelenti, hogy $X = Y + Z$, ahol Y és Z független valószínűségi változók, $\mathbf{P}(Y = \pm m) = 1/2$ és Z standard normális eloszlású.) Vizsgáljuk meg, hogy m mely értékeire lesz a fenti sűrűségfüggvény unimodális (azaz: egy maximum pontú.)

- 8.10 A következő feladatokban adott a ξ valószínűségi változó eloszlásfüggvénye, ill. sűrűségfüggvénye. Meg kell határozni az ξ függvényeként értelmezett X, Y, Z valószínűségi változók sűrűségfüggvényét
 - (a) ξ egyenletes eloszlású a $[0, 1]$ intervallumban; $X := \xi^2$, $Y := \sqrt{\xi}$.
 - (b) ξ egyenletes eloszlású a $[-1, 1]$ intervallumban; $X := \xi^2$, $Y := \arcsin(\xi)$.
 - (c) ξ egyenletes eloszlású a $[-1, 1]$ intervallumban; $X := |\xi|$, $Y := \sqrt{1 - \xi^2}$.
 - (d) ξ exponenciális eloszlású λ paraméterrel; $X := 1 - \xi$, $Y := \xi^3$, $Z := \ln(\xi)$.
 - (e) ξ standard Cauchy eloszlású; $X := \xi^2$, $Y := \xi^{-2}$.

- 8.11 Bizonyítsuk be, hogy ha ξ Cauchy eloszlású valószínűségi változó, melynek sűrűségfüggvénye $f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$, és $X := 1/\xi$, $Y := 2\xi/(1 - \xi^2)$, $Z := (3\xi - \xi^3)/(1 - 3\xi^2)$, akkor X, Y és Z szintén Cauchy eloszlású.
Útmutatás: Használjuk a következő trigonometriai azonosságokat: ha $\xi = \operatorname{tg}(\alpha)$, akkor $1/\xi = \operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - \alpha)$, $2\xi/(1 - \xi^2) = \operatorname{tg}(2\alpha)$ és $(3\xi - \xi^3)/(1 - 3\xi^2) = \operatorname{tg}(3\alpha)$

- 8.12 Egy \mathbb{N} -értékű X valószínűségi változó k -adik *faktoriális momentuma* $\mathbf{E}(X(X-1)(X-2)\dots(X-k+1))$. Sok esetben a faktoriális momentumokat könnyebb kiszámolni, mint a momentumokat. De nyilvánvaló, hogy minden $k \in \mathbb{N}$ -re a k -adik momentum kifejezhető az első k faktoriális momentum segítségével. Számoljuk ki a binomiális-, Poisson- és geometriai eloszlások faktoriális momentumait. (Adjunk zárt kifejezést tetszőleges $k \in \mathbb{N}$ -re.)
- 8.13 Számoljuk ki az $E(-1, 1)$, $N(0, \sigma)$, $EXP(\lambda)$ eloszlások momentumait. (Szorgalmasabbaknak ajánljuk az $LN(m, \sigma)$ eloszlást is.) Adjunk zárt formulát $k \in \mathbb{N}$ -re. Kommentáljuk a momentumok aszimptotikus viselkedését mikor $k \rightarrow \infty$.
- 8.14 Legyen X standard Cauchy eloszlású, melynek sűrűségfüggvénye $f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$. Nyilvánvaló, hogy $\mathbf{E}(|X|) = \infty$, de bármely $\varepsilon > 0$ -ra $\mathbf{E}(|X|^{1-\varepsilon}) < \infty$. Számoljuk ki a $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\{ \varepsilon \mathbf{E}(|X|^{1-\varepsilon}) \right\}$ határértéket (ha egyáltalán létezik ...).
- 8.15 Legyen X_λ Poisson eloszlású valószínűségi változó, melynek várható értéke $\mathbf{E}(X_\lambda) = \lambda$. Számoljuk ki az $Y_\lambda := \sqrt{X_\lambda}$ valószínűségi változó szórásának határértékét, amint $\lambda \rightarrow \infty$.
- 8.16 Egy \mathbb{N} -értékű X valószínűségi változó *generátor függvénye* $g_X : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g_X(z) := \mathbf{E}(z^X) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k \mathbf{P}(X = k)$. (A generátorfüggvény analitikusan kiterjeszthető a komplex sík $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ nyílt egységkörére.) Számoljuk ki a binomiális, Poisson- és geometriai eloszlások generátor függvényét.
- 8.17 Egy tetszőleges X valószínűségi változó *karakterisztikus függvénye* $\varphi_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi_X(t) := \mathbf{E}(e^{itX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF_X(x)$. (Az integrál abszolút konvergencia – ergo: a karakterisztikus függvény jól értelmezett – bármely valószínűségi változóra!) Számoljuk ki a $BIN(p, n)$, $POI(\lambda)$, $GEO(p)$, $E(a, b)$, $N(m, \sigma)$, $EXP(\lambda)$, $CAU(m, b)$ eloszlások karakterisztikus függvényét.