

Matematika A4

XII. gyakorlat

Vetier András kurzusa

2006. november 30.

1. Általános regresszió

Adott (X, Y) kétdimenziós valószínűségi változó az együttes eloszlásával (például folytonos esetben sűrűségfüggvényével). X -et megfigyelve Y -t szeretnénk közelíteni egy $k(X)$ alakú tippelő függvénnyel. A közelítés azt jelenti, hogy az elkövetett $(Y - k(X))^2$ négyzetes hiba átlagát szeretnénk minimalizálni. Pontosabban azt a k függvényt keressük, amire

$$E((Y - k(X))^2)$$

minimális. Az órán tanult tétel kimondja, hogy ebben az esetben a megoldás a feltételes várható érték:

$$k(x) = E(Y | X = x).$$

Ha pedig az elkövetett abszolút hibát, azaz $E(|Y - k(X)|)$ -t szeretnénk minimalizálni, akkor a lehető legjobb tippelés az Y feltételes mediánja. A feltételes sűrűségfüggvény

$$f_{2|1}(y|x) = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, v) dv}$$

amelynek az első esetben a várható értékét kell kiszámolni, a második esetben a feltételes eloszlásfüggvényt $(F_{2|1}(y|x) = \int_{-\infty}^y f_{2|1}(v|x) dv)$ kell $\frac{1}{2}$ -del egyenlővé tenni és belőle y -t mint x függvényét kifejezni.

Feladatok:

1. A Duna holnaputáni budapesti vízállását akarjuk becsülni a mai bécsi vízállásból. Bár a két vízállás közt szoros kapcsolat van, azért pontosan nem lehet megmondani a vízállást, mindkettőt egy-egy valószínűségi változó írja le. Tegyük fel, hogy mindkét vízállást egy 0 és 1 közti számmal tudunk jellemezni, melynek legyen az együttes eloszlásfüggvénye $f(x, y) = \frac{6}{5}(x + (y - 1)^2)$ ahol $0 < x < 1$ és $0 < y < 1$.
 - a) Határozzuk meg a budapesti vízállás eloszlását a bécsi ismeretében, azaz mi a feltételes sűrűségfüggvény?
 - b) Mi annak a valószínűsége, hogy budapesten alacsonynak nevezhető (azaz 0 és $1/2$ közé esik) a vízállás, ha Bécsben x volt? (Mennyi ez $x = 1/3$ -ra?)
 - c) ha már ismerjük a bécsi vízállást, mire tippelünk a budapestire, ha a lehető legkisebb négyzetes hibát akarjuk elkövetni?
 - d) és ha az abszolút hibát akarjuk minimalizálni?
2. $X = RND1, Y = RND1 * RND2$ eloszlás esetén láttuk, hogy az együttes sűrűségfüggvény $f(x, y) = 1/x$, ha $0 < y < x < 1$ háromszögön vagyunk. Mi a regressziós görbe, ha az abszolút hibát, illetve ha a négyzetes hibát szeretnénk minimalizálni?
3. Az egységkörön választunk egyenletes eloszlás szerint egy (X, Y) pontot. Az X koordinata ismeretében hogyan közelítené $|Y|$ -t, feltéve, hogy a hiba abszolútértékének szertné minimalizálni?

4. Többpártrendszer esetén az egyes pártokra leadott szavazatok százalékos aránya valószínűségi változó. A Zöldek az összes szavazatok X , a Demokraták az összes szavazatok Y hányadát kapják, együttes eloszlásuk $h(x, y) = 24xy$, ha $0 < x, 0 < y, x + y < 1$.
Ha a Demokraták az összes szavazatok 40%-át kaptak, mire tippelünk, mennyit kaptak a zöldek?

2. Lineáris regresszió

A gyakorlatban gyakran nem tudjuk az együttes sűrűségfüggvényt meghatározni. Ilyenkor könnyebb lehet a várható értéket, a szórást, a kovarianciát kiszámolni. Ezek segítségével már meg tudjuk mondani, hogy melyik az a lineáris függvény, amivel tippelve a hiba négyzetének a várható értéke a legkisebb.

$$y - E(Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma^2(X)}(x - E(X)).$$

Ez egy kicsit másképp:

$$\frac{y - E(Y)}{\sigma(Y)} = R(X, Y) \frac{x - E(X)}{\sigma(X)}.$$

ahol $R(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$ az X és a Y korrelációs együttható. Ha $|R(X, Y)| = 1$, akkor a két valószínűségi változó közt lineáris függés van, ha 0, akkor nincs függés (azaz a két valószínűségi változó független, erről még lesz szó).
A kovariancia definíciója:

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

Kibontva a zárójeleket:

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

A kovariancia mátrixban az i . oszlop j . sorában az i . és a j . valószínűségi változó kovarianciája áll, vagyis ez egy szimmetrikus mátrix, melynek főátlójában pedig épp a szórásnégyzetek helyezkednek el, azaz két valószínűségi változóra ez így néz ki:

$$\begin{pmatrix} \sigma^2(X) & \text{cov}(X, Y) \\ \text{cov}(X, Y) & \sigma^2(Y) \end{pmatrix}$$

Feladatok:

5. Egy kétdimenziós valószínűségi változó sűrűségfüggvénye $\frac{1}{6}xy$ ($0 < x < 2, x < y < 2x$). Milyen $k(y)$ függvénnyel érdemes a második koordinátából az elsőt tippelni, ha az a célunk, hogy a tippelésnél elkövetett hiba négyzetének átlagos értéke sok kísérlet esetén minél kisebb legyen,
- ha feltesszük, hogy $k(y)$ lineáris,
 - ha $k(y)$ tetszőleges valós lehet?
- 6.* Ugyanaz a probléma, mint az előző feladatban, de most a tippelő függvényünk csak $c\sqrt{y}$ alakú lehet?

Segítse: itt a

$$m(c) = E((X - c\sqrt{Y})^2) = E(X^2) + c^2E(Y) - 2cE(X\sqrt{Y}) = E(X^2) + E(Y)(c^2 - \frac{E(X\sqrt{Y})^2}{E(Y)}) - \frac{E(X\sqrt{Y})^2}{E(Y)}$$

függvényt kell minimalizálni, ahol c változhat.

7. X és Y együttes sűrűségfüggvénye $h(x, y) = 60xy^2$, ha $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$. Határozzuk meg a kovarianciájukat!
Tegyük fel, hogy a második koordinátát tudjuk megfigyelni és az elsőt ezen megfigyelt adattól függően becsüljük az $x = \frac{2}{3}(1 - y)$ képlet alapján. Van-e ennél jobb módszer, ha négyzetes eltérés hibáját akarjuk minimalizálni?

8. Az (X, Y) kovarianciamátrixa $\begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ Van-e lineáris kapcsolat X és Y között?
9. Statisztikai adatok alapján annak a valószínűsége, hogy ikerszületéskor mindkét gyerek fiú, 0.32, annak a valószínűsége, hogy mindkét gyermek lány, 0.28. Annak a valószínűsége, hogy az első iker fiú és a második lány ugyanannyi, mint fordítva. Jelölje X illetve Y az első, illetve a második gyerek nemét, legyen a felvett értékük fiú esetén 1, lány esetén 0. Számítsuk ki az X és a Y korrelációs együtthatóját! Hogyan tippelnénk Y ismeretében X -re lineáris függvénnyel, ha a tippelés átlagos hibáját akarjuk minimalizálni?
10. Legyen (X, Y) egyenletes eloszlású a $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 2)$ pontok által meghatározott háromszögön. Számítsuk ki Y -nak X -ra vonatkozó regressziós függvényét!
11. Statisztikai adatok alapján annak a valószínűsége, hogy ikerszületéskor mindkét gyerek fiú, 0.32, annak a valószínűsége, hogy mindkét gyermek lány, 0.28. Annak a valószínűsége, hogy az első iker fiú és a második lány ugyanannyi, mint fordítva. Jelölje X illetve Y az első, illetve a második gyerek nemét, legyen a felvett értékük fiú esetén 1, lány esetén 0. Számítsuk ki az X és a Y korrelációs együtthatóját! Hogyan tippelnénk Y ismeretében X -re lineáris függvénnyel, ha a tippelés átlagos hibáját akarjuk minimalizálni?
- 12.* Legyenek X és Y két véges szórasú valószínűségi változó. Legyen $A = X + Y$, $B = X - Y$ Bizonyítsa be, hogyha tudjuk, hogy B -nek A -ra vonatkozó regressziós egyenese konstans, akkor a X és Y szórasa egyenlő!
13. Magyarországon a 18 év feletti férfiak testmagasságának átlagos értéke 178 cm, szórása 10 cm. nőknél ugyanazek az adatok: 166 cm, és 8 cm. Focimeccseken a drukkerok 10%-a nő, a többiek férfiak. Mindkét nem testmagasságának eloszlását normalis eloszlásúnak véve:
- Mi annak a valószínűsége, hogy egy 170 cm-nel alacsonyabb szurkoló nő?
 - Adja meg x függvényében annak a valószínűségét, hogy egy x cm magas drukker férfi!
 - Hogyan tippeljünk a szurkolók testmagasságából a nemükre, ha a celunk az, hogy a lehető legnagyobb valószínűséggel helyesen tippeljünk?