

SZÁSZ DOMOKOS, BÁLINT PÉTER

BME Matematika Intézet

**ERGODELMÉLET ÉS
DINAMIKAI RENDSZEREK**

I. rész

Készült a

TÁMOP-4.1.2.-08/2/A/KMR-2009-0027

pályázat támogatásával

Lektorálta: Krámlí András

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés. Alapfogalmak és példák	3
2. Poincaré rekurrencia tétele. Ergodtételek	11
3. További példák. Ergodikus leképezések	18
4. Stacionárius sorozatok mint dinamikai rendszerek, Bernoulli-sorozatok	22
5. Keverés és kinetika	27
6. A tórusz algebrai automorfizmusa	30
7. Hopf geometriai módszere	35
8. Invariáns mérték létezése	38
9. Markov-leképezések	43
10. Kolmogorov–Arnold–Moser tétel	50
11. A homológikus egyenlet megoldása. A kis nevezők problémája	54
12. Az invariáns tórusz formális felírása	57
13. Feladatok	60

1. fejezet

Bevezetés. Alapfogalmak és példák

Ebben az jegyzetben dinamikai rendszeren időben *determinisztikusan* fejlődő — diszkrét vagy folytonos idejű — rendszert értünk.

1.1 Definíció. Legyen (M, \mathcal{F}) mérhető tér, azaz M az alaphalmaz, dinamikai rendszerünk fázistere, és \mathcal{F} M részhalmazainak σ -algebrája. Az (M, \mathcal{F}, T) hármast, ahol $T: M \rightarrow M$, *endomorfizmusnak* nevezzük, ha T mérhető, azaz $\forall A \in \mathcal{F}$ -re $T^{-1}A \in \mathcal{F}$.

1.2 Definíció. Az (M, \mathcal{F}, T) hármast, ahol $T: M \rightarrow M$, *automorfizmusnak* nevezzük, ha T és T^{-1} is endomorfizmusok.

Klasszikus példa dinamikai rendszerre a Naprendszer, amelynek mozgását a tudósok *stabilnak* tekintették. (Tekintsük valamely dinamikai rendszer két adott, infinitézimálisan közeli fázispontjához tartozó pályákat. Attól függően, hogy az időbeli fejlődés során a pályák távolsága — tipikus pályapár esetén — legfeljebb polinomiálisan illetve legalább (pozitív) exponenciálisan vátozik, a rendszert *stabilnak* illetve *instabilnak* nevezzük.)

A Naprendszer klasszikus mechanikai szempontból az úgynevezett n -test problémával modellezhető, ez alatt n tömegpont (az égitestek) rendszerét értjük, amint azok az egymásra gyakorolt gravitációs erők hatására mozognak. Megoldani, integrálni azonban csak a két-test problémát sikerült, a három-test problémát már nem. Sőt, a könnyített változat, az ún. korlátozott három-test probléma is hosszú ideig ellenállt. A *korlátozott három-test problémánál* feltesszük, hogy a három tömegpont közül az egyik tömege elenyészően kicsi; ekkor reális volt a remény, hogy a megoldást megkaphatjuk mint a két-test probléma ismert megoldásának perturbációját.

A közelítés ésszerűségét szemléltethetjük a Vénusz pályájának számolásával. A Vénusz mozgását elsősorban a Nap gravitációs vonzása határozza meg, de csekély hatást a többi bolygó is gyakorol rá. A Nap körüli ellipszispályát elsősorban a

Jupiter deformálja, azonban ennek átlagos ereje is kisebb mint a Napénak $2 \cdot 10^{-5}$ -szerese. Elsőrendű közelítésben még ezt kell figyelembevennünk, ez éppen a korlátozott három-test-probléma. Finomabb közelítésben azután már a Föld vonzerejével is számolnunk kellene, ez átlagosan a Napénak $4 \cdot 10^{-6}$ -szorosa.

Szóval mi is a helyzet a korlátozott három-test-problémánál az általános esetben? A válasz jóval bonyolultabbnak bizonyult a vártnál, amit a három-test problémánál egyszerűbb, de vele rokon példán szemléltetünk.

1.3 Példa. (A körgyűrű forgatása) Tekintsük az $M = [a, b] \times S$ fázistéren a $T(r, \phi) := (r, \phi + f(r))$ automorfizmust, ahol $0 < a < b$ és $f(r)$ szigorúan monoton növekedő C^1 függvény. (Mivel $S = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, azért az (r, ϕ) polárkoordináta szög-változójában az összeadás mod 1 értelemben szerepel.) Ennek minden $r \in [a, b]$ értékre az $r = \text{const.}$ görbe invariáns görbéje (következésképpen a fázistér „fóliázva” van ezekkel), a rendszer stabil. Az $r = \text{const.}$ invariáns görbéket *invariáns tóruszoknak* is nevezik; topológiailag ezek egydimenziós tóruszok.

1.4 Példa. (A körvonal forgatása) Az előző példa rögtön egy egyszerűbbet is tartalmaz. Tekintsük az $M = S$ körvonalon az $R_\alpha x = x + \alpha$ automorfizmust (ismét mod 1). Ezt nevezik a *körvonal forgatásának*, és α a forgatási szög. Könnyű látni, hogy racionális α esetén minden pont periodikus, irracionális α esetén minden pálya sűrű (ezt a 2. fejezetben bizonyítjuk is).

1.5 Példa. (A körgyűrű diffeomorfizmusa) Visszatérve az 1.3 Példához, a kérdés az, mi történik, ha T helyett a $T_\epsilon := T_\epsilon(r, \phi) := (r + \epsilon\alpha(r, \phi), \phi + f(r) + \epsilon\beta(r, \phi))$ perturbált leképezést vesszük, ahol α és β sima függvények, amelyekkel T_ϵ az M körgyűrű diffeomorfizmusa (azaz az inverz is létezik és differenciálható).

A T_ϵ leképezések tehát a *körgyűrű (az annulus) diffeomorfizmusai* közé tartoznak. Vajon ezeknek is lesznek-e — legalábbis kis ϵ -ra — T -hez hasonlóan M minden pontján keresztül invariáns tóruszai? A válasz, amelyet 1954-ben A. N. Kolmogorov talált, a korábbi várakozáshoz képest rendkívül meglepő volt. A perturbált leképezéseknek valóban megmaradnak bizonyos invariáns tóruszai abban az értelemben, hogy

1. lesznek invariáns Γ görbék, amelyek topológiailag tóruszok,
2. továbbá az ezekre korlátozott leképezésnek az ún. *forgatási száma* (ez a forgatási szög általánosítása, a pontos definíciót l. később) azonos a T automorfizmus valamely $r = r(\Gamma)$ sugárhoz tartozó $f(r)$ forgatási szögével:
3. végül T és T_ϵ azonos forgatási számhoz tartozó invariáns tóruszai egymás alkalmas perturbáltjai.

Mármost, hogy milyen $f(r)$ forgatási szögekhez tartozó invariáns tóruszok maradnak meg, az a szög *számelméleti* tulajdonságaitól függ: minél rosszabbul közelíthető $f(r)$ racionálisokkal, annál nagyobb perturbációnak is ellenáll. Először számítógépes eredmények mutatták, hogy Kolmogorov eredménye az igazságot mutatja abban az értelemben, hogy általában a perturbációnál megmaradó invariáns

tóruszok közötti tartományokban tipikusan olyan *kaotikus*, instabil pályák is előfordulnak, amelyek lezártjai pozitív mértékű halmazok. Kolmogorov óriási érdeme a szokatlan, egészen új jelenség észrevétele, és a bizonyítás alapgondolatának megtalálása. Az analitikus, igen nehéz részletek teljes és matematikailag szigorú kidolgozása, és a feltételek lényeges javítása Arnold (1963) és Moser (1962) eredménye, ezért nevezik az elméletet Kolmogorov–Arnold–Moser, röviden KAM-elméletnek. A későbbiekben egy már egyszerűsített bizonyítást ismertetünk.

A számunkra legérdekesebb dinamikai rendszerek közül soknak a matematikai megközelítés számára igen előnyös további tulajdonsága is van: M -en megadható olyan, gyakran az M topologikus tulajdonságaival összhangban levő *mérték*, amelyet a dinamika *invariánsan* hagy. Ez a helyzet pl. a klasszikus mechanika Hamilton-rendszereinél, ahol az ún. Liouville-mérték mindig invariáns az időbeli fejlődésre vonatkozólag.

1.6 Definíció. Legyen (M, \mathcal{F}) mérhető tér, és rajta adott a μ mérték, amelyet az 1.1 Definíció értelmében vett T endomorfizmus invariánsan hagy (azaz: $\forall A \in \mathcal{F}$ -re $\mu(T^{-1}A) = \mu(A)$). Az (M, \mathcal{F}, μ, T) négyest ugyancsak endomorfizmusnak nevezzük. A szövegösszefüggésből ki fog mindig derülni, vajon van-e invariáns mérték, avagy nincs, pontosabban gondolunk-e rá avagy nem. Ugyancsak, ha ezt külön nem említjük, a μ mértékről feltesszük, hogy valószínűségi mérték, azaz $\mu(M) = 1$.

1.7 Definíció. Az (M, \mathcal{F}, μ, T) négyest *automorfizmusnak* nevezzük, ha T és T^{-1} is endomorfizmusok.

Az 1.3 és 1.4 Példákban a Lebesgue-mérték invariáns, míg az 1.5 Példában tipikusan nincs sima invariáns mérték.

1.8 Példa. (Gauss-leképezés) Tekintsük az $I := [0, 1)$ egységintervallum következő transzformációját:

$$Tx = \left\{ \frac{1}{x} \right\}$$

ahol $\{x\} = x - [x]$ az x szám törtrésze. Ez a leképezés nemcsak az 1.1 Definíció értelmében endomorfizmus, hanem következő Lemmánk szerint az 1.6 Definíció értelmében is.

1.9 Lemma. *A Gauss-leképezésnek van sima invariáns mértéke, amelynek sűrűségfüggvénye*

$$\rho(x) = \frac{1}{(1+x) \log 2}.$$

Bizonyítás. Ha van invariáns mérték, akkor az $(y, y + dy)$ intervallum mértéke egyrészt $\rho(y) dy$, másrészt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \rho(x_k) |dx_k| = \sum_{k=1}^{\infty} \rho(x_k) x_k^2 dy$$

ahol $x_k := (k + y)^{-1}$: $1 \leq k$ az $y = Tx$ egyenlet megoldásai. Innen

$$\rho(y) = \sum_{k=1}^{\infty} \rho(x_k) x_k^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \rho\left(\frac{1}{k+y}\right) \frac{1}{(k+y)^2}.$$

Elemi számolás már adja, hogy a Lemmában szereplő sűrűség megoldja a kapott függvényegyenletet. \square

A Gauss leképezés alapvető szerepet játszik a lánc törtek metrikus elméletében.

1.10 Példa. (Intervallumleképezések) Az 1.8 Példa sugallja a következő leképezéscsalád bevezetését. Legyen $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ C^1 -függvény, amelyre a $Tx := \{f(x)\}$ módon értelmezett $T: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ endomorfizmus végesen invertálható (azaz $\forall y \in [0, 1]$ -re a $Tx = y$ egyenletnek véges sok megoldása van). Az így bevezetett leképezéseket nevezzük *intervallumleképezéseknek*. Mivel a lehető legalacsonyabb-dimenziósak, ezért — matematikai vagy akár számítógépes — tanulmányozásuk viszonylag egyszerűbb, ugyanakkor már ezek is rendkívül gazdag viselkedést mutatnak. Sőt ugyanez elmondható a még egyszerűbb $f(x) := \mu x(1-x)$ ($\mu > 0$) kvadratikus függvény által definiált családra. Később látni fogjuk, hogy ezen leképezések akkor viselkednek ergodikus, kaotikus, sztochasztikus módon, ha létezik sima invariáns mértékük. A Gauss leképezésnél leírt módon itt is könnyű felírni az esetleg létező invariáns mérték $\rho(y)$ sűrűségfüggvényére az egyenletet. Nevezetesen:

$$\rho(y) = \sum_{x: Tx=y} \frac{\rho(x)}{|T'(x)|}$$

A jobb oldali operátort (itt nem mondtuk meg, milyen térben értelmeztük) nevezik *Perron–Frobenius–Ruelle-operátornak*, és ennek fixpontja a keresett sűrűség.

A valószínűségszámításból jól ismert az $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $f(x) = 2x \pmod{1}$ függvény által definiált ún. **bináris-** (vagy **diadikus-**) leképezés. Igen fontosak a szakaszonként C^1 f -függvények által értelmezett intervallumleképezések is.

Csak említjük a kétdimenziós analitikus leképezéseket, amelyek, ha lehet, még az intervallumleképezéseknél is gazdagabb viselkedést mutatnak. Egyszerű példa itt is a kvadratikus család: $Tz := z^2 + c$ ahol $c \in \mathbb{C}$ (nyilván $T: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$).

További fontos példákkal a következő fejezetekben is megismerkedünk.

Mese a Naprendszerre vonatkozó legújabb szimulációkról.

Az 1994-es párizsi Matematikai Fizikai Világkongresszuson J. Laskar francia kutató meglepő eredményekről számolt be. Lényeges állítása, hogy a Naprendszer jövőbeli fejlődését 100 millió évre előre tudják számolni, és ez egyben elvi korlát is. Igen érdekes elvi újdonság, hogy a stabilnak hitt rendszerben kaotikus oszcillációk is megjelennek. Nevezetesen pl. a Mars forgástengelyének iránya végez ilyet. Ez természetesen az időjárásra is hat, ami erősen csökkenti az élet kialakulásának esélyeit. Ugyanezt a kaotikus oszcillációt mutatta a Föld forgástengelye is, amikor a rendszerből kihagyták a Föld holdját. Ez arra utal, hogy a Föld mozgásának

stabilitása, beleértve a Föld forgástengelyének szabályos változását, annak következménye, hogy Földünk viszonylag nehéz Holddal rendelkezik.

Folytonos paraméterű dinamikai rendszerek

Differenciálegyenletekből származtatott dinamikai rendszereknél az idő folytonos. Ezért természetes az egyparaméteres leképezés(fél)csoportok bevezetése.

1.11 Definíció. Legyen $(M, \mathcal{F}, \mu, S^{\mathbb{R}})$ egyparaméteres automorfizmuscsoport, azaz legyen $\forall t \in \mathbb{R}$ -re S^t automorfizmus, és teljesüljön $\forall t, s \in \mathbb{R}$ és $x \in M$ -re: $S^{t+s}x = S^t(S^s x)$. $S^{\mathbb{R}}$ folyam, ha $\forall f: M \rightarrow \mathbb{R}$ mérhető függvényre $f(S^t x)$ mérhető $M \times \mathbb{R}$ -en.

Az előző definícióban az \mathbb{R} paramétertartományt \mathbb{R}_+ -szal helyettesítve az értelemeszerű változtatásokkal kapjuk a $S^{\mathbb{R}_+}$ endomorfizmus-félcsoport, másnéven fél-folyam fogalmát.

1.12 Példa. (A tórusz feltekerése) Ez a körvonal forgatásának általánosítása. Itt $M := \mathbb{T}^d \simeq \mathbb{R}^d / \mathbb{Z}^d$, μ a Lebesgue-mérték, és

$$S_\alpha^t x := x + t\alpha \quad (\text{mod } \mathbb{T}^d)$$

ahol $\alpha \in S^d$ tetszőleges.

Ugyanezt a transzformációt tekinthetjük csak diszkrét időpontokban

$$T_\alpha^n := x + n\alpha \quad (\text{mod } \mathbb{T}^d). \quad (1.1)$$

Ez a *tórusz eltolása*, ami általában a csoport-eltolás speciális esete (l. 3.8 Példa).

A fenti példa egyben utal azokra az általános konstrukciókra, amelyekkel diszkrét és folytonos idejű dinamikai rendszerek között természetes kapcsolatot lehet teremteni.

1.13 Definíció. (A felfüggesztett folyam) Legyen (M, \mathcal{F}, μ, T) automorfizmus a 1.2 Definíció értelmében, és $f: M \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f \in L_1(\mu)$ (azaz nemnegatív és integrálható) függvény. Folyamunk fázistere

$$M_f = \{(x, s) | x \in M, 0 \leq s \leq f(x)\} / \sim; \quad (x, f(x)) \sim (Tx, 0),$$

és $S^t(x, s) = (x, s + t)$, $\forall (x, s) \in M_f, t \in \mathbb{R}$. Közvetlenül ellenőrizhető, hogy $\mu_f = (\int_M f d\mu)^{-1} \cdot \mu \times \text{Leb}$ invariáns valószínűségi mérték, azaz $(M_f, \mathcal{F}_f, \mu_f, S^{\mathbb{R}_+})$ folyam a 1.11 definíció értelmében ($\mathcal{F}_f = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$, ahol \mathcal{L} a Lebesgue-mérhető halmazok σ -algebrája). Az így kapott automorfizmus-csoportot az $f(x)$ *tetőfüggvényhez* tartozó *felfüggesztett folyamnak* (angolul suspension flow) hívjuk.

A felfüggesztett folyamnak sokszor létezik természetes "inverz konstrukciója" is. Legyen $(M, \mathcal{F}, \mu, S^{\mathbb{R}})$ folyam, és $N \in \mathcal{F}$ "kellően szép" halmaz, melyre (i) $\mu(N) = 0$, de N -n természetes módon értelmezhető egy \mathcal{F}_N σ -algebra, melyen μ mérték természetes módon indukál egy μ_N mértéket; (ii) μ_N -majdnem minden

$x \in N$ esetén a $\{t \in \mathbb{R}^+ | S^t x \in N\}$ halmaz nem üres, diszkrét részhalmaza \mathbb{R}^+ -nak. (Ezt garantálja például, ha M Riemann sokaság, μ a Lebesgue mértékre abszolút folytonos, N pedig egy a folyam irányára transzverzális hiperfelület M -ben.) Ekkor μ_N -majdnem $x \in N$ esetén értelmezhető $\tau(x) = \min\{t > 0 | S^t x \in N\}$, és $T_N x = S^{\tau(x)} x$. Az így kapott $(N, \mathcal{F}_N, \mu_N, T_N)$ automorfizmust *Poincaré leképezésnek*, N -t pedig *Poincaré szelésnek* hívjuk.

Visszatérve a 1.12 példához, a $(d$ -dimenziós) tórusz feltekerését megkaphatjuk, mint a $(d - 1$ dimenziós) tórusz eltolásához tartozó felfüggesztett folyamot, az $f(x) \equiv 1$ tetőfüggvénnyel. Fordítva, a tórusz eltolását megkaphatjuk a tórusz feltekeréséből, mint az $N = \{x_1 = 0\}$ Poincaré szeléshez tartozó Poincaré leképezést.

Tekintsünk még egy példát egyparaméteres automorfizmuscsoportra.

1.14 Példa. (Az inga fázisképe) Tekintsünk egy ℓ hosszúságú fonálra felfüggesztett $m = 1$ tömegű pontszerű tömeget. Jelöljük q -val az inga kitérésének szögét, p -vel momentumát, ami az adott esetben egyben sebessége is. Egyszerű elvekből következően

$$\begin{cases} \dot{q} = p \\ \dot{p} = -\omega^2 \sin q, \end{cases} \quad (1.2)$$

ahol $\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$.

Rendszerünk, amely így is írható:

$$\ddot{q} + \omega^2 \sin q = 0$$

Hamilton-rendszer, és Hamilton-függvénye

$$H(p, q) = \frac{p^2}{2} + (1 - \cos q)\omega^2.$$

Valóban

$$\begin{cases} \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}, \end{cases}$$

és így

$$\frac{dH(p, q)}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p} \dot{p} + \frac{\partial H}{\partial q} \dot{q} = 0$$

miatt $H = H(p(t), q(t))$ mozgásállandó. Tehát az (1.2) egyenlet megoldásai a $H = \text{constans}$ görbék mentén változnak. Emellett a q szögváltozó 2π -periodikus, így a fázistér a $(-\infty < p < \infty, 0 \leq q < 2\pi)$ hengerpalásttal azonosítható.

Az (1.2) rendszernek két fixpontja, azaz szinguláris pontja van, vagyis ahol $(\dot{q}, \dot{p}) = 0$; ezek $(p_1 = 0, q_1 = 0)$, $(p_2 = 0, q_2 = \pi)$ (az első az inga legalsó, a másik a legfelső helyzete). Mindkét fixpont környezetében tekinthetjük e rendszer lineáris


közelítését. Ezek

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & -\omega^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = D_1 \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} \\ \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & \omega^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = D_2 \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{1.3}$$

D_1 sajátértékei: $\lambda_1 = \pm i\omega$, D_2 -éi: $\lambda_2 = \pm\omega$.

Az első esetben a linearizált egyenlet valós megoldásai $p(t) = C\omega \cos(\omega t + \varphi)$, $q(t) = C \sin(\omega t + \varphi)$, ezek ellipsziseken változnak ($\frac{1}{\omega^2}p^2 + q^2 = C^2$), a második esetben $p(t) = C\omega \operatorname{ch}(\omega t + \varphi)$, $q(t) = C \operatorname{sh}(\omega t + \varphi)$; ezek viszont hiperbolákon változnak ($\frac{1}{\omega^2}p^2 - q^2 = C^2$).

A lineáris közelítések azonban csak a fixpontok közelében írják le jól a pályákat, globálisan így néz ki a fáziskép:



1. ábra. Az inga fázisképe

Valóban, a $H = H(p, q) = \frac{p^2}{2} + (1 - \cos q)\omega^2$ energia konstans lévén, $H > 2\omega^2$ esetén a mozgás forgás jellegű, p sehol sem lehet nulla, q monoton módon változik; $0 < H < 2\omega^2$ esetén ($p = 0$, $q = \arccos(1 - \frac{H}{\omega^2})$) pontja az orbitnak, a mozgás lengő jellegű.

$H = 2\omega^2$ esetén a megoldás a $\frac{p^2}{2} = \omega^2(1 + \cos \varphi)$ görbepáron, az ún. szeparatrixon változik. A $(0, 0)$ fixpont elliptikus, a $(0, \pi)$ fixpont hiperbolikus, a szeparatrix $(\pi, 0)$ -beli érintői épp az (1.3)-ban szereplő D_2 lineáris operátor sajátirányai.

Függelék

Mérhető tér, valószínűségi mező. Ha M tetszőleges nem-üres halmaz, akkor M részhalmazainak egy \mathcal{F} családját σ -algebrának nevezzük, ha (i) $\emptyset \in \mathcal{F}$, (ii) minden $A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}$ esetén $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$, és végül (iii) ha $A \in \mathcal{F}$, akkor

$A^c \in \mathcal{F}$ (másszóval \mathcal{F} zárt a megszámlálható egyesítés és a komplementképzés műveleteire nézve). A $\mu: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}_+$ függvényt *mértéknek* nevezzük, ha tetszőleges $A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}$, $A_n \cap A_m = \emptyset$ ($n \neq m$) esetén $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$. A μ mérték *valószínűségi*, ha $\mu(M) = 1$. Az (M, \mathcal{F}) pár neve *mérhető tér*, az (M, \mathcal{F}, μ) hármasé *mértékes tér* (illetve *valószínűségi mező*, ha μ valószínűségi mérték.) Nem jelentős megszorítás, ezért a továbbiakban mindenütt feltesszük, hogy a szereplő *mértékek teljesek*, azaz ha $B \subset A$, és $\mu(A) = 0$, akkor egyúttal $B \in \mathcal{F}$ (és következésképp $\mu(B) = 0$). Ha M topologikus tér (pl. metrikus tér, vagy speciálisan az euklideszi tér), akkor a nyílt halmazok által generált σ -algebra az ún. *Borel σ -algebra*. Ha – Riemann-sokaságok, így pl. ismét az euklideszi tér esetén – az alapul vett mérték a Riemann-mérték, illetve a Lebesgue-mérték — akkor a szóban forgó mértéknek egyetlen legszűkebb teljes kiterjesztése van (az euklideszi esetben a megfelelő σ -algebrát a *Lebesgue σ -algebrának* és az ott értelmezett mértéket pedig *Lebesgue-mértéknek* nevezzük).

Integrálhelyettesítés. A Perron–Frobenius–Ruelle operátor levezetésénél már használtuk és a jövőben is sokszor alkalmazzuk az alapvető integrálhelyettesítési azonosságot. Legyen (M, \mathcal{F}, μ) valószínűségi mező, (M', \mathcal{F}') mérhető tér, $f: M \rightarrow M'$ mérhető leképezés és $\phi: M' \rightarrow \mathbb{R}$ mérhető függvény. Akkor

$$\int_M \phi(f(x))\mu(dx) = \int_{M'} \phi(y)\mu(f^{-1}(dy)) \quad (1.4)$$

áll, valahányszor bármelyik oldalon szereplő integrál létezik. A $df_*\mu(y) = \mu(f^{-1}dy)$ M' -n értelmezett mértéket a μ mérték előretoltjának is hívjuk (definíció szerint $\forall A \in \mathcal{F}'$ esetén $f_*\mu(A) = \mu(f^{-1}A)$). Speciálisan, ha M és M' is egy intervallum \mathbb{R} -ben, μ abszolút folytonos a Lebesgue mértékre $\rho(x)$ sűrűségfüggvénnyel, és az f leképezés (szakaszonként) folytonosan differenciálható, akkor $f_*\mu$ is abszolút folytonos a Lebesgue mértékre, és $\rho'(y)$ sűrűségfüggvénye a

$$\rho'(y) = \sum_{x: fx=y} \frac{\rho(x)}{|f'(x)|}$$

képlettel számolható.

2. fejezet

Poincaré rekurrencia tétele. Ergodtételek

A legegyszerűbb kérdés, amely már a 19. században is foglalkoztatta a dinamikai rendszerekkel foglalkozó kutatókat: visszatérnek-e előbb-utóbb a fázispontok saját-maguk kis környezetébe. A periodikus pontok persze ilyenek, de ezekből általában viszonylag kevés van. Poincaré egyszerű tétele igen általános, mert topológiát sem feltételez.

2.1 Tétel. (Poincaré rekurrencia tétele, 1899) Legyen (M, \mathcal{F}, μ, T) tetszőleges endomorfizmus, és $A \in \mathcal{F}$. Ekkor A μ -majdnem minden pontja visszatérő, azaz μ -m. m. $x \in A$ -ra $\exists n \in \mathbb{Z}_+$, hogy $T^n x \in A$.

2.2 Következmény. A μ -m. m. pontja erősen is visszatérő, azaz végtelen sokszor visszatér A -ba.

Bizonyítás. Poincaré tétele miatt minden n -re T^n is visszatérő, azaz $\exists B_n$, hogy $\mu(B_n) = 0$ és $A \setminus B_n$ -en T^n visszatérő. $A \setminus \bigcup_1^\infty B_n$ pontjai végtelen sokszor térnek vissza A -ba. □

2.1 Tétel bizonyítása. Legyen $N \subset A$ a nem-visszatérő pontok halmaza:
$$N := A \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} T^{-k} A \right) = A \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} T^{-k} (M \setminus A) \right).$$

Állítjuk, hogy $\forall n \in \mathbb{Z}_+$ -ra $N \cap T^{-n} N = \emptyset$. Valóban, ha $x \in N \cap T^{-n} N$ lenne, akkor $x \in A$ és egyúttal $T^n x \in A$ lenne, így x is visszatérő volna, ellentétben N definíciójával.

Az előbbi állítás következménye: $\forall 0 \leq k < l$ -re

$$T^{-k} N \cap T^{-l} N = T^{-k} (N \cap T^{-(l-k)} N) = \emptyset$$

tehát $N, T^{-1}N, \dots, T^{-n}N, \dots$ páronként diszjunktak, ezért μ végessége miatt $\mu(N) = 0$. □

Poincaré rekurrencia tételéhez is kapcsolódik az alábbi indukált leképezések fogalma (érdemes összevetni a felfüggesztett folyam, illetve a Poincaré leképezés fogalmával az előző fejezetből).

Legyen (M, \mathcal{F}, μ, T) endomorfizmus és $A \subset M$, $\mu(A) > 0$.

2.3 Definíció. (Derivált leképezés) $T_A: A \curvearrowright$

$$T_A x = T^{n(x)} x$$

ahol $n(x) = \min\{k \geq 1 \mid T^k x \in A\}$ (Poincaré rekurrencia miatt: $\mu(x \in A \mid n(x) = \infty) = 0$).

2.4 Tétel. $(A, \mathcal{F}_A, \mu_A, T_A)$ endomorfizmus, ahol $\mu_A(B) = \mu(A \cap B)/\mu(A)$.

Legyen most (M, \mathcal{F}, μ, T) endomorfizmus, és $f: M \rightarrow \mathbb{N}$ mérhető.

Legyen $M_f := \{(x, k) \mid x \in M, 1 \leq k \leq f(x)\} \subset M \times \mathbb{N}$. \mathcal{F}_f - a szorzat által generált σ -algebra. $\mu_f(A \times \{k\}) = \mu(A)$, ha $x \in A$ -ra $f(x) \geq k$.

2.5 Definíció. (Primitív (vagy torony) leképezés) Torony vagy primitív leképezés:

$$T_f: M_f \curvearrowright \quad T_f(z, k) = \begin{cases} (x, k+1) & \text{ha } k < f(x) \\ (Tx, 1) & \text{ha } k = f(x). \end{cases}$$

2.6 Tétel. Ha $\mu(M) < \infty$, és $f \in L_1$, akkor $\mu_f(M_f) = \int_M f(x) d\mu(x)$.

2.7 Tétel. $(M_f, \mathcal{F}_f, T_f, \mu_f)$ mértéktartó.

2.8 Feladat. T_f derivált leképezése az $M \times \{1\}$ halmazon éppen T .

Poincaré tételének egyszerű alkalmazása: tekintsük a körvonal forgatását (1.4 Példa). Ha $\alpha = r/s$ racionális, akkor $R_\alpha^s = \text{Id}$, és minden pont periodikus. Tekintsük irracionális α esetét. 2.1 Tételt alkalmazva az $A := (-\delta, \delta)$ halmazra, látjuk, hogy $\exists x \in A$ és $\exists n$, hogy $-\delta < (0 \neq) x + n\alpha \pmod{1} < \delta$. Tehát $-2\delta < n\alpha \pmod{1} < 2\delta$. Innen már azonnal adódik, hogy $\forall x \in S$ -re a $\{x + n\alpha \pmod{1}\}$ halmaz sűrű S -en. (Megjegyezzük, hogy az $\{x + n\alpha \pmod{1}\}$ halmaz sűrű volta közvetlenül is könnyen belátható pusztán azt használva, hogy irracionális α esetén e halmaz nem lehet véges.)

Igen gyakran olyan dinamikai rendszereket vizsgálunk, ahol a fázistér topologikus struktúrával is rendelkezik; egyszerűség kedvéért ilyenkor itt mindig feltesszük, hogy M lokálisan kompakt, szeparábilis metrikus tér. \mathcal{F} jellemzően a Borel σ -algebra, T endomorfizmusról pedig feltesszük, hogy folytonos.

2.9 Definíció. Legyen T folytonos endomorfizmus. Az $X \subset M$ részhalmazt *minimálisnak* nevezzük, ha nem tartalmaz valódi, nem-üres, zárt, T -invariáns részhalmazt. Ha maga M minimális halmaz, akkor a T -t *minimális endomorfizmusnak* nevezzük. A minimalitás ekvivalens jellemzése: minden pont pályája sűrű M -ben. A T endomorfizmust *topologikusan tranzitívnek* nevezzük, ha van olyan $x \in M$ fázispont, amelynek a pályája sűrű M -ben.

Minimális endomorfizmus nyilván topologikusan tranzitív. Előbbi észrevételünk értelmében a körvonal irracionális forgatása minimális, így topologikusan tranzitív is.

Boltzmann ergodik hipotézise és Neumann ergodtétele

Ludwig Boltzmann a 19. század 70-es éveiben a statisztikus fizika megalapozásán dolgozva megfogalmazta az ún. *ergodikus hipotézist*. Legyen M_N valamely N szabadsági fokú mechanikai rendszer fázistere, és ezen $f_N: M_N \rightarrow \mathbb{R}$ egy mérés. Rendszerünkről tegyük fel, hogy egyensúlyban van, tehát M_N -en adva van egy μ_N egyensúlyi, vagyis invariáns mérték (a Liouville mérték). Boltzmann hipotézise szerint, ha rendszerünk nagy ($N \gg 1$), a megfigyelések időbeli átlaga konvergál a térbeli, egyensúlyi átlagértékhez, azaz formálisan

$$1/T \int_0^T f(T^s x) ds \rightarrow \int_M f(x) d\mu(x)$$

hacsak $T, N \rightarrow \infty$. Mind a rendszer „nagy” voltára vonatkozó feltevés, mind a használt konvergenciafogalom matematikailag tisztázatlanok voltak. Bármennyire is fontos volt és matematikailag is izgalmasnak tűnt az ergodikus hipotézis, mégis csak több mint 50 év elteltével sikerült megtenni az első igazi lépéseket.

Legyen (M, \mathcal{F}, μ, T) tetszőleges endomorfizmus, és $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ valamilyen „mérés”, azaz a fázistéren értelmezett, alkalmas feltételeknek eleget tevő függvény. Az ergodicitás matematikai modellezéséhez fontos lökést adott Koopman ötlete. A dinamikai rendszereket természetes módon pontleképezéseként értették, mi is így vezettük be a fogalmat. Koopman 1929-ben a következő egyszerű átfogalmazást javasolta: A pontleképezés helyett tekintsük a

$$(\hat{T}f)(x) := f(Tx)$$

– lineáris – függvénytranszformációt, mondjuk az $L_p = \{f: \|f\|_p := (\int_M (|f|^p) d\mu)^{1/p} < \infty\}$ függvénytéren. (\hat{T} -t a T leképezés által *indukált operátornak* nevezzük.) A μ mérték invarianciájának közvetlen folyománya, hogy \hat{T} izometria, azaz $\|\hat{T}f\|_p = \|f\|_p$ és így $\|\hat{T}\|_p = 1$. Az indukált leképezés objektuma könnyen kezelhető volt a funkcionálanalitikus megközelítés számára, hiszen a funkcionálanalízis a 20-as évek végére, részben éppen Neumann János munkásságának is köszönhetően, jól értett, természetes eszközzé vált a matematikában.

2.10 Megjegyzés. Ha egy $\hat{T}: L_p \rightarrow L_p$ izometria adott, természetes kérdés, vajon van-e olyan $T: M \rightarrow M$, amely indukálná \hat{T} -t. A válasz általában nem, viszont ha (M, \mathcal{F}, μ) ún. Lebesgue-tér, akkor igen. A Lebesgue-terek tanulmányozása azonban most nem célunk.

2.11 Tétel. (Neumann L_2 -ergodtétele, 1932) *Tetszőleges $f \in L_2$ függvényhez létezik $\bar{f} \in L_2$ invariáns függvény, hogy*

$$\|A_n f - \bar{f}\|_2 \rightarrow 0$$

ahol $A_n f = \frac{1}{n}(f + \hat{T}f + \dots + \hat{T}^{n-1}f)$ (Az $f \in L_p$ függvény invariáns, ha $f = \hat{T}f$.)
 Igaz továbbá, hogy \bar{f} az f elem L_2 -beli ortogonális vetülete az invariáns függvények alterére. Végül $\int f \, d\mu = \int \bar{f} \, d\mu$.

2.12 Definíció. A T endomorfizmust *ergodikusnak* nevezzük, ha bármely $f \in L_2$ függvényre $\bar{f} = \text{const}$. (Miótán általában az L_p -függvények csak μ -m.m. értelmezettek, azért ezek egyenlőségéről is csak ilyen értelemben beszélünk). Innen azonnal következik, hogy T csak akkor ergodikus, ha minden invariáns függvény konstans.

Ergodikus leképezésre a 2.11 Tétel harmadik állítása miatt $\int f \, d\mu = \bar{f}$, vagyis az első állítás így szól

$$\frac{1}{n}(f + \hat{T}f + \dots + \hat{T}^{n-1}f) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L_2} \int f \, d\mu.$$

Tehát rögzített dinamikai rendszerre épp Boltzmann hipotézisének állítását nyerjük – itt L_2 konvergenciában. E megjegyzés már mutatja az ergodtételek és az ergodicitás fogalmának rendkívül fontos voltát, most térjünk rá Neumann-tételének bizonyítására.

2.11 Tétel bizonyítása. Egyszerű lépésekben. Legyen $f \in L_2$.

1. A_n kontrakció, azaz $\|A_n f\|_2 \leq \|f\|_2$.
2. Ha $A_n f$ konvergál, akkor $\bar{f} = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n f$ invariáns, mert \hat{T} folytonossága miatt

$$\hat{T}\bar{f} = \hat{T} \lim_{n \rightarrow \infty} A_n f = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} A_{n+1} f - \frac{f}{n} \right) = \bar{f}.$$

3. Jelöljük $E := \{f \in L_2 : A_n f \text{ konvergál } L_2\text{-ben}\}$.

Tételünk fő állítása következni fog az alábbi két tulajdonságból:

- a) E zárt altér;
 - b) E tartalmaz L_2 -ben sűrű részhalmazt.
4. a) bizonyítására tegyük fel, hogy $f_k \in E$ és $\|f_k - f\|_2 \rightarrow 0$. Ekkor

$$\begin{aligned} \|A_n f - A_m f\|_2 &\leq \|A_n(f - f_k)\|_2 + \|(A_n - A_m)f_k\|_2 + \\ &\quad + \|A_m(f_k - f)\|_2 \leq 2\|f - f_k\|_2 + \\ &\quad + \|(A_n - A_m)f_k\|_2. \end{aligned}$$

A jobb oldali első tag tetszőlegesen kicsivé tehető k alkalmas választásával, míg fix k -ra a második tag is tetszőlegesen kicsi, ha n, m elég nagyok. Megjegyezzük még, hogy $\lim_n A_n f$ folytonos $f \in E$ -re, ugyanis $\|A_n f_k - A_n f\|_2 \leq \|f_k - f\|_2$.

5. b) bizonyításához először lássuk be, hogy $f = \hat{T}f$ akkor és csak akkor, ha $f = \hat{T}^*f$. Tegyük fel először, hogy $f = \hat{T}f$. Mivel \hat{T} izometria, $\forall g, h \in L^2$ esetén $(\hat{T}^*Tg, h) = (\hat{T}g, \hat{T}h) = (g, h)$, így $\hat{T}^*\hat{T} = Id$. Így $f = \hat{T}f$ mindkét oldalára hattanva \hat{T}^* -t, következik, hogy $f = \hat{T}^*f$. Tegyük fel most, hogy $f = \hat{T}^*f$. Ekkor $\|f\|^2 = (f, f) = (f, \hat{T}^*f) = (\hat{T}f, f) = (f, \hat{T}f)$, ugyanis $(\hat{T}f, f) = \|f\|^2$ valós. Ekkor viszont $\|f - \hat{T}f\|^2 = \|f\|^2 + \|\hat{T}f\|^2 - 2(f, \hat{T}f) = 0$, tehát $f = \hat{T}f$. Összefoglalva, a \hat{T} és a \hat{T}^* operátoroknak az 1 sajátértékhez tartozó sajátalterei megegyeznek. Ugyanakkor $f = \hat{T}f$ esetén nyilván $f \in E$. Tehát $f = \hat{T}^*f$ esetén $f \in E$.

6. Korlátos A operátorok jól ismert, egyszerű tulajdonsága: $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ -re

$$\text{Cl} [\text{Range} (A - \lambda)] \oplus \text{Ker} (A^* - \bar{\lambda}) = L_2.$$

Innen esetünkben ($A = \hat{T}$, $\lambda = 1$) $\text{Cl} [\text{Range} (I - \hat{T})] \oplus \text{Inv} = L_2$, ahol $\text{Inv} := \{f: f = \hat{T}f\} = \{f: f = \hat{T}^*f\}$. (A felhasznált tulajdonság igazolása: valóban, ha $h \perp \text{Range} (A - \lambda)$, azaz ha $\forall f = Ag - \lambda g$ -re $(h, f) = 0$, akkor $\forall g \in L_2$ -re $0 = (h, Ag - g) = (A^*h - \bar{\lambda}h, g)$, vagyis $h \in \text{Ker} (A^* - \bar{\lambda})$; és a gondolatsor megfordítható.)

7. b) már következni fog abból, hogy $\text{Range} (I - \hat{T}) \subset E$. Ez utóbbi állítás azonban triviális, ugyanis ha $f = g - \hat{T}g$, ekkor

$$A_n f = \frac{1}{n}(g - \hat{T}^n g) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

8. Az eddigiekből az is látszik, hogy $f \in \text{Inv}$ -re $A_n f = f = \bar{f}$, míg $f \in \text{Range}(I - \hat{T})$ -re $\bar{f} = 0$. Innen adódik, hogy bármely $f \in L_2$ -re \bar{f} az $f \in L_2$ elem vetülete az Inv zárt altérre. E megjegyzésből a tétel második állítása nyilvánvaló.

9. A harmadik állítás belátásához tegyük fel, hogy $f = \bar{f} + (I - \hat{T})g$, ahol $\bar{f} \in \text{Inv}$, $g \in L_2$. Ekkor nyilván áll $\int f d\mu = \int \bar{f} d\mu$. Mivel az előbbi alakú f -ek sűrű halmazt alkotnak L_2 -ben, azért a kívánt egyenlőség egész L_2 -n igaz. \square

2.13 Feladat. (L_1 -ergodtétel) Ha T endomorfizmus, akkor $\forall f \in L_1$ -re $\exists \bar{f} \in L_1$ invariáns függvény, hogy $\|A_n f - \bar{f}\|_1 \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) és $\int f d\mu = \int \bar{f} d\mu$.

Utalás. L_2 sűrű altér L_1 -ben.

Az átlag normában vett ergodtételek mellett igaz a m. mindenütt való konvergenciát állító ún. *individuális ergodtétel* is. Ennek bizonyítását a jegyzet második felében közöljük.

2.14 Tétel. (Birkhoff (1931) – Hincsin (1933) ergodtétele) Legyen T endomorfizmus, és $f \in L_1$. Ekkor $\exists \bar{f} \in L_1$ invariáns függvény, hogy $A_n f \rightarrow \bar{f}$ teljesül μ - m. m. és $\int f d\mu = \int \bar{f} d\mu$.

2.15 Megjegyzés. Mindhárom ergodtétel analóg megfogalmazása igaz (i) automorfizmusra és (ii) folytonos paraméterű rendszerekre is. Automorfizmus esetén pl. 2.11 Tétel állítása mellett igaz a következő állítás is: a

$$A_n^- f := 1/n(f + \hat{T}^{-1}f + \dots + \hat{T}^{-n+1}f)$$

jelöléssel élve $\exists \bar{f}^- \in L_2$ invariáns függvény, hogy $\|A_n^- f - \bar{f}^-\|_2 \rightarrow 0$, ($n \rightarrow \infty$), és $\bar{f}^- = \bar{f}$ áll μ -m. m.

Folytonos paraméterű rendszerekre az ergodtétel egyszerű következménye a 2.11 illetve a 2.14 Tételeknek. Valóban elegendő utóbbiakat az $F(x) := \int_0^1 f(S^s x) ds$ függvényekre alkalmaznunk (a Fubini tétel – ld. függelék – miatt $f \in L_1(\mu)$ -ből $F \in L_1(\mu)$ azonnal adódik).

Neumann ergodtételenek kimondása után már bevezettük az ergodicitás fogalmát, és megmutattuk annak alapvető fontosságát. Most megadjuk az ergodicitás fogalmának egy egyszerű átfogalmazását.

2.16 Definíció. (M, \mathcal{F}, μ, T) endomorfizmus esetén az $A \in \mathcal{F}$ halmazt invariánsnak nevezzük, ha χ_A invariáns függvény.

Az A halmaz csak akkor invariáns, ha $\mu(A \Delta T^{-1}A) = 0$. Könnyű látni, hogy az invariáns halmazok σ -algebrát alkotnak, ezt \mathcal{I} -vel jelöljük.

2.17 Lemma. *Az (M, \mathcal{F}, μ, T) endomorfizmus csak akkor ergodikus, ha minden invariáns halmaz triviális, azaz mértéke 0 vagy 1.*

A lemma bizonyítása. Ergodikus T -re $\forall A \in \mathcal{I}$ -re $\chi_A = \text{const}$, ami csakis akkor lehet, ha $\mu(A) = 0$ vagy 1. Tegyük fel, hogy minden invariáns halmaz triviális. Akkor az f invariáns függvényre igaz: minden $c \in \mathbb{R}$ -re az $\{x: f(x) < c\}$ halmazok invariánsok lévén, mértékük 0 vagy 1. Tehát van egy c_0 , hogy $\forall c < c_0$ -ra az említett mérték 0, $\forall c > c_0$ -ra 1. Ekkor $f = c_0$, persze μ majdnem mindenütt. \square

Végül még egy megjegyzést teszünk arra vonatkozóan, mit is jelent az individuális ergodtétel (a 2.14 tétel) ergodikus automorfizmus esetén. Egy $f \in L^1$ függvényre úgy is gondolhatunk, mint egy véges várható értékű valószínűségi változóra. Ekkor $\hat{T}^n f$ is valószínűségi változó minden $n \geq 0$ -ra, ezek a változók a mérték invarianciája miatt azonos eloszlásúak, $A_n f$ pedig az azonos eloszlású változóknak az átlaga. Az individuális ergodtétel szerint $A_n f \rightarrow \int f d\mu = Ef$ μ -m.m. x -re. Ez épp azt jelenti, hogy az átlag egy valószínűséggel konvergál a várható értékhez. Ha a $\hat{T}^n f$ valószínűségi változók függetlenek volnának, épp a nagy számok erős törvénye jelentené ezt a tulajdonságot. Persze a $\hat{T}^n f$ változók általában távolról sem függetlenek, az ergodtétel állítása szerint a nagy számok törvényében a függetlenséget helyettesíthetjük a dinamikai rendszer ergodicitásával.

2.18 Feladat. *Mutassuk meg, hogy ha valamely n -re T^n ergodikus endomorfizmus, akkor T is az. Adjunk példát arra, hogy az állítás megfordítása nem igaz.*

Utalás. $\mu(T^{-n}A\Delta A) \leq \sum_{j=0}^{n-1} \mu(T^{-j+1}A\Delta T^{-j}A)$, ugyanis $d(A, B) := \mu(A\Delta B)$ metrikát definiál a mérhető részhalmazokon.

Függelék

Konvergenciafajták. Véges mértéktér esetén a Hölder egyenlőtlenség miatt $1 \leq p < p'$ -re $\|f\|_p \leq \|f\|_{p'}$ áll, így $L_{p'} \subset L_p$, tehát az L_p -konvergencia következik az $L_{p'}$ -konvergenciából. Továbbá a majdnem mindenütt való konvergencia független az L_p -konvergenciától, hiszen egyrészt pl. $\lim_n b_n = 0$ esetén a $[0, 1]$ -en értelmezett $f_n := a_n \chi_{(0, b_n)}$ függvénysorozat mindenütt tart 0-hoz, ugyanakkor $\|f_n\|_p = b_n^{1/p} |a_n|$, ami tetszőlegesen beállítható, másrészt ha

$$g_n := a_n \chi_{[\frac{k'}{2^m}, \frac{k'+1}{2^m}]}$$

ha $2^m \leq k < 2^{m+1}$ és $k' := k - 2^m$, akkor $\|g_n\|_p = |a_n| (\frac{1}{2^m})^{1/p}$, ami már $a_n = 1$ választással is tart 0-hoz, viszont a függvénysorozat sehol sem konvergens.

Szorzáttér. Legyenek $(X_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ valószínűségi mezők. Ezek szorzata $(X, \mathcal{F}) := (X_1, \mathcal{F}_1, \mu_1) \times (X_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ természetes módon így vezethető be. Egyrészt $X = X_1 \times X_2 := \{(x_1, x_2) : x_1 \in X_1, x_2 \in X_2\}$, másrészt \mathcal{F} az $A_1 \times A_2$: $A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2$ típusú szorzathalmazok által generált σ -algebra. Végül $\mu (= \mu_1 \times \mu_2)$ az egyetlen valószínűségi mérték, amelyre $A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2$ esetén $\mu(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1)\mu_2(A_2)$.

Fubini tétele. Tegyük fel, hogy $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ mérhető függvény. Ha $\phi \in L_1(\mu)$, akkor alkalmas $A_1 \subset X_1$, $\mu(X_1 \setminus A_1) = 0$ és $A_2 \subset X_2$, $\mu_2(X_2 \setminus A_2) = 0$ részhalmazokra $\int_{X_2} \phi(x_1, x_2) \mu_2(dx_2)$ illetve $\int_{X_1} \phi(x_1, x_2) \mu_1(dx_1)$ mérhetőek és végesek A_1 -en illetve A_2 -n, továbbá

$$\begin{aligned} \int_X \phi(x_1, x_2) \mu(dx) &= \int_{X_1} \left(\int_{X_2} \phi(x_1, x_2) \mu_2(dx_2) \right) \mu_1(dx_1) \\ &= \int_{X_2} \left(\int_{X_1} \phi(x_1, x_2) \mu_1(dx_1) \right) \mu_2(dx_2). \end{aligned}$$

3. fejezet

További példák. Ergodikus leképezések

3.1 Tétel. *A körvonal α szöggel való forgatása akkor és csak akkor ergodikus, ha α irracionális.*

Bizonyítás. Legyen az $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos, mérhető függvény Fourier sora $f(x) = \sum_n a_n e^{2\pi i n x}$ (a sor L_2 -értelemben konvergál). Ekkor

$$\hat{R}_\alpha f(x) = f(R_\alpha x) = \sum_n (e^{2\pi i n \alpha} a_n) e^{2\pi i n x}. \quad (3.1)$$

Tudjuk, hogy $f = \hat{R}_\alpha f$ csak akkor, ha $\forall n$ -re $a_n = e^{2\pi i n \alpha} a_n$. Mármost ha $\forall n \neq 0$ -ra $a_n = 0$ teljesül, akkor $f = \text{const}$. Ha ellenben $\exists n_0 \neq 0$ hogy $a_{n_0} \neq 0$, akkor $e^{2\pi i n_0 \alpha} = 1$, ami pontosan akkor áll, ha $\exists k \in \mathbb{Z}$, hogy $n_0 \alpha = k$. Tehát $\alpha \in \mathbb{Q}$. \square

A fenti tételből következik a körvonal forgatásának néhány további érdekes tulajdonsága. Poincaré tételének alkalmazásaként megkaptuk az $n\alpha \pmod{1}$ sorozat sűrű voltát irracionális α esetén. Az ergodtétel következménye lesz viszont

3.2 Tétel. (Weyl tétele, 1916) *Legyen α irracionális. Ekkor $\forall I \subset S$ intervallumra $n \rightarrow \infty$ esetén*

$$1/n \sum_{k=1}^n \chi_I(\{n\alpha\}) \rightarrow \mu(I)$$

ahol μ a Lebesgue-mérték.

3.3 Feladat. (V. Arnold) *Tekintsük az $1, 2, \dots, 2^n, \dots$ számsorozat tízes számrendszerben felírt alakjának első jegyeit. Előfordul ezek között a 7? A 8? Ha igen, melyik gyakoribb? (Útmutatás: $\log_{10} 2$ irracionális.)*

R_α ergodicitásának és Birkhoff–Hincsin tételének folyománya, hogy μ -m.m. x -

re

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \chi_I(\{x + k\alpha\}) \rightarrow \mu(I) \quad (3.2)$$

ha $n \rightarrow \infty$. Itt azonban igaz az erősebb

3.4 Tétel. (3.2) teljesül $\forall x \in S$ -re.

Innen $x = 0$ választással már adódik Weyl tétele is (3.2 Tétel).

Bizonyítás.

3.5 Definíció. Az $\{x_n: x_n \in S, n \in \mathbb{Z}_+\}$ sorozat egyenletes eloszlású, ha tetszőleges $I \subset S$ intervallumra

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \chi_I(\{x_k\}) \rightarrow \mu(I).$$

Először szükséges és elégséges feltételt adunk arra, hogy az $\{x_n\}$ sorozat egyenletes eloszlású legyen.

3.6 Lemma. Az $\{x_n\}$ sorozat csak akkor egyenletes eloszlású, ha $\forall f \in C(S)$ függvényre

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) \rightarrow \int_S f d\mu. \quad (3.3)$$

A lemma igazolását későbbre halasztva bizonyítsuk tételünket. Legyen $f \in C(S)$. 3.1 Tételből következik, hogy μ -m.m. $x \in S$ -re

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\{x + k\alpha\}) \rightarrow \int f d\mu \quad (n \rightarrow \infty). \quad (3.4)$$

Megmutatjuk, hogy e konvergencia $\forall x \in S$ -re is áll. Valóban legyen $\bar{x} \in S$ olyan pont, amelyre (3.4) igaz, és legyen $x \in S$ tetszőlegesen rögzített. Mivel $\{\{\bar{x} + n\alpha\}\}$ sűrű, ezért alkalmas $\bar{k} = \bar{k}(\delta)$ -ra $\text{dist}(\{\bar{x} + \bar{k}\alpha\}, x) < \delta$. Igaz viszont

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\{x + k\alpha\}) - \frac{1}{n + \bar{k}} \sum_{k=1}^{n+\bar{k}} f(\{\bar{x} + k\alpha\}) \right| \leq \\ & \leq \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n [f(\{x + k\alpha\}) - f(\{\bar{x} + (k + \bar{k})\alpha\})] \right| + \\ & \quad + \frac{\bar{k}}{n + \bar{k}} \max |f| + \frac{\bar{k}}{n(n + \bar{k})} \sum_{k=1}^{n+\bar{k}} |f(\{\bar{x} + k\alpha\})|. \end{aligned} \quad (3.5)$$

f egyenletes folytonossága miatt a jobb oldali első összeg $< \frac{\varepsilon}{3}$, ha δ elég kicsi. A második és harmadik tag viszont ránézésre $< \frac{\varepsilon}{3}$, ha n elég nagy. Következésképpen (3.4) $\forall x \in S$ -re igaz. \square

Bizonyítsuk végül a 3.6 Lemmát. Tegyük fel, hogy (3.3) áll $\forall f \in C(S)$ -re és igazoljuk, hogy $\{x_n\}$ egyenletes eloszlású. Jelöljük: $\nu_n(I) := \sum_{k=1}^n \chi_I(x_k)$. Fix $\varepsilon > 0$ -ra válasszuk meg az f_* és $f^* \in C(S)$ függvényeket, hogy

$$(i) \quad f_*(x) \leq \chi_I(x) \leq f^*(x) \quad \forall x \in S\text{-re,}$$

$$(ii) \quad \int_S (f^* - f_*) d\mu < \varepsilon.$$

Ekkor $\sum_{k=1}^n f_*(x_k) \leq \nu_n(I) \leq \sum_{k=1}^n f^*(x_k)$, azaz

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_*(x_k) \leq \frac{\nu_n(I)}{n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^*(x_k).$$

Itt (3.3) miatt a bal és jobb oldal konvergál $n \rightarrow \infty$ esetén $\int f_* d\mu$ -höz illetve $\int f^* d\mu$ -höz. Sőt

$$\mu(I) - \varepsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\nu_n(I)}{n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\nu_n(I)}{n} \leq \mu(I) + \varepsilon,$$

mivel $\int f_* d\mu \leq \mu(I) \leq \int f^* d\mu$. Az állítás megfordításának igazolását már elég vázolni. $\{x_n\}$ egyenletessége azt jelenti, hogy (3.3) áll intervallumok indikátorfüggvényeire. Következően (3.3) igaz lesz ilyenek véges lineáris kombinációira is. Viszont ezekkel már minden $f \in C(S)$ jól közelíthető L_1 -ben – alulról és felülről is, így az előbbi gondolatmenet – mutatur mutandis – elismételhető. \square

A körvonal forgatásának többdimenziós általánosítása volt a tórusz eltolása (1.12 Példa).

A 3.1 Tétel bizonyításának gondolata átvihető, így érvényes a

3.7 Tétel. *A tórusz (1.12)-gyel értelmezett eltolása akkor és csak akkor ergodikus, ha $1, \alpha_1, \dots, \alpha_d$ racionálisan függetlenek, ahol $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$.*

Ugyanígy általánosítható 3.4 Tétel, 3.5 Definíció, és 3.6 Lemma is.

További általánosítási lehetőségként megemlíthjük a csoport-eltolás automorfizmust.

3.8 Példa. *A csoport-eltolás.*

Legyen M kompakt topológikus csoport és μ a Haar-mérték M -en (a Haar-mérték fogalmáról ld. a 6. fejezet elejét). Tetszőleges rögzített $g \in G$ -re legyen

$$T_g x = g \cdot x.$$

Ekkor $(\mathbb{M}, \mathcal{F}, T_g, \mu)$ automorfizmus. Ez a példa egyben általánosítása a tórusz feltekerésének (1.12 Példa).

3.9 Feladat. *Mi T_g ergodicitásának feltétele, ha G Abel-csoport?*

3.10 Feladat. (Simányi–Szász) *Legyen (M, \mathcal{F}) mérhető tér, G csoport. Legyen adott minden $g \in G$ -re egy (M, \mathcal{F}, T_g) automorfizmus. Az $(M, \mathcal{F}, T_G) = \{(M, \mathcal{F}, T_g) : g \in G\}$ családot csoport-hatásnak nevezzük, ha $\forall g_1, g_2 \in G$ -re $T_{g_1 g_2} = T_{g_2} T_{g_1}$ (a G csoport hat az M téren). Tetszőleges $x \in M$ esetén az x G -pályájának nevezzük a $Gx := \{T_g x : g \in G\}$ halmazt.*

Legyen adott $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{R}^d$, és tekintsük \mathbb{R}^d -ben az α -ra ortogonális g vektorok \mathbb{R}^{d-1} -el izomorf additív G csoportját. Hason \mathbb{R}^d -n a G csoport a következőképpen: $\forall g \in G, x \in \mathbb{R}^d$ -re

$$T_g x = g + x.$$

\mathbb{R}^d -t faktorizálva \mathbb{Z}^d szerint végül is \mathbb{T}^d -n kapunk egy G -hatást. Bizonyítsuk be, hogy

- (1) G -nek csak akkor van \mathbb{T}^d -ben sűrű pályája, ha az α koordinátái között van kettő lineárisan független (és akkor minden pálya sűrű);
- (2) Az előbbi feltétel mellett a pályák aszimptotikusan egyenletes eloszlásúak (mit is jelent ez?);
- (3) ** Legyen adott $U \subset \mathbb{R}^d$ nyílt halmaz. Bizonyítsuk be, hogy van olyan véges F halmaza az α -knak, hogy ha $\alpha \notin F$, akkor $G = G_\alpha$ minden pályája metszi az U halmazt.

A 3.4 Tétel bizonyításában döntő szerepe volt a forgatás következő, (3.5)-ben kihasznált tulajdonságának: ha két fázispont távolsága $< \delta$, akkor ez érvényes marad összes képeikre is! A *kezdeti feltételekre való érzéketlenség*, amely itt igen erős és egyenletes, dinamikai rendszerek stabil viselkedésének alapvető jellemzője. Az 5. fejezetben látni fogjuk, hogy a körvonal forgatása, bár ergodikus, de az ennél valamivel erősebb keverő tulajdonsággal már nem rendelkezik.

4. fejezet

Stacionárius sorozatok mint dinamikai rendszerek, Bernoulli-sorozatok

Legyen $M = E^{\mathbb{Z}}$ (vagy $M = E^{\mathbb{Z}^+}$) ahol E véges vagy megszámlálható halmaz. $x \in M$ tehát így írható: $x = (\dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots)$. *Hengerhalmaznak* nevezzük a $H \subset M$ részhalmazt, ha alkalmas $\ell \geq 1$ -re, $i_1 < i_2 < \dots < i_\ell$ indexekre és $E_1, \dots, E_\ell \subset E$ részhalmazra

$$H = \{x \in M : x_{i_1} \in E_1, \dots, x_{i_\ell} \in E_\ell\}.$$

Jelölje \mathcal{F} a hengerhalmazok által generált σ -algebrát, és legyen μ valószínűségi mérték \mathcal{F} -en. (Szokás általánosabban hengerhalmaznak nevezni a

$$H = \{x \in M : (x_{i_1}, \dots, x_{i_\ell}) \in E\}$$

halmazokat, ahol $E \subset E^\ell$ tetszőleges mérhető részhalmaz. Az ezek által generált σ -algebra természetesen ugyancsak \mathcal{F} .)

4.1 Definíció. A μ mérték stacionárius, ha tetszőleges H hengerhalmazra és $\forall k \in \mathbb{Z}$ -re

$$\mu\{x_{i_1} \in E_1, \dots, x_{i_\ell} \in E_\ell\} = \mu\{x_{i_1+k} \in E_1, \dots, x_{i_\ell+k} \in E_\ell\}.$$

4.2 Definíció. A $(Tx)_i = x_{i+1}$ összefüggéssel értelmezett $T: M \rightarrow M$ automorfizmust bal-eltolásnak (bal-shiftnek) nevezzük. Analóg módon értelmezhető a T bal-eltolás, ha $M = E^{\mathbb{Z}^+}$, amely ekkor csak endomorfizmus, mert nyilvánvaló módon nem invertálható.

Könnyű látni, hogy az (M, \mathcal{F}) -en adott μ mérték csak akkor stacionárius, ha invariáns a T bal-eltolásra nézve.

Hasonlóan értelmezhetjük az $M = E^{\mathbb{Z}^+}$ téren is a bal-eltolást, amely most endomorfizmus.

4.3 Definíció. Ha a μ stacionárius mérték egyúttal szorzatmérték, azaz $\forall \ell, i_1 < \dots < i_\ell, E_1, \dots, E_\ell$ választásra

$$\mu\{x_{i_1} \in E_1, \dots, x_{i_\ell} \in E_\ell\} = \prod_{j=1}^{\ell} \mu\{x_{i_j} \in E_j\},$$

akkor a 4.2 Definícióban definiált automorfizmust Bernoulli-automorfizmusnak nevezünk. (Analog a Bernoulli-endorfizmus fogalma.)

Az 1.10 Példában már szó esett a $T: [0, 1) \rightarrow [0, 1)$ $Tx = \{2x\}$ bináris leképezésről. Legyen $x \in [0, 1)$ bináris előállítás $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{2^{i+1}}$, amit szimbolikusan így írhatunk: $x = (x_0, x_1, \dots)$. Könnyű látni, hogy akkor $Tx = (x_1, x_2, \dots)$, azaz T ugyanúgy hat mint a bal-eltolás. Pontosabban:

4.4 Definíció. Az $(M_i, \mathcal{F}_i, \mu_i, T_i): i = 1, 2$ endomorfizmusokat izomorfaknak (konjugáltaknak) nevezünk, ha $\exists M'_i \subset M_i$, hogy $\mu_i(M_i \setminus M'_i) = 0$ és $\exists \varphi: M'_1 \rightarrow M'_2$ 1-1 értelmű leképezés, hogy $\forall A_i \subset M'_i, A_i \in \mathcal{F}_i$ ($i = 1, 2$)-re

$$\mu_1(\varphi^{-1}A_2) = \mu_2(A_2) \quad (*) \text{ és } \mu_2(\varphi A_1) = \mu_1(A_1)$$

továbbá M'_1 -n áll: $\varphi T_1 = T_2 \varphi$ (*) és M'_2 -n áll: $T_1 \varphi^{-1} = \varphi^{-1} T_2$.

A fenti tulajdonságot szokás kommutatív diagramban is ábrázolni:

$$\begin{array}{ccc} M_1 & \xrightarrow{T_1} & M_1 \\ \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi \\ M_2 & \xrightarrow{T_2} & M_2 \end{array}$$

Megjegyzés: Amennyiben φ nem invertálható, és az utóbbi relációpárok közül csak a (*)-gal jelletteket követeljük meg, akkor az endomorfizmusokat szemi-konjugáltaknak nevezünk.

Legyen speciálisan $M_1 = [0, 1), M_2 = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}^+}$, $T_1 x = \{2x\}$, $T_2(x_0, x_1, \dots) = (x_1, x_2, \dots)$, μ_1 a Lebesgue mérték és μ_2 az $\left(\frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1\right)$ mértékek szorzata. Ekkor könnyű látni, hogy a két endomorfizmus izomorf. Az izomorfia fogalmára vonatkozólag könnyű gyakorlat:

4.5 Lemma. *Ergodikusknak lenni izomorfia-invariáns tulajdonság.*

Így a bináris leképezés ergodicitása következni fog egy általános tételből.

4.6 Tétel. *Minden Bernoulli-endorfizmus (-automorfizmus) ergodikus.*

Térjünk rá a 4.6 Tétel bizonyítására. Előrebocsátunk egy egyszerű feladatot.

4.7 Feladat. *A mérhető halmazok σ -algebráján*

$$\rho(X, Y) = \mu(X \Delta Y) \tag{4.1}$$

szemi-metrika (azaz $\rho(X, Y) = 0$ -ból nem feltétlen következik $X = Y$). Ugyanakkor az egymástól nullmértékű halmazban különböző mérhető részhalmazok ekvivalenciaosztályain már a fenti ρ metrika.

Bizonyítás. Legyen $A \in \mathcal{I}$. A mértékelméletből (vagy a valószínűségszámításból) jól ismert a következő approximációs tulajdonság: $\forall A \in \mathcal{F}$ -hez és $\forall \varepsilon > 0$ -hoz található olyan $\ell \in \mathbb{Z}_+$ és $A_\ell \in \mathcal{F}$ hengerhalmaz, amely ilyen alakú: alkalmas $\tilde{A}_\ell \subset E^{\ell+1}$ -lél

$$A_\ell = \{x \in M : (x_0, x_1, \dots, x_\ell) \in \tilde{A}_\ell\} \quad (4.2)$$

és emellett $\mu(A \Delta A_\ell) < \varepsilon$ (azaz a szorzattér bármely mérhető halmaza tetszőlegesen jól közelíthető (véges tartójú) hengerhalmazzal). A stacionaritás következtében $\mu(T^{-n} A \Delta T^{-n} A_\ell) < \varepsilon$ ($n \in \mathbb{Z}_+$). Ha $A \in \mathcal{I}$, akkor

$$\mu(A) = \mu(A \cap T^{-n} A) = \mu(A_\ell \cap T^{-n} A_\ell) + [\mu(A \cap T^{-n} A) - \mu(A_\ell \cap T^{-n} A_\ell)]. \quad (4.3)$$

Mármost $|\mu(X \cap Y) - \mu(U \cap V)| \leq \mu(X \Delta U) + \mu(Y \Delta V)$ (amiből valójában az következik, hogy $\mu(X \cap Y)$ mindkét változójában folytonos) miatt

$$|\mu(A \cap T^{-n} A) - \mu(A_\ell \cap T^{-n} A_\ell)| \leq \mu(A \Delta A_\ell) + \mu(T^{-n}(A \Delta A_\ell)) < 2\varepsilon \quad (4.4)$$

így

$$|\mu(A) - \mu(A_\ell \cap T^{-n} A_\ell)| < 2\varepsilon.$$

Azonban elég nagy n -re, egészen pontosan $n > l$ -re – használva, hogy T Bernoulli-eltolás – $\mu(A_\ell \cap T^{-n} A_\ell) = (\mu(A_\ell))^2$, ezért $\forall \varepsilon > 0$ -ra

$$|\mu(A) - (\mu(A))^2| < |\mu(A) - (\mu(A_\ell))^2| + |(\mu(A))^2 - (\mu(A_\ell))^2| < 2\varepsilon + 2\varepsilon = 4\varepsilon.$$

Tehát $\mu(A) = 0$ vagy 1 . □

A 4.5 Lemmából és a 4.6 Tételből adódik a

4.8 Következmény. A bináris leképezés ergodikus.

Analóg módon tárgyalható a

4.9 Példa. (A pék automorfizmusa) Itt $M = [0, 1]^2$, μ a Lebesgue-mérték, és $(u, v) \in M$ -re

$$T_1(u, v) := \begin{cases} (\{2u\}, v/2) & \text{ha } 0 \leq u < 1/2 \\ (\{2u\}, \frac{v+1}{2}) & \text{ha } 1/2 \leq u < 1. \end{cases}$$

A leképezés így hat: először az egységnégyzetet az u -tengely irányában 2-szeresére nyújtjuk, és egyúttal a v -tengely irányában $1/2$ -szeresére zsugorítjuk (a terület invariáns marad!), majd a kapott téglalapnak az egységnégyzetből kilógó felét annak felső felébe toljuk párhuzamosan. (A pék megközelítőleg valami ilyet csinál.) A T_1 automorfizmus a *pék automorfizmusa*.

Tekintsük a következő Bernoulli-eltolást: $M = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$, μ ismét az $(\frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1)$ mértékek szorzata, és T_2 a bal-eltolás. Könnyű látni, hogy a

$$\phi((\dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots)) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x_i}{2^{i+1}}, \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_{-i}}{2^i} \right)$$

egyenlettel értelmezett $\phi: M_2 \rightarrow M_1$ leképezés izomorfia, ezért 4.5 Lemmából és a 4.6 Tételből ismét adódik a

4.10 Következmény. A pék automorfizmusa ergodikus.

Az ergodicitás itt 4.6 Tételből jön. Lehetséges más bizonyítás is, amely a geometriai képen alapszik, nevezetesen azon, hogy a pék automorfizmusa az egyik irányban nyújt, a másikban zsugorít. Ezt a mechanizmust *hiperbolikus viselkedésnek* nevezzük. Eberhard Hopf ezt kihasználó geometriai módszerét a 7. fejezetben tárgyaljuk.

Befejezésül még egy megjegyzés. Fenti módszerünk így is értelmezhető: a számunkra érdekes dinamikák (bináris leképezés, a pék automorfizmusa, ...) helyett a sorozatok terén keresünk velük izomorf eltolást. Ez utóbbi gyakran áttekinthetőbb objektum, általános struktúra, és tanulmányozásához felhasználhatóak pl. az algebra, a kombinatorika, valamint — a mérték stacionaritása miatt — a valószínűségszámítás, sőt az információelmélet illetve a statisztikus fizika (egydimenziós rendszerek) eredményei is. Fontossága miatt az objektumnak, illetve a módszernek külön neve van: *szimbolikus dinamika*. A módszert a 70-es években Bowen, Ruelle és Sinai alapozták meg, és azóta is rendkívül széles körben alkalmazzák a dinamikai rendszerek tanulmányozása során.

Végül megemlítünk a \mathcal{I} σ -algebra mellett egy másik fontos σ -algebrát, az ún. *farok σ -algebrát*. A fogalom motivációja a független valószínűségi változókra vonatkozó Kolmogorov-féle 0 – 1 törvény. Legyen $\{X_i, i \in \mathbb{Z}\}$ független, azonos eloszlású valószínűségi változók sorozata, és jelölje minden $k \in \mathbb{Z}$ esetén $\mathcal{F}_k = \sigma(\dots, X_{k-1}, X_k)$, a legszűkebb σ algebrát, melyre az X_i , $-\infty < i \leq k$ valószínűségi változók mindegyike mérhető. Ekkor (i) $\mathcal{F}_{k-1} \subset \mathcal{F}_k$, (ii) az $\mathcal{F} = \bigvee_{k=0}^{\infty} \mathcal{F}_k$ σ -algebrára nézve minden, a valószínűségi változó sorozatra vonatkozó esemény mérhető, (iii) a $\mathcal{T} = \bigcap_{k=0}^{\infty} \mathcal{F}_{-k}$ farok- σ -algebra triviális (épp ezt mondja a Kolmogorov-féle 0 – 1 törvény).

4.11 Definíció. Az (M, \mathcal{F}, μ, T) Bernoulli endomorfizmus \mathcal{T} farok σ -algebrája

$$\mathcal{T} := \bigcap_{n \geq 0} \mathcal{F}_n,$$

ahol \mathcal{F}_n a következő típusú H hengerhalmazok által generált σ -algebra: alkalmas $\tilde{H} \in E^{\ell+1}$ -re

$$H := \{x \in M : (x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+\ell}) \in \tilde{H}\}.$$

Automorfizmusok esetén \mathcal{T} mellett létezik még $T^{-1} \mathcal{T}$ -farok σ -algebrája is, amely nem feltétlenül azonos \mathcal{T} -vel.

Igen hasznos az egyszerű

4.12 Lemma. $\mathcal{I} \subset \mathcal{T}$.

Bizonyítás. Valóban, ha $A \in \mathcal{I}$, akkor alkalmas $\tilde{A} \in E^{\mathbb{Z}^+}$ -ra

$$A = \{x \in M : (x_0, x_1, \dots) \in \tilde{A}\}.$$

Azonban $\forall n \geq 0$ -ra $A = T^{-n}A \pmod{0}$, vagyis

$$A = \{x \in M : (x_n, x_{n+1}, \dots) \in \tilde{A}\} \pmod{0}.$$

Tehát $\forall n \geq 0$ -ra $A \in \mathcal{F}_n$, következésképp $A \in \mathcal{T}$. □

A lemma jelentősége abban áll, hogy bizonyos esetekben \mathcal{T} trivialisága is igaz, sőt ezt könnyebb közvetlenül bizonyítani mint \mathcal{I} -ét (lásd 4.6 Tétel bizonyítását).

Egy megjegyzés a bináris leképezésről.

Korábban a bináris leképezést kétféle felfogásban is tekintettük: egyrészt mint a $[0, 1]$ intervallum, másrészt mint a körvonal endomorfizmusát és mindkét objektumot azonosítottuk $[0, 1)$ -gyel. Az előbbi esetben a leképezés szakadásos, a másodikban sima (más az intervallum és más a körvonal topológiája!). Ha a körvonalat (1-re normált, így 1 periódusú) szögváltozó értelmezési tartományának fogjuk fel, akkor tehát a 1.10 Példabeli jelöléssel élve $f(\theta) = 2\theta$. Ezt a leképezést kiterjeszthetjük a sík leképezésévé a következőképpen: legyenek r, θ polár-koordináták, és legyen

$$f^*(r, \theta) := (r^{\frac{1}{2}}, 2\theta).$$

$r = 1$ -t helyettesítve azt látjuk, hogy $f^*(1, \theta) = (1, 2\theta) = (1, f(\theta))$.

4.13 Példa. Hogyan viselkednek $n \rightarrow \infty$ esetén az $(f^*)^n(r, \theta)$ pályák?

5. fejezet

Keverés és kinetika

Célunk a *keverés* fogalmának bevezetése, amely az ergodicitásnál valamivel erősebb sztohasztikus tulajdonság. Fontos alkalmazása: biztosítja a szóbanforgó dinamikai rendszer egyensúlyhoz való tartását alkalmas kezdeti mértékek esetén (ezt nevezik a *kinetika* problémájának).

Az ergodtétélekből folyik, hogy az (M, \mathcal{F}, μ, T) ergodikus endomorfizmusra $f \in L_2$ esetén

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x) = \int f \, d\mu = c \quad (5.1)$$

teljesül μ -m.m. $x \in M$ -re és L_2 -értelemben is. Lévén $g \in L_2$ -re $\|(A_n f)g - cg\|_1 \leq \|A_n f - c\|_2 \|g\|_2$, (5.1)-ből egyúttal

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int f(T^k x)g(x) \, d\mu = \int f \, d\mu \int g \, d\mu \quad (5.2)$$

is következik.

5.1 Lemma. (5.2) *ekvivalens* T ergodicitásával.

Bizonyítás. Valóban, legyen $A \in \mathcal{I}$, $f = g = \chi_A$. Akkor (5.2)-ből kapjuk: $\mu(A \cap A) = \mu(A) \cdot \mu(A)$, ahonnan $\mu(A) = 0$ vagy 1. \square

5.2 Definíció. A T endomorfizmus keverő, ha $\forall f, g \in L_2$ párra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f(T^n x)g(x) \, d\mu = \int f \, d\mu \int g \, d\mu.$$

Standard gondolattal igaz az

5.3 Lemma. A T endomorfizmus csak akkor keverő, ha $\forall A, B \in \mathcal{F}$ -re

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A \cap T^{-n}B) = \mu(A)\mu(B).$$

Innen egyszerűen adódik az

5.4 Lemma.

- (1) *Keverőnek lenni izomorfia-invariáns tulajdonság.*
- (2) *A keverésből következik az ergodicitás.*

Bizonyítás. (1) a definíció közvetlen következménye. (2) így látható be: a keverésből azonnal következik (5.2), így az 5.3 Lemma miatt az ergodicitás is. \square

Keverő leképezések alappéldái a Bernoulli-endomorfizmusok.

5.5 Tétel. Minden Bernoulli-endomorfizmus (automorfizmus) keverő.

Bizonyítás. 4.6 Tétel bizonyításának módszere a keverést is kiadja. Valóban, az ott is használt approximációs tulajdonság miatt $\forall A, B \in \mathcal{F}$ -re és $\forall \varepsilon > 0$ -ra van (4.2) alakú A_ℓ illetve B_ℓ , hogy $\mu(A\Delta A_\ell), \mu(B\Delta B_\ell) < \varepsilon$. Ekkor

$$\mu(A \cap T^{-n}B) = \mu(A_\ell \cap T^{-n}B_\ell) + [\mu(A\Delta T^{-n}B) - \mu(A_\ell\Delta T^{-n}B_\ell)].$$

Mármost, ha $n > \ell$, akkor $\mu(A_\ell \cap T^{-n}B_\ell) = \mu(A_\ell)\mu(B_\ell)$, viszont (4.4)-hez hasonlóan

$$|\mu(A \cap T^{-n}B) - \mu(A_\ell \cap T^{-n}B_\ell)| < 2\varepsilon$$

vagyis elég nagy n -re

$$|\mu(A \cap T^{-n}B) - \mu(A)\mu(B)| < 4\varepsilon. \quad \square$$

Ugyanakkor a körvonal forgatása nem keverő.

5.6 Lemma. Ha α irracionális, akkor T_α nem keverő.

Bizonyítás. Legyen $A = B = I = [a, b] \subset S$ tetszőleges intervallum. $\{n\alpha\}$ sűrű S -en (l. 2.1 Tétel bizonyítása után), így minden ε -hoz található alkalmas n_k részsorozat, mely mentén $|\mu(I \cap T^{-n_k}I) - \mu(I)| < \varepsilon$, ami $0 < \mu(I) < 1$ esetén ellentmondana $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(I \cap T^{-n}I) = \mu^2(I)$ -nek. \square

Nézzük a keverés tulajdonságának egy egyszerű, de fontos alkalmazását. Legyen $(M, \mathcal{F}, \mu, T^{\mathbb{R}_+})$ leképezés-félcsoport, de a $t = 0$ időpontban indítsuk rendszerünket a μ_0 nem-invariáns mértékből. Ekkor $t(> 0)$ időben rendszerünk eloszlása így adható meg: $A \in \mathcal{F}$ -re

$$\mu_t(A) = \mu_0\{x: T^t x \in A\} = \mu_0(T^{-t}A).$$

Tegyük fel, hogy μ_0 abszolút folytonos az invariáns μ -re nézve, és tegyük fel, hogy $\frac{d\mu_0}{d\mu} \in L_2(\mu)$. Ekkor

$$\mu_s(A) = \int_M \chi_A(T^s x) d\mu_0 = \int \chi_A(T^s x) \frac{d\mu_0}{d\mu}(x) d\mu.$$

Ha T ergodikus, akkor (5.2) miatt

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t \mu_s(A) ds = \mu(A) \int \frac{d\mu_0}{d\mu}(x) d\mu = \mu(A).$$

Sőt, ha T keverő is, akkor

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mu_t(A) = \mu(A) \quad (5.3)$$

is áll. Tehát igaz az

5.7 Tétel. *Ha a $(M, \mathcal{F}, \mu, T^{\mathbb{R}_+})$ egyensúlyi dinamika keverő, és a μ_0 nem-egyensúlyi kezdeti mértékre $\frac{d\mu_0}{d\mu} \in L_2(\mu)$, akkor (5.3) igaz $\forall A \in \mathcal{F}$ -re.*

6. fejezet

A tórusz algebrai automorfizmusa

A d -dimenziós tórusz, $\mathbb{T}^d = \mathbb{R}^d / \mathbb{Z}^d$ kompakt Abel csoport, amelyen továbbra is μ jelöli a Lebesgue-mértéket. (Több itt bevezetendő fogalom kiterjeszthető általában kompakt Abel-csoportokra, amelyeken Haar Alfréd tételének speciális eseteként létezik a csoport-eltolásra (l. 3.8 Példa) invariáns ún. Haar-mérték, mi azonban maradunk a tórusz példájánál.)

6.1 Definíció. Az $(\mathbb{T}^d, \mathcal{F}, \mu, T)$ automorfizmust csoport-automorfizmusnak nevezük, ha

- (i) T és T^{-1} folytonosak,
- (ii) $\forall x, y \in \mathbb{T}^d$ -re $T(x + y) = Tx + Ty$.

Legyen $A = (a_{jk})_{1 \leq j, k \leq d}$ egész elemű mátrix, amelyre $|\det A| = 1$.

6.2 Lemma. \mathbb{T}^d -nek a

$$Tx \equiv Ax \pmod{\mathbb{Z}^d}$$

reláció által értelmezett automorfizmusa csoport-automorfizmus.

Bizonyítás. Jelölje általában $\tilde{x} \in \mathbb{R}^d$ az $x \in \mathbb{T}^d$ elem valamely felemeltjét. Először belátjuk, hogy T jól értelmezett. Ez azonnal adódik abból a feltételből, hogy A elemei egészek. Könnyű látni, hogy T^{-1} is egyértékű. Valóban, $|\det A| = 1$ miatt A^{-1} létezik, sőt elemei egészek. T és T^{-1} folytonossága nyilvánvaló. A $|\det A| = 1$ feltevésből az is folyik, hogy a Lebesgue-mérték invariáns. Befejezésül

$$T(x + y) \equiv A(x + y) = Ax + Ay \equiv Tx + Ty,$$

ahol $a \equiv$ kongruencia mindig $(\text{mod } \mathbb{Z}^d)$. □

Mielőtt rátérnénk az ergodikus tulajdonságok szisztematikus vizsgálatára, tekintsünk három egyszerű példát, amelyek rávilágítanak arra, hogy a dinamikai viselkedést az A mátrix spektrális tulajdonságai határozzák meg.

6.3 Példa. Legyen

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};$$

és jelöljük a kétdimenziós \mathbb{T}^2 tórusz A_i által definiált algebrai automorfizmusát T_i -vel ($i = 1, 2, 3$).

Az A_1 mátrix elliptikus: két sajátértéke, $\lambda_{1,2} = \pm i$, a komplex egységkörön helyezkedik el. A T_1 transzformációra nézve minden $x \in \mathbb{T}^2$ pont periódikus, mégpedig 1 vagy 4 periódussal. Következésképp T_1 nem ergodikus a Lebesgue mértékre nézve.

Az A_2 mátrix parabolikus: csak egy sajátértéke van, a mátrix a $\lambda_1 = 1$ -hez tartozó $2 \cdot 2$ -es Jordan blokk. A T_2 transzformációval már találkoztunk: a körgyűrű 1.3 Példában említett fogatásának egy speciális esetéről van szó (csak az a különbség, hogy a körgyűrű helyett most a tórusz topológiájában tekintjük ugyanazt a leképezést). Speciálisan, a tórusz $(x_1, x_2) = x \in \mathbb{T}^2$ pontjaira az $x_2 = \text{const}$ körvonalak invariánsak: ezeken T_2 egy x_2 szögű forgatásként hat. Így T_2 sem ergodikus a Lebesgue mértékre nézve.

Végül az A_3 mátrix hiperbolikus: sajátértékei diszjunktak a komplex egységkörtől. T_3 Arnold híres macska leképezése, az alábbiakban belátjuk, hogy ez az automorfizmus ergodikus, sőt, keverő.

Az alábbiakban a Fourier-analízis eszközével szükséges és elégséges feltételt adunk a tórusz algebrai automorfizmusának ergodicitására.

6.4 Definíció. A $\chi: \mathbb{T}^d \rightarrow \mathbb{C}$ nem azonosan eltűnő, folytonos függvényt karakternek nevezzük, ha $\forall x, y \in \mathbb{T}^d - re$

$$\chi(x + y) = \chi(x)\chi(y).$$

A 6.4 Definíció egyszerű következményei.

1. $\forall \chi$ karakterre $\chi(0) = 1$, ugyanis $\chi(0) = 0$ -ból $\chi(x) \equiv 0$ adódna.
2. $\forall \chi_1, \chi_2$ karakter-párra $\chi_1\chi_2$ is karakter.
3. Az összes karakter ilyen alakú:

$$\chi_n(x) = \exp(2\pi i(n, x))$$

ahol $n \in \mathbb{Z}^d$ (ezek ugyanis a Cauchy-függvényegyenlet folytonos megoldásai).

4. Az $\widehat{\mathbb{T}^d} := \{\chi_n : n \in \mathbb{Z}^d\}$ csoportot *duális csoportnak* nevezzük.
5. $\int_{S^d} \chi_n(x) \mu(dx) = \delta_{0,n}$.
6. A karakterek teljes ortonormált rendszert alkotnak $L_2(\mathbb{T}^d, \mu)$ -ben, ahol a skálárszorzat $\langle \phi, \psi \rangle := \int \phi(x)\bar{\psi}(x)\mu(dx)$. Speciálisan $\langle \chi_n, \chi_m \rangle = \delta_{n-m}$.

7. $\widehat{\mathbb{T}}^d$ -n is tekinthetjük az indukált leképezést: $\chi \in \widehat{\mathbb{T}}^d$ -re

$$(\hat{T}\chi)(x) := \chi(Tx).$$

$\hat{T}\chi$ valóban karakter, mert

$$(\hat{T}\chi)(x+y) = \chi(T(x+y)) = \chi(Tx)\chi(Ty) = (\hat{T}\chi)(x)(\hat{T}\chi)(y).$$

8. $\hat{T}\chi_n = \chi_{A^*n}$, ahol A^* az A mátrix adjungáltja.

9. $\widehat{\mathbb{T}}^d \subset L_2(\mathbb{T}^d, \mu)$, így valójában \hat{T} a 2. fejezetben használt $\hat{T}: L_2 \rightarrow L_2$ leképezés $\widehat{\mathbb{T}}^d$ -re való megszorítása, így \hat{T} itt is unitér. (N. B. T így \hat{T} is invertálható.)

10. $\hat{T}(\chi_1 \cdot \chi_2) = \hat{T}\chi_1 \cdot \hat{T}\chi_2$ és $(\hat{T})^{-1} = \widehat{T^{-1}}$.

Tehát \hat{T} is csoport-automorfizmus.

6.5 Tétel. *A tórusz T algebrai automorfizmusaira az alábbi tulajdonságok ekvivalensek:*

(i) T ergodikus.

(ii) T keverő.

(iii) $\forall \chi (\neq 1) \in \widehat{S}^d$ karakterre a $\{(\hat{T})^k \chi : k \in \mathbb{Z}\}$ trajektória végtelen, azaz aperiódikus.

(iv) Az A mátrixnak nincs komplex egységgyök sajátértéke.

Bizonyítás. Először megmutatjuk, hogy (i) \Rightarrow (iii). Tegyük fel, hogy T ergodikus, de $\exists \chi (\neq 1) \in \widehat{\mathbb{T}}^d$ és $\exists m (\neq 0) \in \mathbb{Z}$, hogy $(\hat{T})^m \chi = \chi$. Legyen $m > 0$ a minimális ilyen m . Könnyű látni, hogy

$$f := \frac{1}{m}(\chi + \hat{T}\chi + \cdots + (\hat{T})^{m-1}\chi)$$

invariáns függvény \mathbb{T}^d -n. T ergodikus lévén $f = \text{const} = c$, viszont akkor a 6.4 Definíció 5. következménye miatt

$$0 = \langle c, \chi \rangle = \frac{1}{m} \langle \chi, \chi \rangle,$$

ami azonban pozitív. Ezzel indirekte beláttuk, hogy az indukált trajektória végtelen.

Most megmutatjuk, hogy (iii) \Rightarrow (ii). Ehhez elég belátni, hogy $\forall f, g \in L_2^o$ -ra (ahol $L_2^o := \{f \in L_2 : \int f d\mu = 0\}$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \hat{T}^n f, g \rangle = 0. \quad (6.1)$$

Tekintsük f és g Fourier sorait:

$$f = \sum_{k \neq 0} a_k \chi_k, \quad g = \sum_{k \neq 0} b_k \chi_k.$$

A 6.4 Definíció 6. következménye miatt (6.1)-et elég belátni arra az esetre, amikor f és g Fourier sorai végesek. Viszont

$$\langle \hat{T}^n f, g \rangle = \sum_{k \neq 0} \sum_{\ell \neq 0} a_k b_\ell \langle \hat{T}^n \chi_k, \chi_\ell \rangle.$$

A 6.4 Definíció 5. és 8. következményei miatt $\langle \hat{T}^n \chi_k, \chi_\ell \rangle \neq 0$ kizárólag akkor, ha $\hat{T}^n \chi_k = \chi_\ell$. Feltevésünk miatt azonban ez elég nagy n -re nem fordulhat elő, így elég nagy n -re $\langle \hat{T}^n f, g \rangle = 0$.

Mivel a keverés az ergodicitásnál erősebb tulajdonság, a fentiek szerint az (i), (ii) és (iii) tulajdonságok valóban ekvivalensek. Belátjuk még, hogy (iii) \Leftrightarrow (iv), és így egy könnyen ellenőrizhető szükséges és elégséges feltételt kapunk T keverésére. Tegyük fel, hogy $\hat{T}^k \chi_n = \chi_n$ valamilyen nem azonosan nulla $n \in \mathbb{Z}^d$ vektorra és k pozitív egészre. A 6.4 Definíció 8. következménye miatt ez akkor és csak akkor fordul elő, ha $(A^*)^k n = n$. Ez a tulajdonság viszont pontosan azt jelenti, hogy A^* -nak – és ezzel egyidejűleg A -nak – van sajátértéke az egységkörön. \square

A 6.3 példa is motiválja a következő definíciót:

6.6 Definíció. A tórusznak az A mátrix által származtatott $(\mathbb{T}^d, \mathcal{F}, \mu, T)$ automorfizmusát hiperbolikusnak nevezzük, ha $\text{Spec } A \cap \{|z| = 1\} = \emptyset$.

6.5 Tétel közvetlen következménye a

6.7 Tétel. Ha a tórusz T algebrai automorfizmusa hiperbolikus, akkor T ergodikus és keverő.

$d = 2$ esetén vagy mindkét sajátérték az egységkörön van, vagy mindkettő valós és egyikükre $|\lambda_s| < 1$, a másikra $|\lambda_u| > 1$ (itt s a stable, u az unstable szó kezdőbetűje; ennek magyarázatát l. a 7. fejezetben). Az is könnyen meggondolható, hogy $d = 2$ esetén amennyiben az A mátrix sajátértékei az egységkörön helyezkednek el, akkor mindkettő komplex egységgyök, vagyis a kétdimenziós tórusz algebrai automorfizmusaira az ergodicitás a hiperbolicitással ekvivalens. Az alábbi példa mutatja, hogy magasabb dimenzióban ez nincs feltétlenül így.

6.8 Példa. Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Az A mátrixnak pontosan két sajátértéke van az egységkörön, de ezek egyike sem komplex egységgyök. Így az A által definiált automorfizmus ergodikus és keverő, de nem hiperbolikus: ez a dinamikai rendszer az úgynevezett parciálisan hiperbolikus rendszerek egyik legegyszerűbb példája.

6.5 Tétel bizonyítása erősen használta a 6.4 tulajdonságokat, amelyek egyik lényeges feltétele volt, hogy T csoport-automorfizmus. A következő fejezetben a tórusz algebrai automorfizmusa ergodicitásának alátámasztására olyan „geometriai” módszert ismertetünk, amely nem használja ki a leképezés, „egzakt” tulajdonságait, ezért messzemenően általánosítható.

7. fejezet

Hopf geometriai módszere

A módszert legegyszerűbb a tórusz algebrai automorfizmusának esetére elmondanunk. Közvetlenül csak az ergodicitást adja, a keverést nem, viszont a módszer szoros összefüggésben áll a hiperbolikus dinamikai rendszerek elméletének gyökereivel, és az általános, nem-egzakt esetekben lényegében az egyetlen eszköz ergodicitás igazolására. Tehát igazoljuk a 6.5 Tételnél valamivel gyengébb állítást:

7.1 Tétel. *A tórusz hiperbolikus algebrai automorfizmusa ergodikus.*

Bizonyítás. Egyszerűség kedvéért legyen $d = 2$, vagyis mindkét sajátérték valós és legyen $|\lambda_s| < 1$, $|\lambda_u| > 1$. Ebben az esetben A -nak vannak \mathbb{R}^2 -beli sajátvektorai: e_s és e_u . A bizonyítás fontos eszközei a *szűkülő illetve táguló fonalak*.

7.2 Definíció. A T leképezés $x \in \mathbb{T}^d$ ponton keresztül átmenő szűkülő (stabil) fonala

$$\gamma^s(x) = \left\{ y \in \mathbb{T}^d : \lim_{n \rightarrow \infty} \text{dist}(T^n x, T^n y) = 0 \right\}$$

és táguló (instabil) fonala

$$\gamma^u(x) = \left\{ y \in \mathbb{T}^d : \lim_{n \rightarrow -\infty} \text{dist}(T^n x, T^n y) = 0 \right\}.$$

Valójában T stabil (instabil fonala) éppen a T^{-1} leképezés instabil (stabil) fonala. Esetünkben e fonalak könnyen leírhatók:

$$\begin{aligned} \gamma^s(x) &= \{ \tilde{x} + t e_s \pmod{\mathbb{Z}^2} : t \in \mathbb{R} \} \\ \gamma^u(x) &= \{ \tilde{x} + t e_u \pmod{\mathbb{Z}^2} : t \in \mathbb{R} \}, \end{aligned}$$

tehát ténylegesen mindkettő a tórusz e_s illetve e_u irányú feltekerésének (v.ö. 1.12 Példa) pályája.

Térjünk rá Hopf módszerére. Belátjuk, hogy $\forall f \in C(\mathbb{T}^2)$ -re az ergodtételben szereplő $\bar{f} = \text{const}$ (itt $C(\mathbb{T}^2)$ az $f : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények halmazát jelöli). Ez valóban elegendő, hiszen $\forall f \in L_2$ -höz és $\forall \varepsilon$ -ra található $f_\varepsilon \in C(\mathbb{T}^2)$, hogy

$\|f - f_\varepsilon\|_2 < \varepsilon$. Mármost $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n f = \prod_{\mathcal{I}} f$ és $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n f_\varepsilon = \prod_{\mathcal{I}} f_\varepsilon$, ahol $\prod_{\mathcal{I}}$ jelöli az

\mathcal{I} -re való vetítést L_2 -ben. Ha tehát $f_\varepsilon \xrightarrow{L_2} f$, akkor egyúttal $\prod_{\mathcal{I}} f_\varepsilon \xrightarrow{L_2} \prod_{\mathcal{I}} f$, de konstans függvények limesze konstans.

Automorfizmusról lévén szó, hivatkozunk a 2.14 ergodtételre és az 2.15 megjegyzésre:

egyrészt μ -m.m. $x \in \mathbb{T}^2$ -re $n \rightarrow \infty$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{1}{n}(f(x) + f(Tx) + \dots + f(T^{n-1}x)) &\rightarrow \bar{f}(x) \\ \frac{1}{n}(f(x) + f(T^{-1}x) + \dots + f(T^{-n-1}x)) &\rightarrow \bar{f}^-(x), \end{aligned}$$

és $\bar{f}^- = \bar{f}$ áll μ -m.m. x -re. Jelöljük

$$J := \{x \in \mathbb{T}^2 : \bar{f}^-(x) = \bar{f}(x)\}. \quad (7.1)$$

Mivel f egyenletesen is folytonos, igazak a következő egyszerű megállapítások:

1. Ha $x, y \in \gamma_s$ és $\bar{f}(x)$ létezik, akkor $\bar{f}(y)$ is létezik, és $\bar{f}(x) = \bar{f}(y)$.
2. Ha $x, y \in \gamma_u$ és $\bar{f}^-(x)$ létezik, akkor $\bar{f}^-(y)$ is létezik, és $\bar{f}^-(x) = \bar{f}^-(y)$.

Igazoljuk 1.-et. f egyenletes folytonossága következtében $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$, hogy $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$ ha csak $\varrho(x, x') < \delta$. Mivel $\varrho(T^k x, T^k y) \rightarrow 0$, ha $k \rightarrow \infty$ (valójában a konvergencia sebessége $|\lambda_s|^k$, vagyis exponenciális), ezért $\varrho(T^k x, T^k y) < \delta$, ha $k \geq k_0$. Ekkor

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (f(T^k x) - f(T^k y)) \right| = \frac{1}{n} \left| \sum_{k=0}^{k_0-1} (\quad) + \sum_{k=k_0}^{n-1} (\quad) \right| \leq \frac{2 \max |f| k_0}{n} + \varepsilon < 2\varepsilon,$$

ha n elég nagy.

Könnyű látni, hogy ha $\bar{f}(x)$ és $\bar{f}^-(x) \forall x \in \mathbb{T}^2$ -re létezne és egyenlő lenne, akkor 1. és 2. már automatikusan adnák, hogy $\bar{f} = \text{const}$ mindenütt. A bizonyítás hátralevő részében azzal a nehézséggel küzdünk meg, hogy vannak kivételes pontok.

Tekintsünk \mathbb{T}^2 -n egy elég kis P paralelogrammát, amelynek oldalai párhuzamosak az e_s illetve e_u sajátvektorokkal. Jelölje általában $x \in P$ esetén $\gamma_P^s(x)$ és $\gamma_P^u(x)$ a $\gamma^s(x)$ illetve $\gamma^u(x)$ fonál x -et tartalmazó összefüggő komponensét. Rögzítsünk egy $x_0 \in P$ pontot. Akkor nyilván

$$P = \bigcup_{x \in \gamma_P^u(x_0)} \gamma_P^s(x) = \bigcup_{x \in \gamma_P^s(x_0)} \gamma_P^u(x),$$

ami egyben P direkt szorzat alakban való előállítását is adja: $P = \gamma_P^s(x_0) \otimes \gamma_P^u(x_0)$, sőt a P -n vett Lebesgue-mérték is a tényezőkön vett Lebesgue-mértékek szorzatának konstansszorosa (a konstans = $|\sin \angle(e_s, e_u)|$). Nevezzük $\gamma_P^s(x)$ -t (illetve

$\gamma_P^u(x)$ -t jó fonálnak, ha majdnem minden pontja $\in J$ (v.ö. (7.1)). Fubini tétele miatt $\gamma_P^u(x_0)$ majdnem minden x pontjára a rajta keresztül átmenő $\gamma_P^s(x)$ fonál jó. Feltehetjük, hogy $\gamma_P^s(x_0)$ jó fonál. Tekintsük a

$$B := \bigcup_{x \in \gamma_P^s(x_0) \cap J} (\gamma_P^u(x) \cap J)$$

halmazt. Egyrészt ismét Fubini tétele miatt $\mu(B) = \mu(P)$, mivel μ -m.m. $x \in \gamma_P^s(x_0)$ -ra is a $\gamma_P^u(x)$ fonál jó.

Belátjuk, hogy $\forall y, z \in B$ -re $\bar{f}(y) = \bar{f}^-(y) = \bar{f}(z) = \bar{f}^-(z)$, ami rögtön adja, hogy B -n az $\bar{f}(y) = \bar{f}^-(y)$ függvény konstans. Legyen $y \in \gamma_P^u(y') \cap J$, $z \in \gamma_P^u(z') \cap J$, ekkor $y', z' \in \gamma_P^s(x_0) \cap J$, és igaz a következő egyenlőséglánc:

$$\bar{f}(y) = \bar{f}^-(y) = \bar{f}^-(y') = \bar{f}(y') = \bar{f}(z') = \bar{f}^-(z') = \bar{f}^-(z) = \bar{f}(z)$$

(a hét egyenlőség rendre igaz, mert 1. $y \in J$; 2. $y \in \gamma_P^u(y')$; 3. $y' \in J$; 4. $z' \in \gamma_P^s(y')$; 5. $z' \in J$; 6. $z \in \gamma_P^u(z')$; 7. $z \in J$).

A tétel igazsága végül abból adódik, hogy egyrészt \mathbb{T}^2 lefedhető véges sok fenti típusú paralelogrammával: $\mathbb{T}^2 \subset \cup P_i$, másrészt azután mindegyik paralelogrammát centrálisan picit nagyítva, és felhasználva, hogy azokon a limesz μ -m.m. konstans, könnyen adódik, hogy ez a konstans minden paralelogrammára ugyanaz. \square

Megjegyzés. Hopf módszere az alapvető módszer kaotikus tulajdonságok: hiperbolicitás, ergodicitás, keverés, ... igazolására. Eberhard Hopf 1938-ban (és 1939-ben G. A. Hedlund is) ezzel a gondolattal mutatta meg kompakt, konstans negatív görbületű felületen adott geodetikus áramlás ergodikus voltát. A módszer páratlan előnye, hogy messzemenően általánosítható. Alkalmazható nemcsak sima leképezésekre, hanem szakadásos leképezésekre is, pl. a pék leképezésére is működik. Ennek ergodicitását ugyan tudjuk abból, hogy izomorf egy Bernoulli-automorfizmussal. Ugyanakkor erre is könnyen megtalálhatók a stabilis és instabil sokaságok, és a módszer működik.

Feladat. Keressük meg a pék leképezésére a stabilis és instabil invariáns sokaságokat.

8. fejezet

Invariáns mérték létezése

A korábbi fejezetekben jellemzően olyan példákkal találkoztunk, ahol eleve adott volt egy invariáns mérték. Gyakran vetődnek fel olyan példák is, amikor csak az (M, \mathcal{F}, T) hármast ismerjük, és épp az a kérdés, létezik-e egyáltalán T -re invariáns mérték. Viszonylag természetes feltételek esetén garantálja invariáns mérték létezését Krülov-Bogoljubov tétele (8.2 Tétel). Külön érdekes kérdés az invariáns mérték egyértelműsége: jellemzően nagyon sok invariáns mértéket lehet T -hez találni, ilyenkor kérdés, van-e ezek között egy, amelyet valamilyen értelemben „természetesnek” tekinthetünk. Ezt a kérdést a következő fejezetben vizsgáljuk kicsit részletesebben.

Mindenekelőtt azonban nézzük az alábbi híres példát: kicsit szokatlan, hogy T itt nem szürjektív leképezés, de ettől függetlenül tekinthető automorfizmusnak az 1. fejezet definíciója értelmében.

8.1 Példa. (A család pék leképezése: A Smale-patkó.) Tekintsük az $I^2 = [0, 1]^2$ egységnyezetet. Alkalmazzuk erre először az

$$A = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix},$$

lineáris leképezést, majd a $[\frac{3}{2}, \frac{5}{2}] \otimes [0, \frac{2}{5}]$ téglalapot az

$$Fx = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{2}{1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x$$


transzformációval vigyük át az egységnyezet felső élét érintő $\frac{2}{5}$ szélességű sávba. A két leképezés $T = F \circ A$ szorzata $1-1$ értelmű leképezése az $M_1 = ([0, \frac{2}{5}] \cup [\frac{3}{5}, 1]) \otimes [0, 1]$ halmaznak az $M_2 = [0, 1] \otimes ([0, \frac{2}{5}] \cup [\frac{3}{5}, 1])$ halmazba. Az $I^2 \setminus M_1$ téglalapon nem szükséges értelmeznünk T -t, de ha mégis akarjuk, akkor nyilván símán is folytathatjuk T -t (pl. TI^2 lehet éppen patkó alakú is).

Kérdés: milyen invariáns mértékei vannak a T leképezésnek, és ezek közül melyek azok, amelyek valamilyen értelemben természetesek? Mi ezeknek a mértékeknek a tartója?

Az adott példa lezárásául még megjegyezzük, hogy a példa legegyszerűbb esete a Smale által az 1960-as években talált ún. *patkó-leképezések*-nek. Példánk esetén valóban létezik egy természetes invariáns mérték, amelynek a tartóját, másnéven *különös attraktorát* nevezzük a *P Smale-patkónak*:

$$P = \{x \in I^2 \mid T^n x \in I^2 \forall n \in \mathbb{Z}\}.$$

Meggondolható, hogy P két Cantor halmaz direkt szorzataként áll elő.



2. ábra. A patkó leképezés

Krylov-Bogoljubov tétel

A legtöbb alkalmazásnál csak a dinamika adott, azaz egy endomorfizmus-félcsoport vagy egy automorfizmus-csoport, viszont a dinamika fázistere valamilyen síma struktúrával is rendelkezik. Így pl. egy differenciálegyenlet-rendszer \mathbb{R}^n -en vagy valamilyen M^n síma sokaságon értelmezett; s ha egyáltalán van invariáns mérték, akkor még az is lehet akár síma akár nem. Másrészt rengeteg invariáns mérték is létezhet (ilyenek pl. a periódikus pályáívekre koncentrált mértékek). Invariáns mérték konstrukciójának természetes és klasszikus módszerét adja Krülov és Bogolyubov tétele.

8.2 Tétel. (Krylov-Bogoljubov tétel) *Legyen M kompakt, metrikus tér és $T: M \rightarrow M$ folytonos endomorfizmus. Ekkor T -nek van μ invariáns Borel mértéke ($\mu(M) = 1$).*

Bizonyítás. Rögzítsük M tetszőleges x pontját – a konstruálandó invariáns mérték függ ennek a pontnak a megválasztásától – és legyen $\varphi \in C(M)$. Jelöljük

$$A_\varphi^n = A_\varphi^n(x) = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(T^j x).$$

Legyen továbbá $\Phi = \{\varphi_l : l \geq 1\}$ megszámlálható sűrű részhalmaza $C(M)$ -nek. (N.B.: ha M kompakt metrikus tér, akkor $C(M)$ szeparábilis; l. pl. Kelley: General Topology, 7. fejezet feladatai.)

Mivel minden φ_l -re az $A_{\varphi_l}^n$ számsorozat korlátos, azért tartalmaz konvergens részsorozatot. Lévé Φ megszámlálható, a Cantor-féle átlós eljárással kiválasztható egy olyan $n_j \rightarrow \infty$ részsorozat, hogy minden l -re

$$\lim_{j \rightarrow \infty} A_{\varphi_l}^{n_j} = L(\varphi_l).$$

Állítjuk, hogy

- $\lim_{j \rightarrow \infty} A_\varphi^{n_j} = L(\varphi)$ létezik minden $\varphi \in C(M)$ -re
- és $L(\varphi)$ folytonos és pozitív, lineáris funkcionál $C(M)$ -en.

Az első állítás igazolásához rögzített $\varphi \in C(M)$ -hez és tetszőleges $\varepsilon > 0$ -hoz válasszuk először l -et, hogy $\|\varphi - \varphi_l\| < \varepsilon$. Akkor

$$|A_\varphi^{n_j} - L(\varphi)| \leq A_{|\varphi - \varphi_l|}^{n_j} + |A_{\varphi_l}^{n_j} - L(\varphi_l)|$$

ami $< 2\varepsilon$, ha j elég nagy. Következésképpen $\{A_\varphi^{n_j} : j \geq 1\}$ Cauchy-sorozat minden $\varphi \in C(M)$ -re, így konvergens is. A második állítás innen már egyszerűen következik.

Riesz reprezentációs tétele miatt létezik egy valószínűségi Borel mérték, hogy

$$L(\varphi) = \int \varphi d\mu.$$

Mármost

$$\lim_{j \rightarrow \infty} A_{\varphi \circ T}^{n_j} = L(\varphi \circ T) = \int (\varphi \circ T) d\mu.$$

(N.B. Itt, az első egyenlőségénél használjuk, hogy T folytonos!) Viszont

$$\lim_{j \rightarrow \infty} |A_{\varphi \circ T}^{n_j} - A_\varphi^{n_j}| \leq \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{2}{n_j} |\varphi(T^{n_j} x) - \varphi(x)| = 0$$

így

$$\int (\varphi \circ T) d\mu = \int \varphi d\mu$$

tetszőleges $\varphi \in C(M)$ -re. A tétel állítása következik az alábbi lemmából.

8.3 Lemma. μ akkor és csak akkor invariáns a T endomorfizmusra, ha minden $\varphi \in C(M)$ -re

$$\int \varphi d\mu = \int (\varphi \circ T) d\mu. \quad (8.1)$$

Bizonyítás. Jelöljük általában $T_*\mu$ -vel a következő mértéket: $\forall A \in \mathcal{F}$ -re $T_*\mu(A) = \mu(T^{-1}A)$. Így μ akkor és csak akkor T -invariáns, ha $T_*\mu = \mu$. Egyszerű integrálhelyettesítéssel

$$\int \varphi d(T_*\mu) = \int (\varphi \circ T) d\mu. \quad (8.2)$$

Ha tehát μ T -invariáns, akkor (8.1) nyilvánvaló. Valóban: (8.1) nyilván fennáll mérhető halmazok indikátorfüggvényeire, és innen egyszerű approximációs gondlattal már adódik folytonos függvényekre is.

Tegyük fel most (8.1)-t, és legyen U nyílt halmaz, amelyre $\mu(\partial U) = 0$. Válasszuk a χ_U indikátorfüggvényhez folytonos függvények olyan csökkenő φ_n sorozatát, hogy $\varphi_n(x) \searrow \chi_U(x)$ minden $x \notin \partial U$ -ra. Valóban, legyen $h_\varepsilon(x) = 1 - \varepsilon^{-1} \min\{\rho(x, U), \varepsilon\}$, és $\varphi_n = h_{\varepsilon_n}$, ahol $\varepsilon_n \rightarrow 0$, ha $n \rightarrow \infty$. (8.2) áll minden φ_n függvényre, így Beppo-Levi tétele miatt χ_U -ra is. Következésképpen minden U nyílt halmazra, amelyre $\mu(\partial U) = 0$, $\mu(U) = \mu(T^{-1}U)$.

Tekintsünk befejezésül egy tetszőleges U nyílt halmazt, valamint annak $F = M \setminus U$ komplementerét. A lemma bizonyításához elegendő belátnunk, hogy $\mu(F) = \mu(T^{-1}F)$. Tekintsük $\delta > 0$ -ra az $G^\delta = \{x \in M \mid \rho(x, F) < \delta\}$ ún. paratartományokat. Ezek nyíltak, és természetesen megszámlálható sok δ kivételével $\mu(\partial G^\delta) = 0$. Legyenek δ_n -ek ilyenek, és emellett tegyük fel, hogy $\delta_n \searrow 0$. Választásunk miatt $\mu(G^{\delta_n}) = \mu(T^{-1}G^{\delta_n})$. Innen $n \rightarrow \infty$ esetén $\bigcap T^{-1}G^{\delta_n} = T^{-1} \cap G^{\delta_n}$ és a mértékek folytonossági tulajdonsága miatt már adódik a lemma. \square

Legyen (M, \mathcal{F}) metrikus tér a Borel σ -algebrával, \mathcal{M} a Borel valószínűségi mértékek összessége M -en. Ekkor \mathcal{M} konvex halmaz, azaz $\forall \mu_1, \mu_2 \in \mathcal{M}$ és $0 \leq t \leq 1$ esetén $t\mu_1 + (1-t)\mu_2 \in \mathcal{M}$. Ismeretes az is, hogy \mathcal{M} extrémális pontjai (melyekre csak triviális konvex előállítás lehetséges) éppen a Dirac mértékek.

Legyen most (M, \mathcal{F}, T) endomorfizmus, és jelölje $\mathcal{M}_{\text{inv}} \subset \mathcal{M}$ a T -re invariáns Borel valószínűségi mértékek halmazát, és $\mathcal{M}_{\text{erg}} \subset \mathcal{M}_{\text{inv}}$ ezen belül a T -re ergodikus mértékek halmazát. Meggondolható, hogy \mathcal{M}_{inv} is konvex halmaz (a konvex kombináció nem visz ki \mathcal{M}_{inv} -ből).

8.4 Tétel. *A \mathcal{M}_{inv} konvex halmaz extrémális pontjainak halmaza éppen \mathcal{M}_{erg} .*

A bizonyítás egyik fele legyen

8.5 Feladat. *Ha μ nem ergodikus, létezik $0 < t < 1$ és $\mu_1 \neq \mu_2$ invariáns, hogy $\mu = t\mu_1 + (1-t)\mu_2$.*

A másik feléhez tegyük fel, hogy μ ergodikus, mégis létezik $\mu = t\mu_1 + (1-t)\mu_2$ nemtriviális felbontás. Ekkor nyilván $\mu_1 \ll \mu$, a sűrűségfüggvényt jelölje $\rho(x) = \frac{d\mu_1}{d\mu}(x)$. $\rho(x) \leq 1/t$ μ majdnem mindenütt, ugyanis $\rho(x) > 1/t$ nem lehetséges egy $\mu(A) > 0$ halmazon, hiszen ebből

$$\mu(A) \geq t\mu_1(A) \int_A \rho(x) d\mu(x) > t \frac{1}{t} \mu(A) = \mu(A)$$

következne. Tehát speciálisan $\rho \in L^2(\mu)$. Kihasználva, hogy $\mu_1 \in \mathcal{M}_{\text{inv}}$, tetszőleges $f \in L^2(\mu)$ függvényre adódik

$$\begin{aligned} \langle f, \rho \rangle_\mu &= \int f(x)\rho(x)d\mu(x) = \int f(x)d\mu_1(x) = \int f(Tx)d\mu_1(x) = \\ &= \int (\hat{T}f)(x)\rho(x)d\mu(x) = \langle \hat{T}f, \rho \rangle_\mu \end{aligned}$$

azaz $\hat{T}^*\rho = \rho$. Azonban a Neumann ergodtétel bizonyításánál láttuk, hogy ez $\hat{T}\rho = \rho$ -val ekvivalens, azaz $\rho \in L^2(\mu)$ invariáns függvény. Ez azonban μ ergodicitása miatt azt jelenti, hogy ρ (majdnem mindenütt) konstans, és mivel ρ egy valószínűségi mérték sűrűségfüggvénye, $\rho(x) = 1$ μ -m.m. $x \in M$ -re. Vagyis $\mu = \mu_1$, és a felbontás triviális.

Megjegyzés: a fenti levezetés során bebizonyítottuk az alábbi hasznos lemmát:

8.6 Lemma. *Legyen (M, \mathcal{F}, T) endomorfizmus, $\mu \in \mathcal{M}_{\text{erg}}$, $m \in \mathcal{M}_{\text{inv}}$, és $m \ll \mu$. Ekkor szükségképpen $m = \mu$.*

8.7 Feladat. *Legyen (M, \mathcal{F}, T) endomorfizmus, $\mu, m \in \mathcal{M}_{\text{erg}}$ és $\mu \neq m$. Ekkor $\mu \perp m$ (különböző ergodikus mértékek szingulárisak egymásra nézve, azaz a fázistér "diszjunkt részein élnek".)*

8.8 Feladat. *Tekintsük a $T : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$, $T(x) = x + \varepsilon \sin(2\pi x) \pmod{1}$ dinamikai rendszert, ahol $0 < \varepsilon < \frac{1}{2\pi}$ (az \mathbb{S}^1 körvonalra szokás szerint gondolhatunk úgy, mint a $[0, 1]$ intervallumra, a két végpontot azonosítva). Mi ebben az esetben \mathcal{M}_{inv} és \mathcal{M}_{erg} ?*

Krülov-Bogoljubov tétele szerint, ha (M, \mathcal{F}, T) egy kompakt metrikus tér folytonos endomorfizmusa, akkor $\mathcal{M}_{\text{inv}} \neq \emptyset$ (és következésképp $\mathcal{M}_{\text{erg}} \neq \emptyset$).

8.9 Feladat. *Mutassuk meg, hogy a Krülov-Bogoljubov tétel feltételei "élesek": adjunk példát olyan dinamikákra, melyekre $\mathcal{M}_{\text{inv}} = \emptyset$, ha (a) T folytonos és $X = \mathbb{R}$, (b) T folytonos és $X = (0, 1)$, (c) T -nek van egy szakadási pontja és $X = [0, 1]$.*

Függelék

Beppo-Levi tétele. *Legyen (X, μ) mértéktér. Ha az f_n -ek integrálható függvények és $\sup_n \int f_n d\mu < \infty$, továbbá $f_n \nearrow f$, akkor f is integrálható és $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$.*

Riesz reprezentációs tétele. *Legyen M kompakt metrikus tér. Ha $L : C(M) \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos és pozitív (azaz $\forall \varphi \geq 0$ -ra $L(\varphi) \geq 0$) lineáris funkcionál, akkor létezik egyetlen Borel mérték M -en, hogy $\forall \varphi \in C(M)$ -re $\int \varphi d\mu = L(\varphi)$.*

9. fejezet

Markov-leképezések

Ebben a fejezetben egydimenziós leképezésekkel foglalkozunk.

9.1 Definíció. Az $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ leképezést Markov leképezésnek nevezzük, ha létezik diszjunkt nyílt intervallumok véges vagy megszámlálhatóan végtelen rendszere $\{I_j : I_j \subset [0, 1]\}$, hogy

a) $m([0, 1] \setminus \bigcup_j I_j) = 0$, ahol m a Lebesgue-mérték;

b) $\forall j$ -re $f|_{I_j} \in C^1(I_j)$ és

$$f(I_j) = (0, 1);$$

c) megadható $\beta > 1$, hogy $|f'(x)| \geq \beta$;

d) megadható $C > 0$ és $0 < \gamma < 1$, hogy minden j -re és minden $x, y \in I_j$ -re

$$\left| \frac{f'(x)}{f'(y)} - 1 \right| \leq C|x - y|^\gamma.$$

Megjegyzések

1. Mindenütt az alábbiakban f^n jelöli egy leképezés n -edik iteráltját; azaz $f^1 = f$, és $f^n = f \circ f^{n-1}$.
2. A b) tulajdonság az ún. Markov-tulajdonság erős formája, c) jelenti az f leképezés egyenletes hiperbolicitását, míg d) a módszereink számára alapvető disztorziós becslések egyik változata.
3. Példák intervallum-leképezésekre:
 - (i) Markov-leképezés az $f(x) = qx - [qx]$, ahol $q \geq 2$ egész szám; (ha $q > 1$ nem egész, akkor a leképezésre ugyan teljesül a), c) és d), azonban nem teljesül a b) Markov-tulajdonság).

- (ii) az $f(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ Gauss-leképezés (l. 1.8 Példa). (N.B. Itt c) nem áll, viszont a), b) és d) teljesülnek. Valóban d) áll $\gamma \leq \frac{1}{2}$ -el. Ugyanis $x, y \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)$ esetén

$$\begin{aligned} \left| \frac{y^2}{x^2} - 1 \right| &\leq (y+x) \frac{1}{x^2} |y-x| \leq \\ &\leq \frac{2}{n} (n+1)^2 |y-x|^{1-\gamma} |y-x|^\gamma \leq \\ &\leq \frac{2}{n} (n+1)^2 \frac{1}{n^{1-\gamma} (n+1)^{1-\gamma}} |y-x|^\gamma = \\ &= \frac{2}{n^{2-\gamma}} (n+1)^{1+\gamma} |y-x|^\gamma \leq \\ &\leq 2^{2+\gamma} n^{2\gamma-1} |y-x|^\gamma. \end{aligned}$$

Az elmélet fő eredménye Rényi Alfréd tételének (1957) következő általánosítása:

9.2 Tétel. Ha f a $[0, 1]$ intervallum Markov-leképezése, és jelöljük m -mel a Lebesgue mértéket $[0, 1]$ -n. Ekkor $[0, 1]$ -en létezik egyetlen olyan m -re abszolút folytonos, f -invariáns valószínűségi mérték μ , amely rendelkezik a következő tulajdonságokkal:

- (i) $\frac{d\mu}{dm}$ Hölder-folytonos;
(ii) $0 < \inf \frac{d\mu}{dm}(x) \leq \sup \frac{d\mu}{dm}(x) < \infty$;
(iii) a μ mértékre nézve f ergodikus;

A 9.2 tétel bizonyítása. A Krylov–Bogoljubov tétel alap gondolatát használva vezessük be az $m_n := f_*^n m$ jelölést, azaz $m_n(A) = m(f^{-n}A)$ minden A Borel-halmazra. A különbség annyi, hogy mivel most az invariáns mérték sűrűségfüggvényét kell megkonstruálnunk, ezért a mértékek gyenge kompaktsága helyett a sűrűségfüggvények kompaktságát biztosító Arzela–Ascoli tételt fogjuk használni.

b) és d) miatt f' Hölder-folytonos, azaz $\forall j$ -re $\exists \alpha_j (= \sup_{x \in I_j} f'(x)) < \infty$, hogy $\forall x, y \in I_j$ -re $|f'(x) - f'(y)| \leq C \alpha_j |x - y|^\gamma$. Következésképp f mindegyik I_j intervallumot monoton és invertálható módon képezi le $(0, 1)$ -re.

Vezessük be felbontásoknak a következő finomodó sorozatát:

$$\begin{aligned} \eta_0 &:= \{(0, 1)\}, \\ \eta_1 &:= \{I_j\}, \end{aligned}$$

azaz $\forall I_j$ olyan maximális részintervallum, amelyet f 1-1 értelmű módon és simán képez $(0, 1)$ -re. Ennek általánosításaképp:

$$\begin{aligned} \eta_n &:= \{I_{j_1, \dots, j_n}\}, \text{ ahol } \forall I_{j_1, \dots, j_n} \text{ intervallumra az} \\ f^n &: I_{j_1, \dots, j_n} \rightarrow (0, 1) \text{ leképezés homeomorf.} \end{aligned}$$

Ezt a definíciót ekvivalens módon így is bevezethetjük:

b)-ből következik, hogy $\forall j$ -re létezik oly $f_j: I_j \rightarrow (0, 1)$ homeomorf leképezés, hogy $\forall x \in \bigcup_j I_j$ -re $f(x) = f_j(x)$ ha $x \in I_j$. Ekkor $x \in I_{j_1, \dots, j_n}$ pontosan azt jelenti, hogy

$$f^n(x) = f_{j_n} \circ f_{j_{n-1}} \circ \dots \circ f_{j_1}(x).$$

Érdemes megjegyezni, hogy ha $x \in I_{j_1, \dots, j_n}$, akkor $1 \leq l \leq n$ -re $f^l(x) \in I_{j_{l+1}, \dots, j_n}$ (persze $I_0 := (0, 1)$). Vezessük be a következő jelölést: $x \in I_{j_1, \dots, j_n}$ -re

$$\eta_n(x) := I_{j_1, \dots, j_n}.$$

Könnyű látni, hogy $x \in I_{j_1, \dots, j_n}$ -re

$$J_n(x) := |(f^n)'(x)| = |f'_{j_n}(f^{n-1}(x)) \cdot f'_{j_{n-1}}(f^{n-2}(x)) \dots f'_{j_1}(x)|. \quad (9.1)$$

Most már elkezdhetjük a tulajdonképpeni bizonyítást. Szűkítsük először a fázis-teret a reguláris pontok teljes mértékű M_0 halmazára:

$$M_0 := \bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{j_1, \dots, j_n} I_{j_1, \dots, j_n}.$$

Nyilvánvalóan M_0 invariáns halmaz (itt erős értelemben, azaz $M_0 = f^{-1}M_0 = fM_0$), és $m(M_0) = 1$. Bizonyításunk a következő fő lépésekből áll:

1. Belátjuk, hogy $\forall x \in (0, 1)$ -re

$$\frac{dm_n}{dm}(x) := S_n(x) := \sum_{y \in f^{-n}(x)} \frac{1}{J_n(y)}. \quad (9.2)$$

Valójában ez (9.1) és az előtte mondottak egyszerű folyománya. (Érdemes felidézni a Ruelle-Perron-Frobenius operátor fogalmát az 1. fejezetből: az invariáns sűrűségfüggvény éppen ennek az operátornak a fixpontja.)

2. Igazoljuk a következő technikai alap-lemmát:

9.3 Lemma. *Léteznek $C_1, C_2 > 0$, hogy $\forall n > 1$, $\forall x \in M_0$ és $\forall y \in \eta_n(x)$ esetén*

$$\frac{J_n(y)}{J_n(x)} \leq \exp[C_1 |f^n(x) - f^n(y)|^\gamma]$$

továbbá

$$\left| \frac{J_n(y)}{J_n(x)} - 1 \right| \leq C_2 |f^n(x) - f^n(y)|^\gamma. \quad (9.3)$$

3. Lemmánk egyszerű következménye lesz az

9.4 Lemma.

(i) $\exists K > 0$, hogy $\forall n \geq 1$ -re és $\forall x \in (0, 1)$ -re $S_n(x) \leq K$;

(ii) $\forall n \geq 1$ -re és $\forall x, y \in (0, 1)$ -re

$$|S_n(x) - S_n(y)| \leq S_n(x)C_2|x - y|^\gamma.$$

4. Az eddigiek alapján mármost így okoskodhatunk:

Jelölje $H_n(x) := \frac{1}{n} \sum_{\ell=0}^{n-1} S_\ell(x)$ ($x \in (0, 1)$) az $A_n m$ mérték sűrűségfüggvényét. A

9.4 Lemmából következik: $\forall n \geq 1$ -re és $\forall x, y \in (0, 1)$ -re

$$\sup_{n,x} H_n(x) \leq K, \quad (9.4)$$

$$|H_n(x) - H_n(y)| \leq H_n(x) C_2 |x - y|^\gamma. \quad (9.5)$$

E két tulajdonságból először is adódik, hogy $H_n: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ egyértelműen ki-terjeszthető egy folytonos $\bar{H}_n: M = [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ függvénnyé, amelyre továbbra is teljesülnek az (9.4)–(9.5) becslések. Mivel a $\{\bar{H}_n\}$ sorozat egyenletesen korlátos és egyenlő mértékben egyenletesen folytonos az M kompaktumon, az Arzela–Ascoli tétel miatt alkalmas $\{\bar{H}_{n_j}\}$ részsorozata egyenletesen konvergál valamely $H: M \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvényhez, amelyre ugyancsak áll:

$$\sup_{x \in M} H(x) \leq K, \quad (9.6)$$

$$|H(x) - H(y)| \leq H(x)C_2|x - y|^\gamma, \quad (9.7)$$

(9.6)–(9.7)-ből természetesen

$$|H(x) - H(y)| \leq KC_2|x - y|^\gamma, \quad (9.8)$$

is látszik.

Tételünk állítása adódni fog a következő lemmából:

9.5 Lemma. $A \mu(A) = \int_A H(x)m(dx)$ mértékre igazak a 9.2 Tétel állításai.

Térjünk rá lemmáink bizonyítására.

A 9.3 Lemma bizonyítása. (9.1) és 9.1 Definíció d) pontja alapján

$$\frac{J_n(y)}{J_n(x)} = \left| \prod_{\ell=0}^{n-1} \frac{f'(f^\ell(y))}{f'(f^\ell(x))} \right| \leq \prod_{\ell=0}^{n-1} [1 + C|f^\ell(x) - f^\ell(y)|^\gamma],$$

$y \in \eta_n(x)$ -ből egyúttal $f^\ell(y) \in \eta_{n-\ell}(f^\ell(x))$, így 9.1 Definíció c) pontja miatt

$$|f^\ell(x) - f^\ell(y)| \leq \lambda^{n-\ell}|f^n(x) - f^n(y)|$$

ahol $\lambda = \beta^{-1}$. A $\lambda_1 = \lambda^\gamma$ jelöléssel élve, és ismételten használva a $1 + x \leq e^x$ egyenlőtlenséget,

$$\begin{aligned} \frac{J_n(y)}{J_n(x)} &\leq \prod_{\ell=0}^{n-1} [1 + C\lambda_1^{n-\ell}|f^n(x) - f^n(y)|^\gamma] \leq \\ &\leq \prod_{\ell=1}^n [1 + C\lambda_1^\ell|f^n(x) - f^n(y)|^\gamma] \leq \\ &\leq \prod_{\ell=0}^{\infty} [1 + C\lambda_1^\ell|f^n(x) - f^n(y)|^\gamma] \leq \\ &\leq \exp \sum_{\ell=0}^{\infty} C\lambda_1^\ell|f^n(x) - f^n(y)|^\gamma = \\ &= \exp \left[|f^n(x) - f^n(y)|^\gamma \frac{C}{1 - \lambda_1} \right]. \end{aligned}$$

$C_1 = C(1 - \lambda_1)^{-1}$ választással adódik az első egyenlőtlenség.

A második igazolásához válasszuk a $B, B' > 0$ konstansokat úgy, hogy $\forall 0 \leq z \leq C_1$ -re $\exp z \leq 1 + Bz$ és $(1 + Bz)^{-1} \geq 1 - B'z$ teljesüljenek. Akkor

$$\frac{J_n(y)}{J_n(x)} \leq 1 + BC_1|f^n(x) - f^n(y)|^\gamma,$$

valamint x és y felcserélésével

$$\frac{J_n(y)}{J_n(x)} \geq [1 + BC_1|f^n(x) - f^n(y)|^\gamma]^{-1} \geq 1 - B'C_1|f^n(x) - f^n(y)|^\gamma.$$

Összesítve a két becslést

$$\left| \frac{J_n(y)}{J_n(x)} - 1 \right| \leq \max\{B, B'\}C_1|f^n(x) - f^n(y)|^\gamma. \quad \square$$

9.4 Lemma bizonyítása. Egyszerű integrálhelyettesítéssel $\forall I_{j_1, \dots, j_n}$ -re és $\forall y \in I_{j_1, \dots, j_n}$ -re

$$\begin{aligned} 1 = m((0, 1)) &= \int_{I_{j_1, \dots, j_n}} J_n(x) dx = J_n(y) \int_{I_{j_1, \dots, j_n}} \frac{J_n(x)}{J_n(y)} dx \leq \\ &\leq J_n(y) \int_{I_{j_1, \dots, j_n}} \exp[C_1|f^n(x) - f^n(y)|^\gamma] dx \leq J_n(y) \exp(C_1)m(I_{j_1, \dots, j_n}). \quad (9.9) \end{aligned}$$

(9.2) alapján annak figyelembevételével, hogy minden egyes I_{j_1, \dots, j_n} intervallum $f^{-n}(x)$ pontosan egy elemét tartalmazza

$$S_n(x) \leq \exp C_1.$$

Ezzel (i)-t beláttuk.

(ii) bizonyításához vegyük észre, hogy

$$S_n(x) - S_n(y) = \sum_{z \in f^{-n}(x)} \frac{1}{J_n(z)} - \sum_{z' \in f^{-n}(y)} \frac{1}{J_n(z')}$$

kifejezésben minden egyes I_{j_1, \dots, j_n} intervallumba pontosan 1-1 z illetve z' érték esik, így (9.3) figyelembevételével

$$|S_n(x) - S_n(y)| \leq \sum_{z \in f^{-n}(x)} \frac{1}{J_n(z)} \left| 1 - \frac{J_n(z)}{J_n(z')} \right| \leq C_2 S_n(x) |x - y|^\gamma. \quad \square$$

9.5 Lemma bizonyítása.

(i) következik (9.8)-ból.

(ii) -ben a sup-ra vonatkozó állítás éppen (9.6), míg ha $\inf H(x) = 0$, akkor (9.7)-ből $H(x) \equiv 0$ adódna, ami ellentmondás.

(iii), vagyis az ergodicitás igazolásához gondoljuk meg először, hogy ha $A \in \mathcal{I}$, akkor létezik olyan B , hogy egyrészt $\mu(A \Delta B) = 0$, másrészt $T^{-1}B = B = TB$, azaz B erősen invariáns halmaz, más szóval teljes orbitokból áll. Tegyük fel tehát, hogy A nemtriviális erősen invariáns halmaz. μ és m ekvivalenciája miatt $0 < m(A) < 1$.

Válasszunk egy tetszőleges $\varepsilon > 0$ számot. Lebesgue sűrűségi tétele miatt $\exists I_{j_1, \dots, j_n}$, hogy

$$m(A \cap I_{j_1, \dots, j_n}) > (1 - \varepsilon)m(I_{j_1, \dots, j_n})$$

azaz

$$m(I_{j_1, \dots, j_n} \setminus A) < \varepsilon m(I_{j_1, \dots, j_n}).$$

Lévén $f^n I_{j_1, \dots, j_n} = [0, 1]$, ezért, $1 = \int J_n(x) dx$. A középértéktételből adódik, hogy $\exists \xi \in I_{j_1, \dots, j_n}$, amelyre $J_n(\xi) = m(I_{j_1, \dots, j_n})^{-1}$.

Így

$$\max_{x \in I_{j_1, \dots, j_n}} J_n(x) = J_n(\xi) \max_{x \in I_{j_1, \dots, j_n}} \frac{J_n(x)}{J_n(\xi)} \leq \frac{e^{C_1}}{m(I_{j_1, \dots, j_n})}.$$

Tehát

$$\begin{aligned} m([0, 1] \setminus A) &= \int_{I_{j_1, \dots, j_n} \setminus A} J_n(x) dx \leq \frac{e^{C_1}}{m(I_{j_1, \dots, j_n})} m(I_{j_1, \dots, j_n} \setminus A) \leq \\ &\leq \frac{e^{C_1}}{m(I_{j_1, \dots, j_n})} \varepsilon m(I_{j_1, \dots, j_n}) = \varepsilon e^{C_1} \end{aligned}$$

Ez igaz minden $\varepsilon > 0$ -ra, ezért $m(A) = 1$, ellentmondás.

Befejezésül térjünk rá a tételben szereplő abszolút folytonos invariáns mérték unicitására. Tegyük fel indirekte, hogy az általunk konstruált μ mellett van még egy $\nu \neq \mu$, a Lebesgue-mértékre nézve abszolút folytonos invariáns mérték. Mivel μ sűrűsége pozitív, azért ν is abszolút folytonos μ -re. Jelölje $\rho = \frac{d\nu}{d\mu}$. Tetszőleges $h \in L_\infty(\mu)$ -re igaz:

$$\int \rho h \, d\mu = \int h \, d\nu = \int h \circ T \, d\nu = \int \rho(h \circ T) \, d\mu = \int (\rho \circ T^{-1})h \, d\mu$$

ahol használtuk mind ν , mind μ invariánciáját. Innen $\rho \circ T^{-1} = \rho$ μ -m. m., azaz ρ invariáns függvény. μ ergodicitása miatt ezért $\rho \equiv \text{const}$. Azonban lévén μ és ν valószínűségi mértékek, azért $\rho \equiv 1$, vagyis $\mu = \nu$. \square

Függelék

Hölder-folytonos függvények. Legyenek (M, d) , (M', d') metrikus terek. Az $f: M \rightarrow M'$ leképezés Hölder-folytonos az $x \in M$ pontban, ha megadhatók $C > 0$ és $0 < \gamma < 1$ konstansok és $x \in U \subset M$ környezet, hogy $\forall y, z \in U$ -ra

$$d'(f(y), f(z)) \leq Cd(y, z)^\gamma.$$

(A jól ismert Lipschitz-tulajdonság épp az analóg követelmény $\gamma = 1$ -gyel.)

Arzela–Ascoli tétel. Jelölje $C(M)$ az (M, d) kompakt metrikus téren értelmezett $M \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények halmazát. Az $F \subset C(M)$ részhalmaz akkor és csak akkor kompakt, ha

- (i) F zárt;
- (ii) $\forall x \in M$ -re az $F[x] := \{f(x) : f \in F\} \subset \mathbb{R}$ halmaz korlátos;
- (iii) az F -beli függvények egyenlő mértékben egyenletesen folytonosak (azaz $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$, hogy $\forall f \in F$ -re és $\forall x, y \in M$ -re $d(x, y) < \delta$ -ből $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ következik).

Felbontás. Legyen (M, \mathcal{F}, ν) valószínűségi mező. Pozitív mértékű halmazoknak egy megszámlálható $\mathcal{P} = \{A\}$ családját felbontásnak nevezzük, ha (i) $A \neq B \in \mathcal{P}$ -ből következik $\nu(A \cap B) = 0$; (ii) $\nu(M \setminus \bigcup_{A \in \mathcal{P}} A) = 0$.

Lebesgue sűrűségi tétele. Az $A \subset \mathbb{R}$ Borel-halmaznak az $x \in \mathbb{R}$ pont sűrűségi pontja, ha tetszőleges $\{I_n\}$ ($x \in I_n$) intervallumsorozatra $\lim_{n \rightarrow \infty} m(A \cap I_n)/m(I_n) = 1$. Állítás: Az A halmaz m -majdnem minden pontja A -nak sűrűségi pontja.

10. fejezet

Kolmogorov–Arnold–Moser tétel

A tételt a legegyszerűbb esetre mondjuk ki és bizonyítjuk: a körgyűrű síma forgatásának kis perturbációjára.

Jelölje $A := (\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})) \times [a, b] = \{(x, y) : 0 \leq x < 2\pi, a \leq y \leq b\}$ a körgyűrűt (annulust), ahol $0 < a < b$. Tekintsük ennek síma, monoton forgatását, azaz a $T_0: A \rightarrow A$

$$T_0(x, y) := (x + \gamma(y), y)$$

leképezést, ahol $\gamma \in C^1$ és $\gamma'(y) > 0$, továbbá legyen a $T: A \rightarrow A$ diffeomorfizmus

$$T(x, y) := (x + \gamma(y) + f(x, y), y + g(x, y))$$

ennek kis perturbációja. Az ilyen leképezéseket „twist”-leképezéseknek nevezzük. Az egyszerűség kedvéért azonnal feltesszük, hogy $\gamma(y) = \gamma \cdot y$.

A T_0 leképezésre nézve nyilván valamennyi $S_y := \{(x, y) : 0 \leq x < 2\pi\}$, $y \in [a, b]$ körvonal invariáns, T_0 mindegyiken forgatás; S_y -n a forgatási szám (amely mindig 1-re normált) $\frac{1}{2\pi}\gamma y$. Másszóval, a T_0 leképezés teljesen integrálható, és mindegyik S_y ún. invariáns tórusz. Az alapkérdés az, mi történik az invariáns tóruszoknak ezzel a „jölfésült” strukturájával a T leképezésnél, ahol f és g megfelelően kicsik?

Már Poincaré észrevette, hogy azok az invariáns tóruszok, ahol $\omega = \frac{1}{2\pi}\gamma y$ racionális (az ún. rezonáns tóruszok), eltűnnek tipikus kis perturbáció esetén. Az 50-es évekig azt hitték, hogy ugyanez történik a nem-rezonáns tóruszokkal is, sőt azt is gondolták, hogy kis perturbáció már ergodikus leképezéshez is vezethet (a 20-as években Fermi adott erre – hibás – bizonyítást).

1954-ben azonban Kolmogorov észrevette, hogy ennek az ellenkezője igaz: a tóruszok többsége túléli a kis perturbációt. Nevezetesen megmutatta, hogy ez áll az *erősen nem-rezonáns* tóruszokra, vagyis amelyek ω forgatási száma eleget tesz

a következő *diofantoszi feltételnek*: létezik olyan $\nu; \mu > 0$, hogy minden $p, q \in \mathbb{Z}$ -re

$$|\omega q - p| \geq \frac{\nu}{|q|^\mu}. \quad (10.1)$$

10.1 Lemma. *A diofantoszi feltételnek eleget tevő ω -k halmaza teljes mértékű.*

Bizonyítás Jelölje $\nu, \mu > 0$ -ra

$$\Delta_{\nu, \mu} := \{\omega: 0 \leq \omega \leq 1 \text{ és (10.1) teljesül } \forall p, q (\neq 0) \in \mathbb{Z} \text{-re}\}.$$

Nyilván $\mu < \mu'$ esetén $\Delta_{\nu, \mu} \subset \Delta_{\nu, \mu'}$, továbbá $\nu < \nu'$ esetén $\Delta_{\nu', \mu} \subset \Delta_{\nu, \mu}$. Így elég belátni, hogy tetszőleges $\mu > 1$ esetén $Leb(\Delta_{\nu, \mu}) \rightarrow 1$, amint $\nu \rightarrow 0 + 0$. Viszont

$$(\Delta_{\nu, \mu})^c = \bigcup_{p, q \neq 0} \left\{ \omega: 0 \leq \omega \leq 1 \text{ és } \left| \omega - \frac{p}{q} \right| < \frac{\nu}{|q|^{\mu+1}} \right\}$$

így

$$m((\Delta_{\nu, \mu})^c) \leq 2 \sum_{q=1}^{\infty} (q+1) \frac{\nu}{q^{\mu+1}} \leq 4\nu \sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{q^\mu}$$

ami tetszőlegesen kicsi, ha $\mu > 1$ és ν elég kicsi. \square

Térjünk rá a KAM-tétel pontos kimondására. Itt azzal az esettel foglalkozunk, amikor f és g analitikus függvények. Feltesszük tehát, hogy az $f(x, y)$ és $g(x, y)$ komplex változós függvények 2π -periódikusak az x szög-változóban, és analitikusak a

$$\mathcal{D} := \{(x, y) \in \mathbb{C}^2: |\operatorname{Im} x| < r_0, y \in \mathcal{D}_1\},$$

tartományban, ahol $\mathcal{D}_1 \subset \mathbb{C}$ nyílt tartomány, amelyre $[a, b] \subset \mathcal{D}_1$.

Megjegyezzük, hogy az általunk tekintett leképezésekre vezethető vissza az ún. redukált 3-test probléma a körös esetben. Az n -test probléma n darab pontszerű részecske gravitációs kölcsönhatással mozgó rendszerének leírását jelenti. A 2-test probléma épp a Kepler-feladat, az egyenletek megoldhatók, a 2 test kúpszelet alakú pályákon mozog, amelyek egyik fókusza a rendszer súlypontjában van. A redukált 3-test problémában azt az esetet nézzük, amikor a 3 részecske közül az egyiknek a tömege igen kicsi és úgy tekintjük a rendszert, mint a 2-test probléma perturbáltját. Abban a speciális esetben, amikor a 2-test problémában a részecskék pályái körök, a redukált 3-test probléma a körgyűrű általunk tekintett leképezésére vezet. (Megjegyezzük, hogy a legtöbb bolygó Nap körüli pályái nem nagyon térnek el a kör-pályáktól.)

Hamilton-rendszerek alapvető tulajdonsága, hogy rendelkezik síma invariáns mértékkel, ez a jól ismert Liouville-mérték. Ennek szellemében a körgyűrű diffeomorfizmusai esetén feltehetnénk, hogy ez a Lebesgue-mérték, a terület. Ennél azonban gyengébb hipotézist fogadunk el, az ún.

10.2 Feltételt. (Metszet-feltétel) *Tekintsük $\forall y \in [a, b]$ -re az S_y körvonal $T S_y := \{T(x, y): x \in [0, 2\pi)\}$ képét. Feltesszük, hogy $\forall y \in [a, b]$ -re*

$$T S_y \cap S_y \neq \emptyset.$$

Vázoljuk röviden, miért teljesül automatikusan a metszetfeltétel, ha T -re invariáns Lebesgue mérték (azaz, ha T területőrző). Tegyük fel, hogy T területőrző, mégis $\exists y_0$, hogy $TS_{y_0} \cap S_{y_0} = \emptyset$. Jelölje π_x és π_y az első, illetve a második koordinátára való vetítést az annuluson. Feltehetjük, hogy $\pi_y(TS_{y_0}) > y_0$ (a zárt körvonalat a T leképezés "felfelé mozgatja"), $\pi_y(TS_{y_0}) < y_0$ analóg módon tárgyalható. Az analiticitásból következik, hogy egyrészt $\pi_x(TS_y) = \mathbb{S}^1 = [0, 2\pi)$, $\forall y \in [a, b]$, másrészt $\forall y' > y_0$ esetén is $\pi_y(TS_{y'}) > y_0$. Így viszont a $T(\cup_{y \geq y_0} S_y)$ halmaz területe határozottan kisebb, mint a $\cup_{y \geq y_0} S_y$ halmaz területe.

10.3 Tétel. (KAM-tétel) *Tegyük fel, hogy $T: A \rightarrow A$ (ahol $b - a = 1$)*

$$T(x, y) := (x + \gamma y + f(x, y), y + g(x, y)) \quad (10.2)$$

a körgyűrű twist-diffeomorfizmusa, amely eleget tesz a metszet-feltételnek. Tegyük fel továbbá, hogy az x -ben 2π -periódikus $f(x, y), g(x, y)$ komplex változós függvények analitikusak a \mathcal{D} tartományban. Akkor $\forall \gamma \leq 1$ -re, $\forall \mathcal{D}$ -re és $\forall \varepsilon > 0$ -ra, továbbá $\forall \gamma > 0, \forall \mu > 1$ -re létezik olyan $\delta = \delta(\varepsilon, \mathcal{D}, \nu, \mu)$, hogy ha $\forall x, y \in \mathcal{D}$ -re

$$|f|, |g| < \gamma \cdot \delta \quad (10.3)$$

akkor minden $\omega/2\pi \in \Delta_{\nu, \mu} \cap (1/2\pi[a + \varepsilon, b - \varepsilon])$ -re T -nek van

$$\zeta := \zeta(\xi) := (\xi + u(\xi), v(\xi)) \quad (10.4)$$

invariáns görbéje, ahol u és v 2π -periódikus, $|Im \xi| < \frac{r_0}{2}$ -ben analitikus függvények. A ξ paraméter megválasztható úgy, hogy $(T\zeta)(\xi) = \zeta(\xi + \omega)$, továbbá

$$|u| + |v - \gamma^{-1}\omega| < \varepsilon. \quad (10.5)$$

Megjegyzések.

1. Tételünkben a megengedhető perturbációnak pusztán a γ -tól való függése látszik. A módszer javításával azt is bebizonyították, hogy $\forall \gamma \leq 1$ -re, $\forall \mathcal{D}$ -re, $\forall \varepsilon > 0$ -ra, továbbá $\forall \nu > 0, \forall \mu > 1$ -re létezik olyan $\delta = \delta(\varepsilon, \mathcal{D}, \mu)$, hogy ha $\forall x, y \in \mathcal{D}$ -re

$$|f|, |g| < \gamma \delta \nu^2$$

akkor igaz a tétel állítása. Sőt, az invariáns tóruszok ω -tól Lipschitz-folytonosan függenek, és a fázistérnek legalább $1 - O(\nu)$ mértékű részhalmazát alkotják.

2. Tételünk állítása közvetlenül kiterjeszthető többdimenziós Hamilton rendszerek esetére. A diofantoszi feltétel ez esetben: $\exists \nu > 0$ és $\exists \mu > 0$ konstansok, hogy $\forall k \in \mathbb{Z}^n, k \neq 0$ -ra

$$|(k, \omega)| \geq \frac{\nu}{|k|^\mu}$$

ahol $|k| := |k_1| + \dots + |k_n|, \omega := (\omega_1, \dots, \omega_n)$, és n a rendszer szabadsági fokainak száma.

3. Fontos megjegyzés, hogy $\mu < 1$ esetén $\Delta_{\nu,\mu} = \emptyset$. Ugyanis $\omega \in \Delta_{\nu,1}$ esetén

$$\nu \leq \inf_{p,q \in \mathbb{Z}} |q||\omega q - p| \leq \inf_{p,Q \in \mathbb{Z}_+} \min_{0 \leq q \leq Q} q|\omega q - p| \leq \inf_{p,Q \in \mathbb{Z}_+} Q \min_{0 \leq q \leq Q} |\omega q - p|.$$

Ugyanakkor a $q\omega \pmod{1} \in \mathbb{S}^1$, $0 \leq q \leq Q$ pontokra alkalmazva a skatulya-elvet, $\exists 0 \leq k < l \leq Q$, hogy $d_{\mathbb{S}^1}(k\omega, l\omega) < 1/Q$, azaz

$$\min_{0 \leq q \leq Q} |\omega q - p| \leq \frac{1}{Q}.$$

Tehát $\Delta_{\nu,1} = \emptyset$ ha $\nu \geq 1$. Hasonló gondolatmenettel $\mu < 1$ -re $\Delta_{\nu,\mu} = \emptyset$ is adódik.

Függelék

Analitikus függvények. Legyen $\mathcal{D} \subset \mathbb{C}$ a komplex sík egyszerűen összefüggő, nyílt tartománya. Az $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{C}$ függvényről azt mondjuk, hogy analitikus a \mathcal{D} tartományban, ha \mathcal{D} minden pontjában differenciálható. Akkor az is igaz, hogy minden $z \in \mathcal{D}$ elég kis környezetében a függvény konvergens hatványsorba fejthető.

Ha $I \subset \mathbb{R}$ véges intervallum, akkor az $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt valós analitikusnak mondjuk, ha $\forall x \in I$ -re x alkalmas környezetében a függvény konvergens hatványsorba fejthető. Ez esetben létezik olyan $\mathcal{D} \subset \mathbb{C}$ egyszerűen összefüggő, nyílt tartomány és $f_1: \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{C}$, hogy f_1 analitikus és $f_1|_I = f$.

Cauchy-féle integráltétel. Ha f analitikus a $\mathcal{D} \subset \mathbb{C}$ egyenesen összefüggő nyílt tartományban, akkor bármely a \mathcal{D} -ben fekvő zárt Γ út mentén integrálva

$$\oint f(z) dz = 0.$$

Fourier sor. Ha az $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -periódikus függvény integrálható a $[0, 2\pi]$ intervallumon, akkor Fourier együtthatói

$$f_k := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-ikx} f(x) dx \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Az f formális Fourier sora

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} f_k e^{ikx}.$$

11. fejezet

A homológikus egyenlet megoldása. A kis nevezők problémája

Itt egy látszatra távoli kérdéssel foglalkozunk, amely mégis a KAM-tételre adott bizonyításunk kiindulópontja lesz, és emellett frappánsan mutatja a diafantoszi feltétel szerepét a kis nevezők problémájának feloldásában.

A homológikus egyenlet a következő:

$$w(x + \omega) - w(x) = h(x), \quad (11.1)$$

ahol $x \in S = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ és $\frac{\omega}{2\pi}$ irracionális szám. Ennek megoldását keressük adott h esetén. Itt is az analitikus függvények körében dolgozunk, tehát feltesszük, hogy w és h 2π -periódikus komplex változós függvények, amelyek analitikusak az $|\operatorname{Im} x| \leq r$ sávban ($r > 0$).

Természetes lesz a Fourier-transzformáltakat használnunk, tehát legyen

$$\begin{aligned} h_k &:= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(x) e^{-ikx} dx \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ w_k &:= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} w(x) e^{-ikx} dx. \end{aligned} \quad (11.2)$$

Akkor – egyelőre formális megoldást keresve –

$$\begin{aligned} h(x) &= \sum e^{ikx} h_k \\ w(x) &= \sum e^{ikx} w_k \end{aligned} \quad (11.3)$$

és

$$w_k = \frac{h_k}{e^{ik\omega} - 1}, \quad \text{ha } k \neq 0, \quad (11.4)$$

végül feltehető, hogy

$$w_0 = 0.$$

A megoldhatóság triviális szükséges feltétele

$$h^* := h_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(x) dx = 0.$$

Kérdés, hogy a (11.4) együtthatókkal értelmezett (11.3) Fourier-sor mikor konvergál (és oldja meg a (11.1) egyenletet). Mivel

$$|\sin x| \geq \frac{1}{2} \min_p |x - p\pi| = \frac{\pi}{2} \min_p \left| \frac{x}{\pi} - p \right|,$$

azért – a diofantoszi feltételt is használva –

$$|e^{ik\omega} - 1| = 2 \left| \sin \frac{k\omega}{2} \right| \geq \pi \min_p \left| \frac{k\omega}{2\pi} - p \right| \geq \pi \frac{\nu}{|k|^\mu}.$$

Mivel h analitikus $|\operatorname{Im} x| \leq r$ -ben, ezért

$$\sup_{|\operatorname{Im} x| \leq r} |h(x)| = K < \infty$$

és

$$|h_k| \leq \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\pm ir}^{\pm ir + 2\pi} h(x) e^{-ikx} dx \right| = K e^{-|k|r}.$$

Ezért

$$|w_k| \leq K e^{-|k|r} \left(\pi \frac{\nu}{|k|^\mu} \right)^{-1}.$$

Tehát $\sum |w_k| < \infty$, sőt az $|\operatorname{Im} x| \leq \varrho$ ($0 < \varrho < r$) sávban

$$|w(x)| \leq \sum_{k \neq 0} \left| \frac{h_k}{e^{ik\omega} - 1} e^{ikx} \right| \leq \sum_{k \neq 0} K e^{-|k|r} \frac{|k|^\mu}{\nu\pi} e^{|k|\varrho}$$

ahonnan $|\operatorname{Im} x| \leq \varrho$ -ra

$$|w(x)| \leq C_1 \frac{K}{(r - \varrho)^{\mu+1}},$$

ugyanis

$$\int_0^\infty x^\mu e^{-x(r-\varrho)} dx = \frac{1}{(r-\varrho)^{\mu+1}} \int_0^\infty y^\mu e^{-y} dy.$$

Tehát igaz a

11.1 Tétel.

1. A homológikus egyenletnek – additív konstansától eltekintve – egyetlen folytonos megoldása lehet, ha $\frac{\omega}{2\pi}$ irracionális.

2. Ha h analitikus az $|Im x| \leq r$ sávban, $\int_0^{2\pi} h(x) dx = 0$, és ω diofantoszi, akkor létezik az egyenlet $w = Lh$ megoldása, amelyre az $|Im x| \leq \varrho$ sávban ($0 < \varrho < r$ esetén)

$$|w(x)| \leq C_1 \frac{K}{(r - \varrho)^{\mu+1}},$$

feltéve, hogy $\int_0^{2\pi} w(x) dx = 0$ ($K = \max_{|Im x| \leq r} h(x)$).

A tétel első állítása azért következik a fentebb mondottakból, mert folytonos h függvény esetén a w_k együtthatók (11.4) által egyértelműen meghatározottak, és a kérdés csupán az, van-e egyáltalán $w(x)$ függvény ezekkel a Fourier-együtthatókkal.

12. fejezet

Az invariáns tórusz formális felírása

A T leképezés invariáns görbáját azonnal a

$$\zeta := (\xi + u(\xi), v(\xi)) \quad (12.1)$$

alakban keressük, ahol ξ a 2π -periódikus szög-paraméter, vagyis feltesszük, hogy u és v 2π -periódikus függvények, mindkettő analitikus az $|\operatorname{Im} \xi| \leq \frac{r_0}{2}$ sávban. Feltesszük továbbá, hogy

$$(T\zeta)(\xi) = \zeta(\xi + \omega)$$

ahol $\frac{\omega}{2\pi}$ irracionális és $|u| + |v - \gamma^{-1}\omega|$ kicsi.

Az (12.1) invariancia-feltétel pontosan azt jelenti, hogy

$$\xi + u(\xi) + \gamma v(\xi) + f(\xi + u(\xi), v(\xi)) = \xi + \omega + u(\xi + \omega), \quad (12.2)$$

$$v(\xi) + g(\xi + u(\xi), v(\xi)) = v(\xi + \omega). \quad (12.3)$$

Ezt az alapegyenlet-rendszert kell megoldanunk. T_0 perturbációjának egyszerűbb esete lenne, ha $f(x, y) = \lambda f_0(x, y)$, $g(x, y) = \lambda g_0(x, y)$ -t választanánk, ahol λ kis paraméter. Ez azonban nem jelent lényeges könnyebbséget, ezért inkább feltesszük, hogy $f(x, y) = f(x, y, \lambda)$, $g(x, y) = g(x, y, \lambda)$ ahol f és a g -nek a kis, λ paramétertől függése is analitikus, amiből itt azt fogjuk használni, hogy a hatványsor véges részletösszegei a megfelelő maradéktaggal közelítenek. Ekkor $u(\xi)$ és $v(\xi)$ is függni fog λ -tól, ismét feltesszük, hogy analitikusan (valójában csak az kell nekünk, hogy a függvények formális hatványsorba fejthetők). (12.2)–(12.3) most így néz ki:

$$u(\xi + \omega, \lambda) = u + \gamma v - \omega + f(\xi + u, v, \lambda) \quad (12.4)$$

$$v(\xi + \omega, \lambda) = v + g(\xi + u, v, \lambda). \quad (12.5)$$

Tegyük fel tehát, hogy

$$f(x, y, \lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n f_n(x, y) \quad (12.6)$$

$$g(x, y, \lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n g_n(x, y) \quad (12.7)$$

$$u(\xi) = u(\xi, \lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n u_n(\xi)$$

$$v(\xi) = v(\xi, \lambda) = \gamma^{-1}\omega + \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n v_n(\xi)$$

(12.4)–(12.5)-ből együtttható összehasonlítással

$$u_n(\xi + \omega) - u_n(\xi) - \gamma v_n(\xi) = F_n(\xi) \quad (12.8)$$

$$v_n(\xi + \omega) - v_n(\xi) = G_n(\xi) \quad (12.9)$$

ahol $F_n(\xi)$ (és hasonlóan $G_n(\xi)$) λ^n együttthatója $f(\xi + \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n u_n(\xi), \gamma^{-1}\omega + \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n v_n(\xi), \lambda)$ (illetve $g(\xi + \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n u_n(\xi), \gamma^{-1}\omega + \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n v_n(\xi), \lambda)$) λ -hatványsorában. Mivel az (12.6)–(12.7) hatványsorokban a konstans tag 0, ezért

$$F_n(\xi) = f_n(\xi, \gamma^{-1}\omega) + \Phi_n\{f_\ell, u_\ell, v_\ell: \ell < n\}$$

$$G_n(\xi) = g_n(\xi, \gamma^{-1}\omega) + \Psi_n\{f_\ell, u_\ell, v_\ell: \ell < n\}.$$

Mint 11.1 Tételből tudjuk, (12.9) megoldhatóságának szükséges feltétele: $G_n^* = 0$. Ennek belátását későbbre halasztjuk. Mindenesetre, ha ez teljesül, akkor 11.1 Tétel alkalmazható, ha csak $F_n(\xi)$ és $G_n(\xi)$ analitikusak valamely sávban. A Fourier-együtthatókat (1. (11.2)) $\hat{}$ -al jelölve, és az n indexek kiírását mellőzve (az (12.8)–(12.9) egyenletek alakja n -től független!), a megoldás Fourier-együtthatói a következők (v. ö. (11.4))

$$\hat{v}_k = \frac{\hat{G}_k}{e^{ik\omega} - 1} \quad (k \neq 0)$$

$$\hat{u}_k = \frac{\hat{F}_k}{e^{ik\omega} - 1} + \frac{\gamma \hat{G}_k}{(e^{ik\omega} - 1)^2} \quad (k \neq 0)$$

$$\hat{v}_0 = -\frac{\hat{F}_0}{\gamma}, \quad \hat{u}_0 \text{ tetszőleges.}$$

Tényleges bizonyításaink ezeken a formális eredményeken alapszanak. Bizonyítjuk azonban ezek feltételét; ez az egyetlen lépés, ahol használni fogjuk a metszet-feltételt.

12.1 Lemma. $\forall n \geq 0$ -ra $\int_0^{2\pi} G_n(\xi) d\xi = 0$.

Bizonyítás. Indirekt. Tekintsük azt a legkisebb n értéket, amelyre

$$m = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} G_n(\xi) d\xi \neq 0$$

és g helyett a $g - m\lambda^n$ függvényt. Ekkor a (12.8)–(12.9) együttható-egyenletek megoldhatók nemcsak $(n-1)$ -ig hanem n -ig, és véve az

$$\begin{aligned} \tilde{u} &= \sum_{\ell=1}^n \lambda^\ell u_\ell \\ \tilde{v} &= \gamma^{-1}\omega + \sum_{\ell=1}^n \lambda^\ell v_\ell \end{aligned}$$

függvényeket, a (12.4)–(12.5) alapegyenletek teljesülnek mod $0(\lambda^{n+1})$, azaz

$$\begin{aligned} \xi + \tilde{u} + \gamma\tilde{v} + f(\xi + \tilde{u}, \tilde{v}) &= \xi + \omega + \tilde{u}(\xi + \omega) + 0(\lambda^{n+1}) \\ \tilde{v} + g(\xi + \tilde{u}, \tilde{v}) &= \tilde{v}(\xi + \omega) + m\lambda^n + 0(\lambda^{n+1}) \end{aligned}$$

(itt használjuk f és g véges sorfejtéseinek maradéktag-becsléseit). Mindez felfogható a következőképpen is: a $(\xi + \tilde{u}(\xi, \lambda), \tilde{v}(\xi, \lambda))$ görbe képe megegyezik az előbbi egyenletpár jobb oldalával. Ha a kép metszi a görbét, akkor valamely ξ -re és ξ'' -re, $\lambda \rightarrow 0$ esetben (bevezetve a $\xi' = \xi'' + \omega$ jelölést)

$$\begin{aligned} \xi + \tilde{u}(\xi, \lambda) &= \xi' + \tilde{u}(\xi', \lambda) + 0(\lambda^{n+1}) \\ \tilde{v}(\xi, \lambda) &= \tilde{v}(\xi', \lambda) + m\lambda^n + 0(\lambda^{n+1}). \end{aligned}$$

Innen $\xi' = \xi + 0(\lambda^{n+1})$ adódik az első egyenletből, míg ugyanekkor a másodikból $m = 0$ -t kapunk, ami ellentmondás. \square

13. fejezet

Feladatok

Megoldandók a \times -tel jelölt feladatok.

1. \times Legyen (M, \mathcal{B}, T) endomorfizmus, ahol M topologikus tér, \mathcal{B} a Borel σ -algebra, és T folytonos. A T endomorfizmust *topologikusan tranzitív*nek nevezzük, ha létezik sűrű orbit. T -t *minimális*nek nevezzük, ha nem létezik valódi, zárt, nem-üres, invariáns részhalmaza M -nek. 1. Igazoljuk, hogy a körvonal $R_\alpha : S \rightarrow S$, $R_\alpha := x + \alpha \pmod{1}$ forgatása topologikusan tranzitív, sőt minimális, ha $\alpha \notin \mathbb{Q}$. 2. Mutasson példát topologikusan tranzitív, de nem minimális leképezésre.
2. \times (V. Arnold) Tekintsük az $1, 2, \dots, 2^n, \dots$ számsorozat tizes számrendszerben felírt alakjának első jegyeit. Előfordul ezek között a 7? A 8? Ha igen, melyik gyakoribb?
3. \times Mutassuk meg, hogy ha valamely n -re T^n ergodikus endomorfizmus, akkor T is az. Adjunk példát arra, hogy az állítás megfordítása nem igaz.

$$\text{Utalás: } \mu(T^{-n}A\Delta A) \leq \sum_{j=0}^{n-1} \mu(T^{-j+1}A\Delta T^{-j}A), \text{ ugyanis } d(A, B) := \mu(A\Delta B)$$

metrikát definiál a mérhető részhalmazokon.

4. \times (Neumann ergodtétel operátorokra) Legyen U a H szeparábilis Hilbert tér izometriája, és P az ortogonális vetítés az invariáns vektorok $\mathcal{I} := \{f \in H \mid Uf = f\}$ alterére. Ekkor minden $f \in H$ -ra teljesül

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} U^i f = Pf.$$

5. \times Mutassuk meg, hogy 2^n , $n \in \mathbb{Z}^+$ az $0, 1, 2, \dots, 9$ jegyek tetszőleges véges hosszú sorozatával kezdődhet (az első jegy persze nem 0).

6. * (Simányi–Szász) Legyen (M, \mathcal{F}) mérhető tér, G csoport. Legyen adott minden $g \in G$ -re egy (M, \mathcal{F}, T_g) automorfizmus. Az $(M, \mathcal{F}, T_G) = \{(M, \mathcal{F}, T_g) : g \in G\}$ családot *csoport-hatásnak* nevezzük, ha $\forall g_1, g_2 \in G$ -re $T_{g_1 g_2} = T_{g_2} T_{g_1}$ (a G csoport hat az M téren). Tetszőleges $x \in M$ esetén az x G -pályájának nevezzük a $Gx := \{T_g x : g \in G\}$ halmazt.

Legyen adott $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{R}^d$, és tekintsük \mathbb{R}^d -ben az α -ra ortogonális g vektorok \mathbb{R}^{d-1} -el izomorf additív G csoportját. Hasson \mathbb{R}^d -n a G csoport a következőképpen: $\forall g \in G, x \in \mathbb{R}^d$ -re

$$T_g x = g + x.$$

\mathbb{R}^d -t faktorizálva \mathbb{Z}^d szerint végül is \mathbb{T}^d -n kapunk egy G -hatást.

Bizonyítsuk be, hogy

- G -nek csak akkor van \mathbb{T}^d -ben sűrű pályája, ha az α koordinátái között van kettő lineárisan független (és akkor minden pálya sűrű);
 - Az előbbi feltétel mellett a pályák aszimptotikusan egyenletes eloszlásúak (mit is jelent ez?);
 - ** Legyen adott $U \subset \mathbb{R}^d$ nyílt halmaz. Bizonyítsuk be, hogy van olyan véges F halmaza az α -knak, hogy ha $\alpha \notin F$, akkor $G = G_\alpha$ minden pályája metszi az U halmazt.
7. \times A csoport-hatás speciális esete a *csoport-eltolás*.

Legyen M kompakt topológikus csoport és μ a Haar-mérték M -en. Tetszőleges rögzített $g \in G$ -re legyen

$$T_g x = g \cdot x.$$

Ekkor $(M, \mathcal{F}, T_g, \mu)$ automorfizmus. Ez a példa egyben általánosítása a tórusz feltekerésének (1.12 Példa).

Mi T_g ergodicitásának feltétele, ha G Abel-csoport?

8. \times A \mathbb{T}^d tórusz $T_\alpha : \mathbb{T}^d \rightarrow \mathbb{T}^d, T_\alpha x = x + \alpha \pmod{1}$ eltolása akkor és csakis akkor minimális, ha $1, \alpha_1, \dots, \alpha_d$ racionálisan függetlenek.
9. \times A $D : S \rightarrow S, Dx = 2x \pmod{1}$ diadikus leképezés
- a) topologikusan tranzitív?
 - b) minimális?

10. \times Tekintsük az \mathbb{R}^2 sík $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ mátrixszal adott lineáris leképezését.

Mutassuk meg, hogy A természetes módon származtatja a $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ tórusz T_A automorfizmusát (kissé pongyolán $T_A x = Ax \pmod{\mathbb{Z}^2}$). Keressük meg ennek az invariáns mértékét!

11. \times Általánosítsuk az előző feladatban megjelenő szituációt magasabb dimenzióra is!

12. Tekintsük az $M = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}^+}$ halmazon a

$$(Tx)_i = \begin{cases} 1 - x_i & \text{ha } \forall j < i \text{-re } x_j = 1 \\ x_i & \text{különben} \end{cases}$$

összeadó gépet. (itt $x = (x_1, x_2, \dots) \in M$).

a) Keressünk invariáns mértéket!

b) Mi T^{-1} ?

13. \times $f: M \rightarrow M$ folytonos leképezése $M = \mathbb{T}^d$ -nek. f akkor és csakis akkor topologikusan tranzitív, ha $\forall U, V \subset M$ nyílt halmazra $\exists N = N(U, V)$ egész szám ($N \geq 1$), hogy $U \cap f^N V \neq \emptyset$. (Az állítás igaz lokálisan kompakt, szeparábilis metrikus terekre is.)

14. \times Tekintsük az $I = [0, 1]$ intervallum $Tx = 4x(1 - x)$ endomorfizmusát. Mutassuk meg, hogy I -nek vannak pontjai, amelyek sem periodikus pontok, sem gyengén periodikus pontok. (Útmutatás: 15. feladat.)

15. \times Mutassuk meg, hogy az előző feladatban szereplő leképezésnek a $\rho(x) = C \cdot (x(1 - x))^{-\frac{1}{2}}$ függvény az invariáns sűrűsége. Mi C értéke?

16. \times Mutassuk meg, hogy a 14. feladatban szereplő leképezés izomorf az

$$Tx = \begin{cases} 2x, & x < \frac{1}{2} \\ 2 - 2x, & x > \frac{1}{2} \end{cases}$$

sátor-tető leképezéssel. (Útmutatás: 15. feladat.)

17. \times Legyenek $x_1 < x_2 < \dots < x_8$ a T^3 leképezés fixpontjai, ahol T a 14. feladatban szereplő automorfizmus. Nyilván $x_1 = 0$.

a) Mely i -re lesz $x_i = \frac{3}{4}$?

b) Csoportosítsuk a maradék 6 pontot a T leképezés két 3 periodusú pályájába!

18. \times Legyen (M, \mathcal{F}, μ) mértéktér.

a) Mutassuk meg, hogy $d(A, B) := \mu(A \Delta B)$ pseudo-metrika. ($A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$)

b) Hogyan lehet $d(A, B)$ -t metrikává tenni?

c) Mutassuk meg, hogy

$$|\mu(X \cap Y) - \mu(U \cap V)| \leq \mu(X \circ U) + \mu(Y \circ V).$$

19. \times Mutassuk meg, hogy a pék leképezése: $T : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]^2$

$$T(x, y) = \begin{cases} \left(2x, \frac{y}{2}\right), & 0 < x < \frac{1}{2} \\ \left(2x - 1, \frac{y + 1}{2}\right), & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$$

ergodikus és keverő.

20. $\ast \times$ (Rényi Alfréd) T akkor és csakis akkor keverő, ha $\forall A \in \mathcal{F}$ -re

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(T^{-n}A \cap A) \rightarrow [\mu(A)]^2.$$

21. \times Mutassuk meg, hogy $[0, 1]$ következő leképezései ergodikusak és keverőek is:

$$\begin{aligned} \text{a) } Tx &= \left\{2x + \frac{1}{2}\right\} \\ \text{b) } Tx &= \begin{cases} 2x, & x < \frac{1}{2} \\ 2(1-x), & x > \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

22. Bizonyítsa be, hogy egy irreducibilis Markov-eltolás ergodikus.

23. Bizonyítsuk be, hogy minden aperiodikus irreducibilis Markov-eltolás keverő.

24. Tekintsük $[0, 1]^2$ -en az

$$\begin{pmatrix} 1 + \varepsilon & 1 \\ \varepsilon & 1 \end{pmatrix}$$

mátrix által definiált T leképezést. Legyen $x \in [0, 1]^2$ és $\mathbf{v}_\delta \in \mathbb{R}^2$, $|\mathbf{v}_\delta| = \delta \ll 1$, és $Lx, \mathbf{v} = \{y = x + t\mathbf{v}_\delta : t \in [-1, 1]\}$. Hogyan viselkedik $T^n Lx, \mathbf{v}$?

25. Bizonyítsuk be, hogy a

- a) szorzat
- b) ferde-szorzat
- c) felemelés

leképezések endomorfizmusok.

26. Mutassuk meg, hogy az indukált leképezés automorfizmus.

27. Bizonyítsuk be, hogy a T_1 és T_2 keverő, akkor $T_1 \times T_2$ is az.
 28. Ha T_1 és T_2 ergodikus, akkor $T_1 \times T_2$ akkor és csak akkor ergodikus, ha

$$\Lambda_d(T_1) \cap \Lambda_d(T_2) = \{1\}.$$

($\Lambda_d(T)$ jelöli a T által indukált operátor sajátértékeinek halmazát.)

29. \times Melyek a Gauss-leképezés fixpontjai?

30. *Jelölések, definíciók*

Legyen (M, \mathcal{F}, μ, T) endomorfizmus.

- a. Tegyük fel, hogy $\mu(A) > 0$. Legyen $T_A : A \rightarrow A$ a következő: legyen $T_A x := T^k x$, ha $k \in \mathbb{N}$ a legkisebb érték, amelyre $T^k x \in A$. T_A -t *Poincaré-leképezésnek* (vagy első visszatérés leképezésnek, vagy derivált leképezésnek) nevezzük.
 b. $f : M \rightarrow \mathbb{N}$ mérhető függvény. Jelölje

$$M_f = \{(x, k) \mid x \in M, 1 \leq k \leq f(x)\} \subset M \times \mathbb{N}.$$

Legyen \mathcal{F}_f az $A \times \{k\}$, $A \subset \mathcal{F}$, $k \in \mathbb{N}$ halmazok által generált σ -algebra és legyen $\mu_f(A \times \{k\}) = \mu(A)$. Legyen $T_f : M_f \rightarrow M_f$ a következő:

$$T_f(x, k) = \begin{cases} (x, k+1) & \text{ha } k \leq f(x) \\ (Tx, 1) & \text{ha } k = f(x). \end{cases}$$

Ekkor $(M_f, \mathcal{B}_f, \mu_f T_f)$ a *torony-endomorfizmus*. (Megjegyezzük, hogy μ_f csak akkor valószínűségi mérték, ha $\int_M f d\mu = 1$, de a definíció általában is értelmes, ha $f \in L_1(\mu)$.)

A. *Mutassuk meg, hogy a Poincaré-leképezés és a torony-leképezés is mértéktartóak.*

B. *Ha T ergodikus, $\mu(A) > 0$ és $f \in L_1(\mu)$, akkor T_A és T_f is ergodikusak.*

31. *Jelölések, definíciók:*

Legyen M topologikus tér, μ valószínűségi Borel-mérték

$$\text{supp } \mu = \bigcap_{F \text{ zárt, } \mu(F)=1} F \quad (\text{a } \mu \text{ mérték tartója})$$

$$\omega(x) = \bigcap_{n \in \mathbb{Z}_+} \bigcup_{j \geq n} T^j x \quad (\text{az } x \text{ fázispont } \omega\text{-limeszpontjai})$$

$$R(T) = \{x \in M \mid x \in \omega(x)\} \quad (T \text{ visszatérő pontjai})$$

Legyen (M, \mathcal{B}, μ, T) endomorfizmus, ahol M szeparábilis metrikus tér, \mathcal{B} a Borel σ -algebra, T folytonos. *Igazoljuk:*

A. M μ -majdnem mindenütt visszatérő, azaz $\text{supp } \mu \subset \overline{R(T)}$

B. Ha M kompakt és T ergodikus, akkor μ -majdnem mindenütt pont pályája sűrű $\text{supp } \mu$ -ben

32. \times Tekintsük a $[0, 1)$ intervallum $Tx = \{2(1 - x)\}$ leképezését.

a) Melyek T periodikus pontjai?

b) Határozzuk meg a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} [f(x) + f(Tx) + \dots + f(T^{n-1}x)]$$

értékét, ha $f(x) = \sin(2\pi x)$. Milyen értelemben vehetjük a limeszt?

33. \times Ergodikus-e a $[0, 1]$

$$Tx = \begin{cases} \frac{1}{2} - 2x, & 0 < x < \frac{1}{4} \\ 2x - \frac{1}{2}, & \frac{1}{4} < x < \frac{3}{4} \\ \frac{5}{2} - 2x, & \frac{3}{4} < x < 1 \end{cases}$$

leképezése?

34. \times Keressük a $[0, 1]$ intervallum

$$Tx \begin{cases} 3x, & 0 < x < \frac{1}{3} \\ \frac{3}{2} \left(x - \frac{1}{3}\right), & \frac{1}{3} < x < 1 \end{cases}$$

leképezésének invariáns mértékét.

35. \times Mikor ergodikus a $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Z}^2$ 2-tórusz $T_\alpha(x, y) = (x + \alpha, y + x)$ leképezése?