

### Félévi időbeosztás [házi feladat beadási határidőkkel]

**Figyelem! Ez a file az év során változhat, pld a HF beadási határidőket a gyakvezérek esetleg módosíthatják!**

Valószínűségszámítás matematikusoknak és fizikusoknak, 2015 ősz

-vel kez- dőző hét	Előadás H 12-14 Bálint Péter	MatFizgyak K 14-16 Vágó Lajos	Matgyak Cs 10-12 Pete Gábor	Fizgyak P 12-14 Vágó Lajos
Szept. 7	E1	Gy1	Gy1	Gy1
Szept. 14	E2	Gy2 [1. HF]	Gy2 [1. HF]	Gy2 [1. HF]
Szept. 21	E3	Gy3 [2. HF]	Gy3 [2. HF]	Gy3 [2. HF]
Szept. 28	E4	Gy4 [3. HF]	<b>TTK dékáni szünet</b> [3. HF: Sze 14-ig iroda]	Gy4 [3. HF]
Okt. 5	E5	Gy5	Gy4	Gy5 [4. HF]
Okt. 12	E6	Gy6 [4. HF]	Gy5 [4. HF]	Gy6 [5. HF]
Okt. 19	E7	Gy7 [5. HF]	Gy6 [5. HF]	<b>Nemzeti ünnep</b>
Okt. 27	E8	Gy8 [6. HF]	Gy7 [6. HF]	Gy7 [6. HF]
Nov. 2	E9	Gy9 [7. HF]	Gy8 [7. HF]	Gy8 [7. HF]
Nov. 9	E10	Gy10 [8. HF]	Gy9 [8. HF]	Gy9 [8. HF]
Nov. 16	E11	<b>TDK konferencia</b> [9. HF: Sze 14-ig iroda]	Gy10 [9. HF]	Gy10 [9. HF]
Nov. 23	E12	Gy11	Gy11	<b>Középsz. nyílt nap</b>
Nov. 30	E13	Gy12 [10. HF]	Gy12 [10. HF]	Gy11 [10. HF]
Dec. 7	E14	Gy13 [11. HF]	Gy13 [11. HF]	Gy12 [11. HF]

### Előadás napló

- 09.07 Bevezető példák. Eseménytér, mértékelmélet, egyszerű állítások. Szita formula.
- 09.14 Feltételes valószínűség, Szorzási szabály, Bayes-tétel, függetlenség.
- 09.21 Független kísérletek. Feltételes függetlenség. Diszkrét valószínűségi változók. Várható érték. Binomiális és geometriai eloszlás.
- 09.28 Val. változó függvényének várható értéke. Szórásnégyzet. Várható érték és szórás viselkedése lineáris átskálázásra. Indikátor változó és binomiális eloszlás szórása. Poisson eloszlás. Binomiális approximációja Poisson-nal. Poisson várható értéke, szórása. Példák Poisson eloszlásra.
- 10.05 Módusz, Binomiális eloszlás módusza. Bernoulli Nagy Számok Törvénye. Poisson folyamat definíciója, példák. Poisson pontfolyamat. Geometriai eloszlás szórása, örökifjúsága. Negatív binomiális és hipergeometrikus eloszlás.
- 10.12 Poisson folyamatra vonatkozó állítás bizonyítása. Eloszlásfüggvény és tulajdonságai, példák. Abszolút folytonos valószínűségi változók, sűrűségfüggvény. Folytonos várható érték, szórás. Egyenletes eloszlás. Bertrand-féle paradoxon.
- 10.19  $\mathbb{E}(g(X))$ -re vonatkozó állítás bizonyítása. Példa folytonos, de nem abszolút folytonos eloszlásra. Standard normális eloszlás és tulajdonságai. Standardizálás.  $\mu$  várható értékű és  $\sigma$  szórású normális eloszlás.
- 10.26 De Moivre-Laplace tétel lokális és globális alakja, Stirling formula. Alkalmazások. Exponenciális eloszlás; momentumok, örökifjúság, felezési idő, kapcsolat Poisson folyamattal, geometriai eloszlással. Medián.

### Ajánlott irodalom

Az elsődleges forrás, amit az előadások beosztása is viszonylag pontosan követ, a Balázs Márton – Tóth Bálint jegyzet. Más könyvjavaslatokkal együtt a kurzus honlapján megtalálható:

<http://www.math.bme.hu/~pet/valszam/Vsz2015.html>.

## HF feladatsor témák

Ez csak körülbelüli iránymutató. Az előadás menetétől függően a témák esetleg vándorolhatnak, régebbi témák mindig visszatérhetnek, a fő csapásiránytól eltérő érdekességek fölbukkanhatnak.

1. Alapvető kombinatorika, szita-formula, eseménytér, egyenlő valószínűségű események
2. Feltételes val., Bayes tétel, (feltételes) függetlenség
3. Diszkrét valószínűségi eloszlások 1. Binomiális, geometriai, negatív binom, hipergeom.
4. Diszkrét valószínűségi eloszlások 2. Várható érték és szórás, Poisson eloszlás
5. Poisson folyamat, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, esetleg egyenletes eloszlás  
(ZH1 itt)
6. Egyenletes eo, normális eloszlás, binomiális és Poisson eloszlás normális approximációja, deMoivre-Laplace
7. Exponenciális eloszlás, Poisson folyamat megint, Cauchy és lognormális eloszlás, eloszlástranszformációk
8. Diszkrét és folytonos együttes eloszlások, többdimenziós eloszlástranszformációk
9. Többdimenziós eloszlástranszformációk, függetlenség és konvolúció, feltételes eloszlások, feltételes várható érték
10. Összegek várható értéke, szórása, kovarianciák, korrelációk, indikátorok összege  
(ZH2 valószínűleg itt)
11. Többdimenziós normális és korrelációi (ez talán átcúsúzhat az utolsó gyakra)
12. Utolsó gyakorlaton meglátjuk, lehet csak gyakorlás, vagy kitekintés más témákra, ízlés szerint.

## Házi feladatok

Valószínűségszámítás matematikusoknak és fizikusoknak, 2015 ősz

A feladatok közül minden héten a beadandó házi feladatok meg vannak jelölve, ezek 2 (••) vagy 3 pontot (•••) érnek, összesen 10 pont értékben. Természetesen gyakorlásképpen javasoljuk a többi feladat beadás nélküli megoldását is. Egyes heteken szerepelnek bónuszfeladatok, ezek darabonként 3 pontot érnek. Függetlenül a többi feladattól, ezek az adott héten minden esetben beadhatók, és mindig kijavítjuk őket. A házi feladatok beadási határideje az első oldalon szerepel.

Részpontoszámokat adunk, de válaszokat csak indoklással fogadunk el. Az *igazi* csoportmunka hasznos, de ebben az esetben mindenki saját maga írja le a megoldást a saját szavaival (képleteivel). A passzív másolás viszont haszontalan: tapasztalatunk szerint az így szerzett házi feladat pontszámok többszörösen elvesznek ZH-kon és a vizsgán, amikor kiderül, hogy a másolt házi feladat nem hozta meg a kívánt fejlődést.

### 1. HF:

- 1.1 Hányféle (esetleg értelmetlen, de különböző) szót lehet kirakni a MISSISSIPPI betűiből (mindegyik betűt pontosan egyszer felhasználva)? Hát az ABRAKADABRA szó betűiből? Mi annak a valószínűsége, hogy ha felírjuk a betűket egy-egy kártyára, akkor jól megkeverve a paklit, a két szó egymást követve értelmesen kiolvasható lesz (abradabramississippi vagy fordítva)?
- 1.2
  - a) Hányféleképpen ülhet le egy sorban négy lány és három fiú?
  - b) Hányféleképpen ülhet le egy sorban négy lány és három fiú, ha a lányok egymás mellett ülnek, és a fiúk is egymás mellett ülnek?
  - c) És ha csak a fiúk kell, hogy egymás mellett üljenek?
  - d) Hányféleképpen ülhetnek le, ha azonos neműek nem ülhetnek egymás mellé?
- 1.3 Egy tánciskolába 12 hölgy és 13 úriember jár. Ha 6 hölgyet és 6 úriembert kell kiválasztanunk és párba rendeznünk, hányféle elrendezés lehetséges?

- 1.4 Egy társaság 8 nőből és 7 férfiből áll. Belőlük kell egy 4 nőből és 3 férfiből álló bizottságot alakítanunk. Hányféle különböző bizottság lehetséges, ha
- van két férfi, akik nem hajlandóak egy bizottságban dolgozni,
  - van két nő, akik nem hajlandók egy bizottságban dolgozni,
  - van egy nő és egy férfi, akik nem hajlandóak egy bizottságban dolgozni?
- 1.5 Egy árverésen 4 műgyűjtő vásárolt összesen 5 Dalit, 6 van Goghot, és 7 Picassót. Ha egy tudósító csak annyit jegyez fel, hogy melyik gyűjtő hány Dalit, van Goghot, és Picassót vásárolt, akkor hányféle különböző feljegyzés születhet?

- 1.6 a) Tekintsük a következő kombinatorikus azonosságot:

$$\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n \cdot 2^{n-1}.$$

Adjunk egy *részletes* kombinatorikai érvelést a fenti egyenlőség igaz voltára olymódon, hogy  $n$  emberből kiválasztunk egy tetszőleges létszámú bizottságot és annak elnökét, illetve az elnököt és hozzá a bizottságot.

- b) Ellenőrizzük a

$$\sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1) \cdot 2^{n-2}$$

azonosságot  $n = 1, 2, 3, 4$  esetén. Ismét adjunk *részletes* kombinatorikai érvelést az azonosságra:  $n$  emberből válasszunk egy tetszőleges méretű bizottságot, annak elnökét és titkárát (ez a kettő lehet egy személy is), illetve

- válasszunk egy elnököt, aki egyben a titkár is lesz, majd a bizottság többi tagját,
- válasszunk egy elnököt, egy tőle különböző titkárt, majd a bizottság többi tagját.

- c) A fentiekhez hasonlóan mutassuk meg, hogy

$$\sum_{k=1}^n k^3 \binom{n}{k} = n^2(n+3) \cdot 2^{n-3}.$$

- 1.7 Egy 100 000 lakosú városban három újság jelenik meg: I, II, és III. A városlakók következő aránya olvassa az egyes újságokat:

I: 26%	I és II: 6%	I és II és III: 2%
II: 18%	I és III: 9%	
III: 22%	II és III: 5%	

(Azaz például 6000 ember olvassa az I és II újságokat (közülük 2000 a III újságot is).)

- Határozzuk meg, hányan nem olvassák a fenti újságok egyikét sem.
- Hányan olvasnak pontosan egy újságot?
- Hányan olvasnak legalább kettő újságot?
- Ha I és III reggeli újságok és II egy esti újság, akkor hányan olvasnak legalább egy reggeli újságot plusz egy esti újságot?
- Hányan olvasnak pontosan egy reggeli újságot plusz egy esti újságot?

1.8 ••

- a) Legyen  $A$  és  $B$  két esemény. Bizonyítsuk be, hogy

$$\text{ha } \mathbf{P}\{A\} \geq 0.8 \text{ és } \mathbf{P}\{B\} \geq 0.6, \text{ akkor } \mathbf{P}\{A \cap B\} \geq 0.4.$$

- b) Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges  $A_1, A_2, \dots, A_n$  eseményekre fennáll a következő egyenlőtlenség:

$$\mathbf{P}\{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n\} \geq \mathbf{P}\{A_1\} + \mathbf{P}\{A_2\} + \dots + \mathbf{P}\{A_n\} - (n-1).$$

- 1.9  $n$  golyót helyezünk véletlen módon  $k$  urnába. Mi a valószínűsége, hogy *pontosan* egy urna marad üres, ha

- a) a golyók megkülönböztethetők,  
b) a golyók megkülönböztethetetlenek?
- 1.10 Egy régi vágású színházban a fogasra akasztják az érkező urak a kalapjaikat. Kifelé menet minden úr véletlenszerűen levesz egy kalapot a fogasról, és távozik. Mi annak a valószínűsége, hogy senki nem megy haza a saját kalapjában? Hogyan viselkedik ez a valószínűség aszimptotikusan amint  $n \rightarrow \infty$ ?
- 1.11 •• Egy sakktábla 64 mezőjére véletlenszerűen, egyenletes valószínűséggel elhelyezünk nyolc bástyát; egy mezőre csak egy bástya kerülhet. Mennyi a valószínűsége, hogy egyik bástya sem üti a másikat (azaz semelyik sor és semelyik oszlop nem tartalmaz egynél több bástyát)?
- 1.12 •••
- a) Hatszor feldobunk egy szabályos dobókockát. Mi a valószínűsége, hogy az 1, 2, ..., 6 eredmények mindegyike előfordul?  
b) Tízszer feldobunk egy szabályos dobókockát. Mi a valószínűsége, hogy az 1, 2, ..., 6 eredmények mindegyike (legalább egyszer) előfordul?
- 1.13 A bridzs játékban a négy, égtájakkal azonosított játékos mindegyikének 13 lapot osztanak ki egy 52 lapos francia kártyából. Számoljuk ki annak valószínűségét, hogy egy bridzsleosztásban Északnak semmilyen értékből se legyen meg mind a négy kártyája (azaz ne legyen se négy 2-e, se négy 3-a, ..., se négy  $K$ -a, se négy  $A$ -a).
- 1.14 Egy közösségben 20 család van: 5 családban egy gyerek van, 7 családban kettő, 4 családban három, 3 családban négy, 1 családban öt.
- a) Ha egy családot véletlenszerűen kiválasztunk, mi a valószínűsége, hogy abban a családban  $i$  gyerek van,  $i = 1, 2, 3, 4, 5$ ?  
b) Ha egy gyereket véletlenszerűen kiválasztunk, mi a valószínűsége, hogy ő egy  $i$  gyerekes családból jött,  $i = 1, 2, 3, 4, 5$ ?
- 1.15 Egy erdőben 18 őz lakik, közülük 5 meg van jelölve. Ha véletlenszerűen 4-et befognak, mi a valószínűsége, hogy a befogottak közül pontosan 2 megjelölt lesz?
- 1.16 Egy kisvárosban pontosan négy TV-szerelő dolgozik. Egy napon négyen hívnak szerelőt. Mi a valószínűsége, hogy pontosan  $i$  szerelő kap hívást  $i = 1, 2, 3, 4$ ?
- 1.17 Egy kisvárosban  $n$  TV-szerelő dolgozik. Egy napon  $k$  helyre hívnak szerelőt. Mi a valószínűsége, hogy pontosan  $i$  szerelő kap hívást  $i = 1, 2, \dots, n$ ?
- Bónusz: Jelölje  $f_n$  azt a számot, ahány  $n$  hosszú fej-írás sorozat van úgy, hogy nincs bennük egymás utáni két fej. Jelölje  $P_n$  ennek az eseménynek a valószínűségét szabályos érmedobás esetén.
- a) Mutassuk meg, hogy  $n \geq 2$ -re  $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ , ahol  $f_0 = 1, f_1 = 2$ . (Hány ilyen sorozat indul fejfel, és hány írással?)  
b) Határozzuk meg  $P_n$ -t  $f_n$  segítségével, és ezek alapján számoljuk ki  $P_{10}$  értékét.
- 1.18 Egy urnában van 6 piros, 6 fehér, és 7 kék golyó. Ötöt visszatevés nélkül húzva mi a valószínűsége, hogy mindhárom színű golyót húztunk?
- 1.19 ••• Anna, Bori és Cili egyforma erejű pingpongjátékosok. A következő módon játszanak: Anna és Bori méri először össze az erejüket. Ezután a vesztes kiáll, és a várakozó Cili áll be a helyére, hogy összemérje tudását az előző nyertessel... Minden egyes meccs után a vesztes átadja a helyét a várakozónak. Ezt mindaddig folytatják, amíg nem nyer valamelyikük kétszer egymás után, ő lesz a körmérkőzés győztese. Írjuk le a körmérkőzés eseményterét. Az  $n$  páros csata után véget érő sorozatok valószínűsége legyen  $2^{-n}$ . (Miért?) Mi a valószínűsége annak, hogy Anna, ill. Bori, ill. Cili nyeri a körmérkőzést?
- 1.20 Anna, Bori és Cili most érmét dobálnak, felváltva egymás után, Anna kezd, majd Bori dob, aztán Cili, majd megint Anna, és így tovább. Ezt mindaddig folytatják, míg valaki fejet nem dob.
- a) Írjuk le az eseményteret!  
b) Írjuk le az alábbi eseményeket az eseménytérre:  $A = \{ \text{Anna nyer} \}, B = \{ \text{Bori nyer} \}, (A \cup B)^c$ !
- 1.21 A lóversenyen 7 ló indul. Jelölje  $C$  azt az eseményt, hogy Csillag az első három hely valamelyikén ér be,  $R$  pedig azt, hogy Ráró a 2. helyen végez. Mennyi  $C \cup R$  valószínűsége? Hány elemi eseményt tartalmaz  $C \cup R$ ?

- 1.22 Kiosztunk egy pakli jól megkevert francia kártyát. Mi a valószínűsége, hogy
- a pikk ász a 14. kiosztott lap?
  - az első kiosztott ász a 14.-ként kiosztott lap?
  - az első négy lap különböző színű?
  - az első négy lap különböző figurájú?
- 1.23 Van két kockánk, amelyeket azonos módon színeztünk ki: két lapot pirosra, kettőt zöldre, egyet pedig sárgára, a maradék fehér. Ha feldobjuk őket egyszerre, mi a valószínűsége, hogy ugyanolyan színűre esnek? Mi a valószínűsége annak, hogy az első két feldobásra különböző színűek lesznek, majd harmadszorra ugyanolyanok?
- 1.24 6 férfit és 6 nőt véletlenszerűen két csoportba osztunk. Mi a valószínűsége, hogy a két csoportban 3–3 nő, illetve férfi lesz?
- Bónusz: Egy szekrényben  $n$  pár cipő van. Véletlenszerűen kiválasztunk  $2r$  cipőt ( $2r \leq n$ ). Mi a valószínűsége annak, hogy a kiválasztott cipők között
- nincsen teljes pár,
  - pontosan egy teljes pár van,
  - pontosan két teljes pár van?

## 2. HF:

- 2.1 Három kockát feldobunk. Feltéve, hogy a dobott számok között nincs két egyforma, mennyi a valószínűsége annak, hogy legalább az egyik hatos van?
- 2.2 Egy piros, egy kék, és egy sárga szabályos kockával dobunk. Legyen az általuk mutatott három szám rendre  $P$ ,  $K$ ,  $S$ .
- Mi a valószínűsége, hogy mindhárom dobás különböző?
  - Feltéve, hogy mindhárom dobás különböző, mi a valószínűsége, hogy  $P < K < S$ ?
  - Mennyi  $\mathbf{P}\{P < K < S\}$ ?
- 2.3 A barátommal snapszerozom. Ebben a játékban 20 kártyalap van, minden színből 5. Kiosztunk 5 – 5 lapot.
- Még nem néztem meg a lapjaimat. Mi a valószínűsége, hogy a barátomnak van zöldje?
  - Megnéztem a lapjaimat: két pirosat és három zöldet kaptam. Mi a valószínűsége, hogy a barátomnak van zöldje?
- 2.4 Vigyázat! Ebben a feladatban attól függően, milyen kísérlettel modellezzük a „véletlenszerű én” és a „véletlenszerű király” kiválasztását, különböző eredményeket kaphatunk. A megoldás része pontosan leírni azt is, hogy milyen kísérletben gondolkodunk és milyen feltevésekkel élünk.
- Én kétgyerekes családból származom. Mi a valószínűsége, hogy a testvérem lány?
  - A király kétgyerekes családból származik. Mi a valószínűsége, hogy a testvére lány?
- 2.5 Két golyó mindegyike egymástól függetlenül  $1/2$ - $1/2$  valószínűséggel feketére vagy aranyszínűre lett festve, majd egy urnába helyezték őket.
- Tegyük fel, hogy tudomásunkra jut, hogy az aranyszínű festéket használták, azaz legalább az egyik golyó aranyszínű lett. Ekkor mi a feltételes valószínűsége, hogy mindkét golyó aranyszínű?
  - Most tegyük fel, hogy az urna megbillent, az egyik golyó kigurult belőle, és azt látjuk, hogy ez a golyó aranyszínű. Ekkor mi a valószínűsége, hogy mindkét golyó aranyszínű?
- Magyarázzuk meg a válaszunkat.
- 2.6 Egy internetes közösségi száj felhasználói körébe meghívásos alapon lehet bejutni. Eredetileg két tagja van a közösségnek, Ádám és Éva. Néha a közösség valamelyik (egyenletesen választott) tagja meghív egy új embert. Ádám köréhez tartozik valaki, ha ő maga Ádám, vagy egy Ádám köréhez tartozó tag hívta meg. Mi a valószínűsége, hogy Ádám köre 1, 2 illetve 3 főből áll akkor, amikor 4 fős a közösség?
- 2.7 ••• Egy tehetségkutató versenyen három fordulóban válogatnak. Az első fordulóban hazaküldik a jelentkezők 80%-át, a többiek továbbjutnak a második fordulóra. A második forduló résztvevőinek 70%-ától bucsúznak el, aki ezen a rostán is túljut, mehet a harmadik fordulóra, ahol a résztvevők negyedét válogatják be a televíziós felvételre.

- a) A jelentkezők hányad része jut el a televíziós felvételre?  
 b) Valakiről csak annyit tudunk, hogy túljutott az első fordulón. Mi a valószínűsége, hogy látni fogjuk a TV-ben?  
 c) Tekintsük mindazokat a jelentkezőket, akik nem jutottak el a televíziós felvételig. Hányad részüket küldték haza rendre az első, a második és a harmadik fordulóban?
- 2.8 Három szakács,  $A$ ,  $B$  és  $C$ , egy speciális süteményt sütnek, melyek azonban sajnos rendre 0.02, 0.03, 0.05 valószínűséggel nem kelnek meg rendesen a három szakács keze alatt. Az étteremben ahol dolgoznak,  $A$  süti a sütemények 50%-át,  $B$  a 30%-át,  $C$  pedig a 20%-át. A rossz sütemények hány százalékát sütötte  $A$ ?
- 2.9 ••• A piacon a 10 tojást tartalmazó dobozok 60%-ában minden tojás ép, 30%-ában pontosan egy tojás törött, 10%-ában pontosan két tojás törött. A törött tojások helye a dobozban véletlenszerű. Veszek egy doboz tojást a piacon és bosszankodva tapasztalom, hogy az első tojás, amit kiveszek a dobozból, törött. Mi a valószínűsége, hogy a dobozban ott lapul még egy törött tojás?
- 2.10 •• Egy első- és másodévesek által látogatott tárgyat 8 elsőéves fiú, 6 elsőéves lány, 4 másodéves fiú vett fel. Hány másodéves lány vette fel a tárgyat, ha tudjuk, hogy egy, a tárgy hallgatói közül véletlenül választott hallgató neme és évfolyama független egymástól?
- 2.11 Egy genetikai rendellenesség a magzatok fél százalékát érinti. Egy „megbízhatónak számító” diagnosztikai eljárás a meglévő rendellenességet biztosan detektálja, míg rendellenesség hiányában 95% valószínűséggel a helyes negatív választ adja, 5% valószínűséggel pedig a hibás pozitív választ. Ha az eljárás eredménye pozitív, mi a valószínűsége, hogy magzatunknak tényleg megvan a rendellenessége?
- 2.12 Tegyük fel, hogy szabályos fej-írás dobást szeretnénk generálni, de csak egy cinkelt érme áll rendelkezésünkre, amely általunk ismeretlen  $p$  valószínűséggel mutat fejet. Tekintsük a következő eljárást.
- (a) Feldobjuk az érmét.  
 (b) Megint feldobjuk az érmét.  
 (c) Ha mindkét dobás eredménye fej, vagy mindkét dobás eredménye írás, akkor újrakezdjük az első lépéssel.  
 (d) Ha viszont a két dobás eredménye különböző, akkor az utolsó eredmény lesz az algoritmus kimenete.
- a) Mutassuk meg, hogy az algoritmus egyforma valószínűséggel szolgáltat fejet vagy írást.  
 b) Lehetne-e úgy egyszerűsíteni az eljárást, hogy addig dobjuk az érmét, amíg két egymást követő dobás különböző lesz, és az utolsó dobást tekintjük?
- 2.13 Egy  $n$  elemű halmazból az  $A$  és  $B$  véletlen részhalmazokat egymástól függetlenül egyenletes eloszlással választjuk ki a  $2^n$  lehetséges részhalmaz közül.
- a) Mutassuk meg, hogy  $\mathbf{P}\{A \subseteq B\} = \left(\frac{3}{4}\right)^n$ . (Tipp: tekintsük az eredeti halmaz minden egyes elemét.)  
 b) Mutassuk meg, hogy  $\mathbf{P}\{A \cap B = \emptyset\} = \left(\frac{3}{4}\right)^n$ .
- 2.14 Egy szabályos érmét kétszer feldobunk. Legyen  $A$  az az esemény, hogy az első dobás eredménye fej,  $B$  az az esemény, hogy a második dobás eredménye fej, és  $C$  az az esemény, hogy a két dobás eredménye egyezik. Mutassuk meg, hogy  $A$ ,  $B$  és  $C$  páronként függetlenek, de nem függetlenek.
- 2.15 •• Adott egy  $n$  fős társaság. Jelölje  $A_{i,j}$ ;  $1 \leq i < j \leq n$  azt az eseményt, hogy a társaság  $i$ -dik és  $j$ -dik tagjának ugyanaz a születésnapja.
- a) Páronként független-e ez az  $\binom{n}{2}$  esemény?  
 b) Teljesen független-e ez az  $\binom{n}{2}$  esemény?
- 2.16 Az időjárás-előrejelzés egyszerű modelljeként tegyük fel, hogy az idő vagy esős, vagy napos, és  $p$  annak a valószínűsége, hogy holnap ugyanolyan lesz mint ma, a korábbi napoktól függetlenül. Ha az idő napos január elsején, legyen  $P_n$  annak valószínűsége, hogy  $n$  nap múlva szintén napos. Mutassuk meg, hogy  $P_n$  kielégíti a

$$P_n = (2p - 1)P_{n-1} + (1 - p), \quad n \geq 1; \quad P_0 = 1$$

rekurziót. Bizonyítsuk be, hogy  $P_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p - 1)^n$  minden  $n \geq 0$  esetén.

Bónusz Móricka élete első valószínűségszámítás vizsgáján  $\frac{1}{2}$  eséllyel megy át. Ha ezen megbukik, a következőre már kevesebbet tanul, ezen csak  $\frac{1}{3}$  a siker valószínűsége. Minél többször bukik meg, annál kevesebbet tanul, így  $k - 1$  sikertelen vizsga után már csak  $\frac{1}{k+1}$  az esélye, hogy a  $k$ -dik vizsgán átmegy. Ám Móricka kitartó, és a szabályzat szerint akárhányszor vizsgázhat. Mennyi a valószínűsége, hogy előbb-utóbb átmegy?

- 2.17 Egy vadász 30 méter távolságban felfedez egy rókát és rálő. Ha a róka ezt túléli, akkor 10 m/s sebességgel próbál menekülni. A vadász 3 másodpercenként újratölt és lő a rókára, mindaddig, amíg meg nem öli, vagy (szerencsés esetben) a róka el nem tűnik a látóhatáron. A vadász találati valószínűsége a távolság négyzetével fordítottan arányos, a következő képlet szerint:

$$P\{\text{a vadász eltalálja az } x \text{ méter távolságban levő rókát}\} = 675x^{-2} \quad (x \geq 30).$$

Ha találat is éri a rókát, nem biztos, hogy fatális: az egyes találatokat (függetlenül azok számától) a róka  $1/4$  valószínűséggel túléli. Mi a valószínűsége annak, hogy a róka túléli ezt a kellemetlen kalandot?


(Tipp: Analízisből tudjuk, hogy ha  $0 < \varepsilon_n < 1$  minden  $n$ -re, akkor  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 - \varepsilon_n) > 0$  pontosan akkor, ha  $\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n < \infty$ .)

Megjegyzés: A feladatot nyilván matematikusok találták ki matematikus diákoknak. Miért rossz modellje ez a rókavadászatnak?

- 2.18 Iszákos Iván a nap  $2/3$  részét kocsmában tölti. Mivel a faluban 5 kocsmában van, és Iván nem válogatós, azonos eséllyel tartózkodik bármelyikben. Egyszer elindulunk, hogy megkeressük. Négy kocsmát már végigjártunk, de nem találtuk. Mi a valószínűsége annak, hogy az ötödikben ott lesz?
- 2.19 Móricka és Pistike pingpongoznak. Minden játszmát a többitől függetlenül Móricka  $p$ , Pistike pedig  $q$  valószínűséggel nyer meg, ahol  $p > 0$ ,  $q > 0$  és  $p + q = 1$ . A játék akkor ér véget, ha valaki két egymás utáni játszmát megnyer.
- Mi a valószínűsége, hogy Móricka nyeri az utolsó játszmát?
  - Mi a valószínűsége, hogy ugyanaz nyeri az első játszmát, mint az utolsót?
  - Ha tudjuk, hogy az utolsó játszmát Móricka nyerte, mennyi a valószínűsége, hogy az első is?
- 2.20 Egy televíziós vetélkedőben a játékosnak három ajtó közül kell választania, és a mögötte elrejtett nyereményt kapja jutalmul. Az egyik ajtó mögött egy luxusautó található, a másik kettő mögött pedig egy-egy kecske. Mikor a játékos kiválasztott egyet a háromból, a játékvezető a másik két ajtó közül kinyit egyet, ami mögött kecske van, és felajánlja, hogy a játékos még megváltoztathatja a döntését. Érdemes-e áttérni a másik ki nem nyitott ajtóra? Mekkora valószínűséggel nyerjük meg így az autót?
- 2.21  $n$  dobozban elhelyezünk  $N$  golyót úgy, hogy mind az  $n^N$  elhelyezés egyenlően valószínű. Feltéve, hogy egy adott dobozba esik golyó, mennyi a valószínűsége annak, hogy  $K$  golyó esik bele?
- 2.22 Aladár, Béla, Cili és Dömötör hazudósak: átlagosan az esetek  $2/3$ -ában hazudnak mind a négyen, egymástól függetlenül, véletlenszerűen.  
Aladár azt állítja, hogy Béla tagadja, hogy Cili azt mondta, hogy Dömötör hazudott.  
Mi a valószínűsége annak, hogy Dömötör igazat mondott? (Feltételezzük, hogy Aladár tudja, hogy mit mindott Béla, Béla tudja, hogy mit mindott Cili, Cili tudja, hogy mit mindott Dömötör. Továbbá, hogy Cili azt is el tudja dönteni, hogy Dömötör hazudott-e vagy sem.)
- 2.23 Adott egy (végtelen térfogatú) urnánk és végtelen sok, az  $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$  elemeivel számozott, golyónk. Az urna eredetileg üres. Éjfél előtt egy perccel fogjuk az 1, 2, ..., 10 számú golyókat, behelyezzük őket az urnába, az urnát jól összerázzuk, majd véletlenszerűen kihúzzuk az urnából egy golyót, amit elhajítunk. Éjfél előtt fél perccel fogjuk a 11, 12, ..., 20 számú golyókat, behelyezzük őket is az urnába, az urnát jól összerázzuk, majd véletlenszerűen kihúzzuk az urnából egy golyót, amit elhajítunk. Éjfél előtt  $2^{-n}$  perccel fogjuk az  $10n + 1, 10n + 2, \dots, 10(n + 1)$  számú golyókat, behelyezzük őket is az urnába, az urnát jól összerázzuk, majd véletlenszerűen kihúzzuk az urnából egy golyót, amit elhajítunk. És ezt így folytatjuk éjfélig. Bizonyítandó, hogy éjfélkor az urna 1 valószínűséggel üres lesz.

### 3. HF:

- 3.1 •• Alább egy áramkör, ahol mindegyik kapcsoló egymástól függetlenül  $1/2 - 1/2$  valószínűséggel van nyitva vagy zárva.



- Mi a valószínűsége, hogy  $A$ -tól  $B$ -ig áram folyhat ezen az áramkörön? (Ezért itt külön nem jár pont, de érdekes: válaszoljunk számolás nélkül is, szimmetriák segítségével! (Persze ha valaki így pontosan leírja, az is teljes értékű megoldás.))
- 3.2 50 százalék az esélye, hogy a királynő hordozza a hemofliáért felelős gént. Ha hordozó, akkor mindegyik hercegnek 50-50 százalék az esélye arra, hogy hemofiliás legyen. Ha a királynő három fia nem hemofiliás, mekkora az esélye annak, hogy a királynő hordozó? Ha születik egy negyedik herceg is, mekkora az esélye annak, hogy hemofiliás lesz?
- 3.3 •• 5 férfit és 5 nőt rangsorolnak egy vizsgán. Tegyük fel, hogy nincs két egyforma pontszám, és mind a 10! elrendezés egyformán valószínű. Legyen  $X$  a legjobb nő helyezése (például  $X = 1$  azt jelenti, hogy a legjobb vizsgázó egy nő). Határozzuk meg  $X$  eloszlását és várható értékét.
- 3.4 Öt játékos,  $A, B, C, D, E$  között véletlenszerűen szétosztjuk a számokat 1-től 5-ig, ismétlődés nélkül. Először  $A$  és  $B$  mérkőzik: akinek magasabb a száma, továbbjut. Az így továbbjutó most  $C$ -vel mérkőzik, azután a közülük továbbjutó  $D$ -vel, majd az itt nyertes  $E$ -vel. Legyen  $X$  az a szám, ahány mérkőzést  $A$  nyer. Határozzuk meg  $X$  eloszlását és várható értékét.
- 3.5 Szindbádnak egyszer megadott, hogy  $N$  háremhölgy közül kiválassza a legszebbet a következő játékszabály szerint: az  $N$  háremhölgy egyenként vonult el előtte, azok valamelyikét kellett kiválasztania. A már elvonultak nem hívhatók vissza és azokról, akik még nem vonultak el, semmit sem tudott. Feltételezzük, hogy a háremhölgyeknek jól definiált szépségfokozatuk van: van egy legszebb, egy második legszebb, egy harmadik legszebb, és végül a legkevésbé szép közöttük. Továbbá azt is feltételezzük, hogy véletlen sorrendben vonulnak el Szindbád előtt: mind az  $N!$  lehetséges sorrendjük egyformán valószínű.
- Szindbád a következő stratégiát választotta:  $k$  hölgyet hagyott elvonulni, majd ezután kiválasztotta azt, amelyik szebb volt az összes előtte már elvonultnál (és ha ilyen hölgy nem akad, akkor Szindbád magányosan távozik). Mi a valószínűsége annak, hogy ezzel a módszerrel valóban a legszebb háremhölgyet választotta? Határozzuk meg azt a  $k$ -t, amely mellett a fenti stratégia optimális  $N \rightarrow \infty$  határesetben, és a stratégiához tartozó valószínűséget is. (Tipp: használjunk teljes valószínűség tételt aszerint, hogy a legszebb hölgy hanyadikként jön(ne) el Szindbád előtt.)
- 3.6 Egy családban  $n \geq 1$  gyermek  $\alpha p^n$  valószínűséggel van, ahol  $\alpha \leq (1-p)/p$ .
- A családok hányadrésében nincs gyermek?
  - Ha a gyermekek egymástól függetlenül egyforma eséllyel fiúk és lányok, akkor a családok hányadrésében lesz pontosan  $k$  fiú (és tetszőleges számú lány)?
- 3.7 Van két ránézésre megkülönböztethetetlen érménk, egy igazságos és egy cinkelt. A cinkelt érme  $\frac{3}{4}$  valószínűséggel ad fejet. Előveszem az egyik érmét a zsebemből,  $\frac{1}{2}$  eséllyel az igazságosat,  $\frac{1}{2}$  eséllyel a cinkeltet, és feldobom 30-szor, ebből  $k$  alkalommal esett a Fej oldalára. Ez alapján kell eldöntenem, hogy melyik érmét választottam. Milyen  $k$  értéknél húznánk meg a határt?
- 3.8 •• Az  $\alpha$  kockának 4 piros és 2 fehér, míg a  $\beta$  kockának 2 piros és 4 fehér lapja van. Feldobunk egy érmét. Ha fej a dobás eredménye, akkor a továbbiakban az  $\alpha$  kockát használjuk, ha pedig írás akkor a  $\beta$ -t. Az így kiválasztott kockával egymásután  $n$ -szer dobunk.
- Mi annak a valószínűsége, hogy a  $k$ -adik dobásnál az eredmény piros? ( $k = 1, 2, \dots, n$ )
  - Feltéve, hogy mind az első  $k - 1$  kockadobás eredménye piros, mi annak a valószínűsége, hogy a  $k$ -adik dobás eredménye is piros lesz? ( $k = 1, 2, \dots, n$ )
- 3.9 Egy ketyere két különböző okból romolhatott el. Az első ok ellenőrzése  $E_1$  forintba kerülne, és ha valóban az a probléma, akkor a javítása  $J_1$  forint. Hasonlóan, a második ok ellenőrzése  $E_2$  forintba kerül, és ha az a probléma, akkor a javítás  $J_2$  forint. (Ha viszont az először ellenőrzött oknál nincs probléma, akkor a másik lehetséges okot először ellenőriznünk kell, majd javítanunk.) Legyen  $p$  és  $1 - p$  annak valószínűségei, hogy a ketyere az első illetve a második okból romlott el. Határozzuk meg, mely  $E_1, E_2, J_1, J_2, p$  értékek mellett érdemesebb várhatóan az első okkal kezdeni az ellenőrzést, és melyeknél a második okkal.
- 3.10 A Magyar Etikett Intézet felmérése szerint Magyarországon a fiúk két kategóriába oszthatóak: 2/3-uk udvarias, 1/3-uk udvariatlan. Az udvarias fiúk az esetek 90%-ában engedik előre a lányokat az ajtóban, az udvariatlanok viszont csak az esetek 20%-ában. Láttam, hogy Jancsi előre engedte Juliskát, Jutkát viszont nem.
- Mennyi annak a valószínűsége, hogy Jancsi az udvariatlan kategóriába tartozik?



b) Mennyi annak a valószínűsége, hogy ezek után Jancsi Erzsit is előre fogja engedni?

3.11 Sárkányföldön az  $n$  fejű sárkány

$$p_n = \binom{6}{n-1} \cdot 0.7^{n-1} \cdot 0.3^{7-n}$$

valószínűséggel fordul elő ( $n = 1, 2, \dots, 7$ ). Egy sárkány fejeinek levágása veszélyes művelet: az ember minden fejét egymástól függetlenül 90% eséllyel tudja levágni, és ha ez nem sikerül, akkor a sárkány megeszi az embert.

- Elém kerül egy sárkány, de a nagy ködben nem látom, hogy hányfejű. Mi az esélye, hogy túlélem a találkozást?
- Tegyük fel, hogy épp most vágtam le a hatodik fejét, de még mindig nem látom, hogy maradt-e feje. Ilyen helyzetből mekkora valószínűséggel élem túl a harcot?
- Csata után találkozom a cimborámmal, aki szintén legyőzött egy sárkányt. Ezt figyelembe véve mi a valószínűsége, hogy hétfejűvel volt dolga?

3.12 Két dobókockát dobálunk, és mindig az összeget tekintjük.

- Addig dobunk, míg a két kockán lévő pöttyök összege 7 nem lesz. Mi a valószínűsége, hogy nem dobtunk előtte 11-et?
- Most addig dobunk, míg a dobott összeg 7 vagy 11 nem lesz. Mi a valószínűsége, hogy amikor megállunk, 7 az összeg?
- Lássuk be, hogy a dobások száma a b) feladatban és az, hogy mennyi az összeg megálláskor, függetlenek.

3.13 András és Béla a következő játékot játsszák. Egy urnában van 5 piros és 5 kék golyó. Két golyót húznak, ha a golyók azonos színűek, András fizet Bélanak 100 forintot, ha a golyók különböző színűek, Béla fizet Andrásnak  $x$  forintot. Hogyan válasszák  $x$ -t, ha azt szeretnék, hogy igazságos legyen a játék?

3.14 Pisti nem tanult semmit a vizsgára, ahol 10 eldöntendő kérdésre kell válaszolnia. Az anyagból valami kevés dereng, így minden kérdésre a többitől függetlenül 60% eséllyel ad helyes választ. A ketteshez legalább 8 helyes választ kell adnia.

- Milyen valószínűséggel megy át Pisti a vizsgán?
- Ha Pisti megbukik, a következő vizsgán ismét tanulás nélkül próbálkozik addig, amíg egyszer nem sikerül. Határozzuk meg a próbálkozások számának várható értékét.

3.15 Amerikában egy esküdtsték elítéli a vádlottat, ha a 12 esküdte közül legalább 8 bűnösnek szavazza. Ha minden esküdt  $\theta$  valószínűséggel dönt helyesen, akkor mi a valószínűsége a helyes döntésnek? Tegyük fel, hogy a vádlott  $p$  valószínűséggel bűnös valójában.

3.16 •• Kaszinóban az alábbi játékot játsszuk: Minden lépésben fogadunk előre az  $i = 1, 2, \dots, 6$  számok valamelyikére, majd feldobnak 3 kockát. Ahányszor kijött a fogadott számunk, annyi petákot kapunk, ellenben fizetnünk kell 1 petákot, ha egyszer sem jött ki a fogadott szám. Fair-e a játék?

3.17 Egy  $n$  komponensű rendszer alkatrészei egymástól és a múltjuktól is függetlenül minden nap  $p$  valószínűséggel meghibásodnak, de ezeket esténként kijavítjuk. A rendszer leáll, ha legalább  $k$  alkatrész meghibásodott. Mi annak a valószínűsége, hogy először a  $t$ . napon áll le a rendszer?

Bónusz Pólya urna: Egy urnában kezdetben  $a$  piros és  $b$  kék golyó van. Minden egyes lépésben kihúzzunk egy golyót, megnézzük, milyen színű, majd őt és egy vele megegyező színű golyót visszateszünk. (Vagyis a golyók száma az urnában minden lépésben eggyel nő).

- Legyen  $a = b = 1$ . Mi a valószínűsége, hogy a  $t$ . lépés után  $k$  kék golyó van az urnában? ( $k = 1 \dots (t+1)$ )
- Legyen  $a$  és  $b$  tetszőleges. Mi a valószínűsége, hogy a  $t$ . lépés után  $k$  kék golyó van az urnában? ( $k = b \dots (t+b)$ )

3.18 Egy vetélkedőn egy házaspár alkot egy csapatot. Amikor a műsorvezetőtől egy eldöntendő kérdést kapnak, mindketten egymástól függetlenül  $p$  valószínűséggel adnának helyes választ. Mi a jobb stratégia:

- egyiküket kijelölik, aki a másikra nem hallgatva válaszol a kérdésre, vagy
- mindketten gondolkodnak a kérdésen, ha egyetértenek, ezt a választ adják, ha pedig különböző a véleményük, egy szabályos pénzérme feldobásával döntenek el, hogy mit válaszoljanak.

- 3.19 Véletlenszerűen elhelyezünk egy huszárt egy üres sakktablára. Mennyi a lehetséges lépései számának a várható értéke?
- 3.20 Egy gép véletlenszerűen választ 1 és 10 közötti számot, amit nekünk kell kitalálni, úgy, hogy kérdéseket teszünk fel, amire a gép igennel vagy nemmel válaszol. Számoljuk ki, várhatóan hány kérdést kell a gépnek feltennünk,
- ha csak rákérdezhetünk, azaz azt kérdezzük, hogy „A gondolt szám  $i$ ?”  $i = 1, 2, \dots, 10$ , illetve
  - ha kérdéseinkkel mindig megpróbáljuk megfelelni a fennmaradó lehetséges számok körét.
- 3.21 **(Szentpétervári paradoxon)** Egy érmevel addig dobunk, míg a fej oldalára nem esik. Ha az  $n$ -edik feldobás eredménye fej, akkor a játékos  $2^n$  forintot nyer. Mutassuk meg, hogy a nyeremény várható értéke végtelen!
- Megéri-e egy játékért 1 millió forintot fizetni?
  - Megéri-e játékonként 1 millió forintot fizetni, ha annyiszor játszunk, ahányszor csak akarunk, és csak az összes játék befejezése után van elszámolás?
- 3.22 •• Egy embernek  $n$  kulcsa van, amelyek közül egyetlen egy nyit egy bizonyos ajtót. Emberünk véletlenszerűen próbálkozik a kulcsokkal mindaddig, amíg rá nem talál a megfelelő kulcsra. Határozzuk meg a próbálkozások számának várható értékét, ha
- a sikertelen kulcsokat nem zárja ki a további próbálkozások során (visszatevéses húzások),
  - a sikertelen kulcsokat kizárja a további próbálkozások során (visszatevés nélküli húzások).

#### 4. HF:

- 4.1 •• 4 buszon összesen 148 tanuló utazik. Az egyes buszok rendre 40, 33, 25 és 50 tanulót szállítanak. Válasszunk ki véletlenszerűen egy tanulót; ekkor jelölje  $X$  azt, hogy hány tanuló utazik azon a buszon, amelyik a kiválasztott tanulót szállítja. Válasszunk véletlenszerűen egy sofőrt.  $Y$  jelölje azt, hogy a sofőr buszán hány tanuló utazik.
- Mit gondolunk,  $X$  vagy  $Y$  várható értéke nagyobb? Miért?
  - Számoljuk ki  $E(X)$ -et és  $E(Y)$ -t!
  - Számoljuk ki  $D^2(X)$ -et és  $D^2(Y)$ -t is!
- 4.2  $A$  és  $B$  a következő játékot játssza:  $A$  gondol 1-re vagy 2-re, ezt leírja, majd  $B$ -nek ki kell találnia, melyik számra gondolt  $A$ . Ha az  $A$  által leírt szám  $i$  és  $B$  jól tippelt, akkor  $B$   $i$  egységet kap  $A$ -tól. Ha  $B$  melléfog, akkor ő fizet  $A$ -nak  $\frac{3}{4}$ -t. Ha  $B$  randomizálja tippjét, azaz  $p$  valószínűséggel tippel 1-re és  $1-p$  valószínűséggel 2-re, határozzuk meg nyereménye várható értékét, amennyiben

- az  $A$  által leírt szám az 1,
- az  $A$  által leírt szám a 2.

Milyen  $p$  érték maximalizálja  $B$  minimális várható nyereményét, és mi ez a maximin érték? (Figyeljük meg, hogy  $B$  várható nyereménye nem csak  $p$ -től függ, hanem attól is, hogy mit csinál  $A$ .)

Tekintsük most az  $A$  játékost. Tegyük fel, hogy ő is randomizálja a döntését, és  $q$  valószínűséggel gondol 1-re. Mennyi  $A$  várható vesztesége,

- ha  $B$  1-re tippel, ill.
- ha  $B$  2-re tippel?

Mely  $q$  értékkel tudja  $A$  minimalizálni a maximális várható veszteségét? Mutassuk meg, hogy  $A$  maximális várható veszteségének minimuma egyenlő  $B$  minimális várható nyerésének maximumával! Ezt az eredményt hívják minimax tételnek, ami a játékelmélet egyik alapvető eredménye, és általánosan először Neumann János fogalmazta meg. A közös értéket a játék értékének hívják ( $B$  számára).

- 4.3 Minden este több különböző meteorológus jósolja meg, mekkora valószínűséggel fog holnap esni az eső. Hogy megítéljük, mennyire jók a meteorológusok, a következőképpen pontozzuk őket: ha egy meteorológus  $p$  valószínűséggel jósolt esőt, akkor

$$\frac{1 - (1 - p)^2}{1 - p^2} \quad \begin{array}{l} \text{pontot kap, ha valóban esik másnap,} \\ \text{pontot kap, ha nem esik.} \end{array}$$

Ezek után egy rögzített időszakban mérjük az egyes meteorológusok átlagpontszámát, és a legjobb előrejelző a legmagasabb pontszámot kapott meteorológus lesz. Tegyük fel, hogy az egyik meteorológus tudja ezt, és maximalizálni szeretné átlagát. Ha azt gondolja, hogy  $p^*$  valószínűséggel fog esni holnap, mekkora  $p$  értéket érdemes jelentenie?

- 4.4 Egymás után tízszer dobunk egy szabályos érmével. Legyen  $X$  az egymás utáni egyforma kimenetelekből álló sorozatok száma, vagyis pl. csupa fej esetén  $X = 1$ , a  $FFIIIFIFF$  sorozatnál pedig  $X = 5$ . Határozzuk meg  $X$  eloszlását.
- 4.5 Egy csütörtöki buliba az  $n$  meghívott mindegyike a többiekétől függetlenül  $1/2$  valószínűséggel jön el. Mennyi a valószínűsége, hogy a meghívottak legalább fele eljön? És, ha a hónap négy csütörtökjén szervezek bulit, mennyi annak a valószínűsége, hogy lesz legalább kettő, amin elegenden leszünk (azaz a meghívottak legalább fele eljön)?
- 4.6 Két kockával (egyik piros, másik zöld) dobva, mennyi a dobott számok maximumának ill. minimumának várható értéke? Dobtam a két kockával, háromszor: az egyik kockát, a pirosat mindig meglestem, hihetetlen, de mindháromszor 3-as szerepelt rajta. Mi a valószínűsége, hogy legalább egyszer nagyobb volt, mint a zöldön lévő, éppen akkor dobott szám?

Bónusz:  $n$  darab  $k$ -lapú „kockával” dobva mennyi a dobott számok maximumának ill. minimumának várható értéke?

- 4.7 a) Kétszer dobunk egy hamis érmével, amin a fej valószínűsége  $5/9$ . Jelölje  $X$  a fej dobások számát. Számoljuk ki  $X$  várható értékét és szórását!
- b) Háromszor dobunk egy hamis érmével, amin a fej valószínűsége  $2/3$ . Jelölje  $U$  azt a számot, ahányszor sikerül az előző dobást megismételni. (Így  $U$  értéke 0, 1 vagy 2 lehet.) Számoljuk ki  $U$  várható értékét és szórását!
- 4.8 Legyen  $\mathbf{E}(X) = 1$  és  $\mathbf{D}^2(X) = 5$ , számoljuk ki
- a)  $\mathbf{E}(2 + X)^2$ -t és
- b)  $\mathbf{D}^2(4 + 3X)$ -t.

- 4.9  $N$  egy nemnegatív egész értékű valószínűségi változó. Mutassuk meg, hogy

$$\mathbf{E}(N) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{P}(N \geq i).$$

(Tipp:  $\sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{P}(N \geq i) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=i}^{\infty} \mathbf{P}(N = k)$ . És most szummacsere!)

- 4.10 ••  $N$  egy nemnegatív egész értékű valószínűségi változó. Mutassuk meg, hogy

$$\sum_{i=1}^{\infty} i \mathbf{P}(N > i) = \frac{1}{2} (\mathbf{E}(N^2) - \mathbf{E}(N)).$$

- 4.11 Egy  $m$  családból álló közösségben  $n_i$  családban van  $i$  gyerek ( $\sum_{i=1}^r n_i = m$ ). Legyen  $X$  egy véletlenszerűen választott családban a gyerekek száma. Válasszunk ki véletlenszerűen a  $\sum_{i=1}^r i n_i$  gyerek közül egyet; jelölje  $Y$  azt, hogy a kiválasztott gyerek családjában hány gyerek van. Mutassuk meg, hogy  $\mathbf{E}(Y) \geq \mathbf{E}(X)$ .

- 4.12 •• 6-szor feldobunk egy hamis pénzérmét, ami 70% valószínűséggel ad fejet. Ha tudjuk, hogy összesen 3-szor lett fej az eredmény, mi a valószínűsége, hogy
- a) az első dobás fej;
- b) az első 3 eredmény rendre  $F, I, I$  (azaz az első fej, a második és a harmadik írás);
- c) az első 3 eredmény rendre  $I, F, I$ ;
- d) az első 3 eredmény rendre  $I, I, I$  volt?

- 4.13 Egy bulvárlapban oldalanként várhatóan 0.2 nyomtatási hiba van. Mi a valószínűsége annak, hogy a következő oldalon

- a) 0,
- b) 2 vagy több hiba van?

Indokoljuk a választ!

- 4.14 •• Egy államban az öngyilkossági ráta 1 öngyilkosság per 100 000 lakos per hónap. Vizsgáljuk meg az állam egy 300 000 lakosú városát!

- a) Mi a valószínűsége annak, hogy egy adott hónapban legalább 7 ember lesz öngyilkos?
- b) Mi a valószínűsége annak, hogy egy adott évben legalább 2 hónapban lesz legalább 7 öngyilkosság?
- c) Legyen a mostani hónap az  $i$ .-edik, mi a valószínűsége annak, hogy először az  $i$ . hónapban lesz legalább 7 öngyilkosság? ( $i \geq 1$ )

Milyen feltevésekkel éltünk?

- 4.15 Átlagosan hány mazsolának kell egy sütiben lennie, ha azt kívánjuk elérni, hogy egy véletlenszerűen választott sütiben legalább 0.99 valószínűséggel legyen (legalább egy szem) mazsola?
- 4.16 •• Lovas gátversenyen a lovasok körpályán versenyeznek, és a ló a pályán elhelyezett sok akadály mindegyikét egymástól függetlenül azonos valószínűséggel veri le. Ha 5% annak valószínűsége, hogy a lovas hibátlanul teljesít egy kört, mennyi az esélye, hogy egy körben legfeljebb három akadályt ver le?
- 4.17 London központi kerületében bekövetkező autóbalesetek száma száraz napos időben  $\lambda = 10$  paraméterű Poisson-eloszlású, míg nedves esős időben  $\mu = 20$  paraméterű Poisson-eloszlású. Kora novemberben Londonban  $p = 0.6$  valószínűséggel van ronda esős idő (egész nap),  $q = 0.4$  a valószínűsége annak, hogy verőfényes napsütés van (szintén egész nap). Azt olvastam a *Times*-ban, hogy múlt csütörtökön 17 autóbaleset történt London központjában. Mennyi a valószínűsége annak, hogy esett az eső?
- 4.18 Egy nagy virágágyásba sok virágmagot szórunk egyenletesen. Később a virágágyást sok kis egyenlő méretű darabra osztjuk. Azt tapasztaljuk, hogy a kis darabok 10%-ába nem került egyetlen mag sem.
- a) Hány magot szórtunk ki földdarabonként átlagosan?
  - b) A földdarabok hány százalékában lesz egynél több mag?
- 4.19 A "Kocogj velünk!" mozgalom keretében tavaly futóversenyt rendeztek a Duna-kanyarban. A pályát sajnos kullancsokkal fertőzött területen át vezették. Kiderült, hogy a versenyzők közül 300-an találtak magukban egy, 75-en pedig két kullancsot. Ennek alapján becsüljük meg, hogy körülbelül hányan indultak a versenyen!
- 4.20 Kétten céllövésben versenyeznek, a két versenyző  $p_1$ , illetve  $p_2$  valószínűséggel ér el találatot ( $p_1 < p_2$ ). Az ügyetlenebb kezd, majd felváltva lőnek. Aki először talál, az nyer.
- a) Mennyi a valószínűsége annak, hogy az ügyesebb nyer?
  - b) Mennyi a játék várható időtartama, ha percenként egy lövést végeznek?
  - c) A várható időtartam azonnal adódik, ha  $p_1 = p_2$  (miért?). Ellenőrizzük le, hogy az előző kérdésre adott válaszuk ebben az esetben az, ami azonnal adódik.

Bónusz: Az árokugró versenyfutás szabályai a következők: A futópálya egyenes, és van rajta végtelen sok egyforma árok. Két egyforma képességű versenyző méri össze az erejét árokfutásból, akik fej fej mellett futnak. Egy versenyző egymás után át próbálja ugrani az árkokat, végül egyszer túl kicsit ugrik és beleesik valamelyikbe. Tegyük fel, hogy egy versenyző sohasem fárad el, és az árkokat egymástól függetlenül, egyenként  $2^{-L}$  valószínűséggel tudja átugorni, ahol  $L$  az árok hossza. Ha az egyikük beleesett egy árokba, akkor véget ért a verseny.

- a) Mutassuk meg, hogy a döntetlen valószínűsége pontosan akkor kisebb  $\varepsilon$ -nál, ha

$$L < \log_2 \left( \frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} \right)$$

teljesül.

- b) Ha döntetlen, akkor visszaküldjük őket a startvonalhoz és újra kezdődik a verseny. Ezt ismételjük egészen addig, amíg győztest nem hirdethetünk. Mekkora legyen  $L$ , ha a versenyzők ugrásainak számának várható értékét akarjuk minimalizálni?

## 5. HF:

- 5.1 Tegyük fel, hogy repülés közben egy repülőgép motorjai egymástól (teljesen) függetlenül  $1 - p$  valószínűséggel hibásodnak meg. Ha egy repülőgép a repüléshez a motorjainak legalább felére van szüksége, milyen  $p$  értékekre biztonságosabb egy ötmotoros repülőgép, mint egy hárommotoros?
- 5.2 Legyen  $X$  Binom( $n, p$ ) eloszlású valószínűségi változó. Milyen  $p$  értékre lesz maximális  $\mathbf{P}\{X = k\}$ ,  $k = 0, 1, \dots, n$ ? Ez arra példa, hogy a statisztikában hogyan becsülik meg  $p$  értékét, ha egy Binom( $n, p$ ) eloszlású valószínűségi változó megfigyelt értéke  $k$ . Ha feltesszük, hogy  $n$  ismert, akkor  $p$ -t azzal a  $\hat{p}$  értékkel becsüljük, amire  $\mathbf{P}\{X = k\}$  maximális. Ezt a módszert hívják **maximum likelihood** becslésnek.

- 5.3 •• András és Béla a következő játékot játsszák: feldobnak két szabályos dobókockát; András annyi forintot fizet Bélanak, mint a két dobókockán levő számok különbségének négyzete, Béla pedig annyit, amennyi a két kockán levő számok összege. Melyiküknek kedvez a játék?
- 5.4 Legyen  $X$   $\lambda$  paraméterű Poisson eloszlású valószínűségi változó. Mutassuk meg, hogy  $\mathbf{P}\{X = i\}$   $i$  növekedésével először nő, majd monoton csökken, a maximumát a  $i = \lfloor \lambda \rfloor$ -nél veszi fel. (Tipp: tekintsük  $\mathbf{P}\{X = i\}/\mathbf{P}\{X = i - 1\}$ -et.)
- 5.5 Móricka, ha túrázni megy, minden lépésnél – az előzményektől függetlenül – valamekkora (kicsi) valószínűséggel hasraesik és megüti a térdét, illetve valamekkora (kicsi) valószínűséggel hanyatt esik és megüti a könyökét. Egy 10 kilométeres túrán átlagosan 3-szor szokta megütni a térdét és 2-szer a könyökét. Legfeljebb milyen hosszú túrára engedheti el az anyukája, ha azt akarja, hogy  $\frac{2}{3}$  valószínűséggel térd- és könyöksérülés nélkül járja meg?
- 5.6 •• Egy forgalmas országútszakaszon gyakran szoktak radarozni. Tapasztalatok szerint annak valószínűsége, hogy 5 percen belül lesz olyan autó, amelyik átlépi a sebességhatárt, épp ugyanannyi, mint annak, hogy nem lesz ilyen autó.
- a) Mi a valószínűsége, hogy 15 perc radarozás során (i) pontosan három; (ii) legalább három gyorsajtót mérnek?
- b) Milyen hosszú időre tervezzék a rendőrök a radarozást ahhoz, hogy 95% valószínűséggel fogjanak legalább egy gyorsajtót?
- 5.7 Tegyük fel, hogy egy adott időben történt események száma  $\lambda$  paraméterű Poisson valószínűségi változó. Mutassuk meg, hogy ha minden eseményt  $p$  valószínűséggel számolunk, függetlenül a többi eseménytől, akkor a megszámlált események száma  $\lambda p$  paraméterű Poisson valószínűségi változó! Emellett adjunk intuitív érvelést arra, hogy miért kell ennek így lennie.  
Az előzőek alkalmazására példa: Tegyük fel, hogy egy adott terület uránlelőhelyeinek száma  $\text{Poi}(10)$  eloszlású véletlen változó. Minden lelőhelyet a többtől függetlenül  $\frac{1}{50}$  valószínűséggel fedeznek fel. Számoljuk ki annak a valószínűségét, hogy (a) pontosan 1, (b) legalább 1 és (c) legfeljebb 1 lelőhelyet fedeznek fel az adott idő alatt.

Bónusz a) Legyen  $X$   $\lambda$  paraméterű Poisson eloszlású valószínűségi változó. Mutassuk meg, hogy

$$\mathbf{P}\{X \text{ páros}\} = \frac{1}{2}(1 + e^{-2\lambda}).$$

- b) Adott egy hamis érménk, mely  $p$  valószínűséggel mutat fejet. Ezt az érmét 0 időpontban feldobjuk, és azt látjuk, hogy fejre esik. Egy  $\lambda$  paraméterű Poisson folyamat által megadott időpillanatokban az érmét újra és újra feldobjuk, míg egyéb időpontokban nem nyúlunk az érméhez. Mi a valószínűsége, hogy  $t$ -kor az érme fejet mutat?
- c) Tegyük fel ismét, hogy az érme 0 időpontban fej-et mutat. A Poisson folyamat időpillanataiban ezúttal determinisztikus módon átforgatjuk (ha a fej oldalon áll, akkor az írás oldalra, ha az írás oldalon, a fej oldalra). Mi a valószínűsége, hogy  $t$ -kor az érme fejet mutat?
- 5.8 •• Egy erdő átlagos sűrűsége: 16 fa 100 m<sup>2</sup>-enként. A fák törzse teljesen szabályos, 20 cm átmérőjű kör alapú henger. Egy puskagolyót lövünk ki célzás nélkül, az erdő szélétől 120 m-re, kifelé az erdőből. Mennyi annak a valószínűsége, hogy eltalálunk egy fatörzset?  
(Tekintsünk el attól az apró zavaró tényezőtől, hogy a fák alapkörének középpontjai min. 20 cm távolságban vannak.)
- 5.9 •• Bulgáriában történt, hogy egymás utáni két héten kihúzták pontosan ugyanazokat a nyerőszámokat a lottón. Maradjunk hazai vizeken: a hazai, 90-ből 5-öt húzós lottón
- a) mi annak a valószínűsége, hogy jövő héten ugyanazokat a számokat húzzák, mint ezen a héten?
- b) kicsit enyhítsük a kérdést: mi annak a valószínűsége, hogy a lottó 50 éves történetében (minden héten egy húzást feltételezve, szünet nélkül, évi 52 héttel számolva) valaha előfordul az, hogy két egymás utáni héten ugyanazt az öt számot húzzák?
- c) még egy kicsit enyhítsük a kérdést: mi annak a valószínűsége, hogy a lottó 50 éves történetében (minden héten egy húzást feltételezve, szünet nélkül, évi 52 héttel számolva) valaha előfordul az, hogy olyan 5-öt húznak ki, ami már egyszer volt?

Adjunk numerikus értéket is.

- 5.10 •• Egy urnában 4 piros és 4 kék golyó van. Véletlenszerűen kiválasztunk 4 golyót. Ha 2 közülük piros és 2 kék, akkor megállunk. Különben visszarakjuk a golyókat az urnába és újra választunk 4 golyót. Az egészet mindaddig folytatjuk, amíg 4 húzott golyóból pontosan 2 piros lesz. Mi a valószínűsége, hogy pontosan  $n$ -szer húzunk?
- 5.11 Számítsuk ki az  $(1 + X)^{-1}$  valószínűségi változó várható értékét a következő esetekben:
- ha  $X$  Binom( $n, p$ ) eloszlású;
  - ha  $X$  Poi( $\lambda$ ) eloszlású.
- (Tipp: integráljunk valami szépet.)
- 5.12 Legyenek  $p \in (0, 1)$ ,  $n \in \mathbb{N}$  és  $\lambda = pn \in (0, \infty)$  rögzítve. Továbbá:  $a_k := p_{\text{Binom}(n, p)}(k) / p_{\text{Poi}(\lambda)}(k)$ . Bizonyítsuk be, hogy amint  $k = 0, 1, 2, \dots$  növekszik
- $a_k$  először növekszik, majd csökken, és a maximális értékét  $\lfloor \lambda + 1 \rfloor$ -nál éri el.
  - $a_k$  először kisebb, mint 1, majd 1 fölé nő, majd újból 1 alá csökken.
- 5.13 Egy újságkihordó 100 forintért veszi és 150 forintért adja el az újságokat. Az el nem adott lapokat nem vásárolják tőle vissza. Ha az újságokra a napi igény binomiális eloszlású véletlen változó,  $n = 10$   $p = \frac{1}{3}$  értékekkel, körülbelül hány lapot vegyen, ha várható profitját szeretné maximalizálni?
- 5.14 Egy országban a házaspárok az első fiúig vállalnak gyereket. Mi a nemek aránya ebben az országban? Igaz-e, hogy az egy családban született gyerekek neme független egymástól?
- 5.15 *Hipergeometriai eloszlás tart a Binomiálishoz*  
Madarat gyűrűzünk:  $N$  madárból  $m$  gyűrűzött van. Képzeljük el, hogy a madárgyűrűzést évek óta csináljuk, a madárpopuláció is nő, és átlagosan a madarak egy bizonyos hányadát vagyunk képesek befogni. Pontosabban, legyen most  $N \rightarrow \infty$ ,  $\frac{m}{N} \rightarrow p$ ! Bizonyítsuk be, hogy ekkor, ha (fix)  $n$  elemű mintát veszünk a populációból, és  $X$  jelöli a gyűrűzött madarak számát az  $n$  elemű mintában, akkor  $X$  eloszlása binomiálishoz tart, azaz

$$\lim_{N \rightarrow \infty, m/N \rightarrow p} \mathbf{P}(X = i) \rightarrow \mathbf{P}(\text{Bin}(n, p) = i)!$$

## 6. HF:

- 6.1 Tegyük fel, hogy  $X$  eloszlásfüggvénye,  $F$  a következőképpen adott:

$$F(b) = \begin{cases} 0 & \text{ha } b < 0 \\ \frac{b}{4} & \text{ha } 0 \leq b \leq 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{b-1}{4} & \text{ha } 1 < b \leq 2 \\ \frac{11}{12} & \text{ha } 2 < b \leq 3 \\ 1 & \text{ha } 3 < b \end{cases}$$

- Számoljuk ki  $\mathbf{P}\{X = i\}$ -t,  $i = 1, 2, 3$ .
  - Mennyi  $\mathbf{P}\{\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\}$ ?
- 6.2 Egy rendszer a bekapcsolástól számítva  $X$  hónapig működik. Határozzuk meg  $X$  várható értékét, és annak valószínűségét, hogy a rendszer legalább 5 hónapig működik, ha  $X$  sűrűségfüggvénye:

$$f(x) = \begin{cases} Cxe^{-x/2} & \text{ha } x > 0, \\ 0 & \text{ha } x \leq 0. \end{cases}$$

- 6.3 Legyen

$$f(x) = \begin{cases} C(3x - x^3) & \text{ha } 0 < x < \frac{5}{2}, \\ 0 & \text{különben,} \end{cases}$$

és

$$g(x) = \begin{cases} C(3x - x^2) & \text{ha } 0 < x < \frac{5}{2}, \\ 0 & \text{különben.} \end{cases}$$

Lehet-e  $f$  ill.  $g$  sűrűségfüggvény? Ha igen, határozzuk meg  $C$ -t és az  $f$  ill.  $g$  által meghatározott eloszlások várható értékét!

6.4 Az  $A$  és  $B$  konstansok milyen értéke mellett lehetnek eloszlásfüggvények a következő függvények?

a) •

$$F(x) = \exp(-Ae^{-Bx});$$

b) •

$$F(x) = A + B \arctg x;$$

c)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } -\infty < x \leq 0, \\ \frac{A+x}{1+Bx} & \text{ha } 0 < x < +\infty. \end{cases}$$

6.5 A  $C$  konstans milyen értéke mellett lehetnek sűrűségfüggvények a következő függvények? Ezekben az esetekben állapítsuk meg a várható értéket, valamint annak valószínűségét, hogy a megfelelő val. változó értéke nagyobb, mint 2.

a) •

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot \sin(2\pi x) & \text{ha } 0 \leq x \leq \frac{3}{2}, \\ 0 & \text{különben;} \end{cases}$$

b) •

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot (-\ln(x/10)) & \text{ha } 0 < x \leq 10, \\ 0 & \text{különben;} \end{cases}$$

c)

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot x^{-5} & \text{ha } 1 \leq x, \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$$

6.6 Egy benzinkút hetente egyszer kap benzint. Hogyha a heti eladás (ezer literben mérve) egy valószínűségi változó

$$f(x) = \begin{cases} 5(1-x)^4, & \text{ha } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$$

sűrűségfüggvénnyel, akkor mekkora méretű tartály szükséges ahhoz, hogy egy adott héten a benzinkút 0.01-nél kisebb valószínűséggel fogyjon ki a benzintől?

6.7 Tudjuk, hogy minden  $Y$  nemnegatív valószínűségi változóra

$$\mathbf{E}(Y) = \int_0^{\infty} \mathbf{P}\{Y > t\} dt.$$

Mutassuk meg, hogy egy  $X$  nemnegatív valószínűségi változóra

$$\mathbf{E}(X^n) = \int_0^{\infty} nx^{n-1} \mathbf{P}\{X > x\} dx$$

teljesül. (Tipp: kezdjük azzal, hogy

$$\mathbf{E}(X^n) = \int_0^{\infty} \mathbf{P}\{X^n > t\} dt,$$

majd cseréljük változót ( $t := x^n$ .)

- 6.8 a) Legyen  $X$  valószínűségi változó várható értéke  $\mu$ , szórásnégyzete  $\sigma^2$ , és a harmadik momentuma is véges. Továbbá legyen  $g$  egy háromszor differenciálható függvény. Ha tudjuk, hogy  $X$  centrált harmadik momentuma elhanyagolható, akkor mutassuk meg, hogy

$$\mathbf{E}(g(X)) \approx g(\mu) + \frac{g''(\mu)}{2}\sigma^2.$$

(Tipp: fejtsük  $g$ -t  $\mu$  körül 3 tagig Taylor sorba, és hanyagoljuk el a megmaradó részt!)

- b) Legyen  $X$  egy  $\lambda$  várható értékű Poisson eloszlású valószínűségi változó. Mutassuk meg, hogy ha  $\lambda$  tart végtelenhez, akkor

$$\mathbf{D}^2(\sqrt{X}) \approx 0.25.$$

Lepődjünk meg. (Tipp: használjuk fel az előző feladatot  $\mathbf{E}(\sqrt{X})$  közelítésére!)

- 6.9 Legyen  $F(x)$  folytonos eloszlásfüggvény, és  $F(0) = 0$ . Mutassuk meg, hogy

$$G(x) := \begin{cases} 0, & \text{ha } -\infty < x \leq 1, \\ F(x) - F(x^{-1}), & \text{ha } 1 < x < \infty \end{cases}$$

is eloszlásfüggvény. Adjunk valószínűség számítási értelmet a fenti formulának.

- 6.10 •• Egyenletesen választunk egy pontot a  $(0, 1)$  intervallumból, jelölje ezt  $X$ . Mi annak a valószínűsége, hogy  $X$ ,  $1 - X$  és  $1/2$  háromszöget alkot?

- 6.11 Konstruálható-e olyan folytonos  $g : [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$  függvény, amelyre  $\int_0^1 g(x) dx = 1$ ,  $\int_0^1 x \cdot g(x) dx = a$ ,  
 $\int_0^1 x^2 \cdot g(x) dx = a^2$ ?

Bónusz Ha egy találkozóra  $s \in \mathbb{R}$  perccel korábban érkezem a megbeszéltnél,  $a \cdot s$  petátot fizetek, ha  $s$  percet kések,  $b \cdot s$ -t fizetek. Az utazás a mai kaotikus közlekedési feltételek miatt meglehetősen véletlen ideig tart, melynek sűrűségfüggvénye  $f(x)$ . Mikor induljak, ha a várható költséget szeretném minimalizálni? (Tipp: Írjuk fel a várható költséget integrálalakban és deriváljuk.)

- 6.12 A buszok rendre minden óra egészkor, 15-kor, 30-kor és 45-kor indulnak a megállóból. Ha véletlenszerűen érkezem 7:00 és 7:30 közt, mi annak a valószínűsége, hogy

- 5 percnél kevesebbet várok?
- 8 percnél többet várok?
- Ugyanez a két kérdés, ha 7:08 és 7:38 közt érkezem egyenletesen.
- És ha 7:00 és 7:25 közt érkezem egyenletesen?

- 6.13 A felé a vonatok 15 percnként indulnak 7:00-tól kezdve, míg B felé 15 percnként indulnak 7:05-től kezdve.

- Ha egy utas 7:00 és 8:00 közötti egyenletes eloszlású időben érkezik az állomásra, majd felszáll arra a vonatra amelyik hamarabb indul, az esetek hányadrészeben megy A felé, és hányadrészeben B felé?
- És ha az utas 7:10 és 8:10 közötti egyenletes eloszlású időben érkezik az állomásra?
- Mi a helyzet akkor, ha B felé gyakrabban, vagyis 7:05-től kezdve 10 percnként indulnak a buszok? Számoljuk ki az előző két kérdés valószínűségét erre az esetre is!

- 6.14 •• Egy busz A és B városok között jár, mely városok 100 kilométerre vannak egymástól. Ha a busz lerobban, akkor azt egyenletes eloszlású helyen teszi a két város közötti úton; ilyenkor a legközelebbi szervízből kijönnek a szerelők és megjavítják a buszt a helyszínen. Pillanatnyilag egy buszszerviz található az A városban, egy a B városban, és egy a két város között félúton. Egy javaslat szerint ehelyett gazdaságosabb lenne a három szervizt az A várostól 25, 50, és 75 kilométerre elhelyezni. Egyetértünk-e a javaslattal? Miért? Mi lenne a szervizek legjobb elhelyezése? Milyen értelemben?

- 6.15 Egy egység hosszú ropin van egy sódarab az  $s$  helyen. Mire hazaérünk a boltból, a táskánkban véletlenszerűen (egyenletes eloszlással) kettétörük a ropi a csomagban. Mi a sódarabot tartalmazó ropidarab hosszának várható értéke?

- 6.16 Válasszunk egy pontot egyenletes eloszlással egy egyenlő oldalú háromszög belsejében, mely háromszögnek minden oldala 1 hosszúságú. Jelölje  $\xi$  e pontnak a távolságát a háromszög legközelebbi oldalától. Határozzuk meg a  $\xi$  valószínűségi változó eloszlás- és sűrűségfüggvényét.



6.17 Pistike randevút beszélt meg Juliskával este 6-ra. Pistike két úton is eljuthat a megbeszélt randevú helyszínére, a két út között éremdobással dönt. Az utakon való végigjutás ideje két valószínűségi változót határoz meg:  $A$ -t és  $B$ -t.

– Az  $A$  sűrűségfüggvénye (percekben számolva):

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } x < 5 \text{ vagy } x > 20, \\ \frac{2}{75}(x-5) & \text{ha } 5 \leq x < 10, \\ \frac{1}{75}(20-x) & \text{ha } 10 \leq x \leq 20. \end{cases}$$

– A  $B$  sűrűségfüggvénye pedig:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } x \leq 5, \\ \frac{1}{10} \exp\left(-\frac{x-5}{10}\right) & \text{ha } x > 5. \end{cases}$$

Pistike 6-kor indul útnak, mert elfelejtette nézni az órát. Mi a valószínűsége, hogy találkoznak, ha Juliska nem egy türelmes természet, és maximum tíz percet hajlandó várni?

6.18 Egy  $l$  hosszúságú ropit taláalomra választott pontban kettétörünk. Mi az így keletkezett darabok közül a rövidebb eloszlásfüggvénye?

6.19 •• Válasszunk két pontot függetlenül és egyenletesen az egységkör kerületén. Határozzuk meg a távolságuk eloszlásfüggvényét.

Bónusz Válasszunk az egységnégyzetben véletlenszerűen (egyenletes eloszlással) egy pontot. Jelölje  $\xi$  e pontnak a négyzet legközelebbi csúcsától való távolságát. Határozzuk meg a  $\xi$  valószínűségi változó eloszlásának sűrűségfüggvényét.

## 7. HF:

7.1 Sok intelligencia teszt normális eloszlást követ, 100 pont várható értékkel és 15 pont szórással. Ha ezeknek a teszteknek és értékelésüknek hihetünk, akkor az emberiség hány százalékának van 95 és 110 pont között az IQ-ja? A 100 pont körüli mekkora intervallumban van az emberiség 50%-ának az IQ-ja? Egy 2500 fős településen várhatóan hány embernek lesz 125 pont fölött az IQ-ja?

7.2 Az IQ teszteknek még mindig hiszünk és tegyük fel, hogy az eredmény 100 pont várható értékű és 15 szórással normális eloszlást követ. A teszteket megírt és kiértékelt alanyokat általában 3 csoportba szokták sorolni: alacsony-, átlagos-, illetve magas intelligenciahányadosúak. A résztvevőknek rendre 20, 65 illetve 15%-a került a megfelelő csoportokba. Hol húzták meg a határokat, azaz melyek azok a pontszámok melyek megkülönböztetik az egyes csoportokat?

7.3 Tegyük fel, hogy  $X$  normális eloszlású 5 várható értékkel. Ha  $\mathbf{P}\{X > 9\} = 0.2$ , közelítőleg mennyi  $X$  szórásnégyzete?

7.4 •• Tegyük fel, hogy a 25 éves fiatal emberek magassága centiméterben mérve normális eloszlású,  $\mu = 180$  és  $\sigma^2 = 169$  paraméterekkel. A 25 éves fiatal emberek hány százaléka magasabb 2 méternél? A két méteres klub tagjainak hány százaléka magasabb 2 méter 10 cm-nél?

7.5 Mutassuk meg, hogy  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ . (Tipp:  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^\infty e^{-x} x^{-\frac{1}{2}} dx$ . Helyettesítsünk  $y = \sqrt{2x}$ -et és hasonlítsuk össze az így kapott kifejezést a normális eloszlással!)

7.6 •• Számoljuk ki a normális eloszlás alább definiált „abszolút momentumait” ( $\varphi$  a standard normális sűrűség):

$$A_k := \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y) |y|^k dy, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

(Tipp: páros  $k = 2\ell$ -re számoljuk ki és használjuk a következő kifejezést:

$$\frac{d^\ell}{d\lambda^\ell} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda y^2/2} dy \Big|_{\lambda=1}.$$

Páratlan  $k = 2\ell + 1$ -re hajtsuk végre a  $z = y^2$  változócsere az  $A_k$ -t definiáló integrálban.)

- 7.7 Legyen az  $X$  valószínűségi változó normális eloszlású  $\mu$  várható értékkel és  $\sigma$  szórással. Számoljuk ki  $t \in \mathbb{R}$ -re az  $\mathbf{E}(e^{tX})$  várható értéket! (Tipp: ez egy egyszerű integrálhelyettesítéssel visszavezethető a normális sűrűségfüggvény integráljára.)
- 7.8 Bizonyítsuk be, hogy az előző feladatban kapott képlet akkor is érvényes marad, ha  $t$  tetszőleges komplex szám! (Vigyázat: a normális sűrűségfüggvény integrálját csak a *valós* számegyenesen tanultuk, hogy mennyi. A bizonyításhoz kell valami komoly az analízisből.)
- 7.9 Legyen  $X$  nulla várható értékű és  $\sigma$  szórással, normális eloszlású valószínűségi változó. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges  $x > 0$  esetén fennállnak a következő egyenlőtlenségek:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x^2/2\sigma^2)} \left( \frac{\sigma}{x} - \frac{\sigma^3}{x^3} \right) < \mathbf{P}\{X > x\} < \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x^2/2\sigma^2)} \frac{\sigma}{x}.$$

(Tipp: differenciáljuk az egyenlőtlenség lánc mindhárom tagját, és hasonlítsuk össze a deriváltakat.)

- 7.10 Becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 100.000 pókerleosztás során a fullok száma 128 és 158 közé essen.
- 7.11 Egy gyár kétfajta érmét gyárt: egy igazságosat és egy hamisat, ami 55% eséllyel mutat fejet. Van egy ilyen érménk, de nem tudjuk, igazságos-e vagy pedig hamis. Ennek eldöntésére a következő statisztikai tesztet hajtjuk végre: feldobjuk az érmét 1000-szer, ha legalább 525-ször fejet mutat, akkor hamisnak nyilvánítjuk, ha 525-nél kevesebb fej lesz a dobások között, akkor az érmét igazságosnak tekintjük. Mi a valószínűsége, hogy a tesztünk téved abban az esetben, ha az érme igazságos volt? És ha hamis volt?
- 7.12 •• Egy nagyváros lakosságának *általunk ismeretlen*  $p$  hányada dohányzik. Ezt a  $p$  hányadot akarjuk közelítőleg meghatározni egy mintában megfigyelt relatív gyakorisággal a következő módon: megkérdezzük  $n$  véletlenszerűen kiválasztott lakost, és megállapítjuk, hogy ezek között  $k$  állítja, hogy dohányzik. A NSZT-ből tudjuk, hogy ha  $n$  elég nagy, akkor az empirikusan megfigyelt  $p' := k/n$  relatív gyakoriság igen nagy valószínűséggel jól közelíti az igazi  $p$  hányadot. Milyen nagynak kell  $n$ -et választanunk, ha azt akarjuk elérni, hogy az empirikusan megfigyelt  $p'$  relatív gyakoriság legalább 0.93 valószínűséggel 0.02 hibahatáron belül közelítse a valódi (ismeretlen)  $p$  hányadot? Más szóval: határozzuk meg azt a legkisebb  $n_0$  természetes számot, amelyre igaz, hogy bármely  $p \in (0, 1)$ -re és  $n \geq n_0$ -ra

$$\mathbf{P}\{|p' - p| \leq 0.02\} \geq 0.93.$$

- 7.13 Az előző feladat kicsit máshogy ☺

Budapest utcáin az emberek 42%-a támogatná, hogy közterületen ne lehessen dohányozni. Közelítsük azt a valószínűséget, hogy  $n$  megkérdezett ember közül legalább 40% a betiltás mellett nyilatkozik, ha

- a)  $n = 11$ ,
- b)  $n = 101$ ,
- c)  $n = 1001$ .

d) Hány embert kellene megkérdeznünk, hogy legalább 95% eséllyel 40% felett legyenek a betiltást támogatók?

- 7.14 Az ún. Monte Carlo-integrálás lényege a következő: legyen az egyszerűség kedvéért  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  folytonos függvény, és az

$$I = \int_0^1 f(x) dx$$

integrál értékét becsüljük. Ha  $U$  és  $V$  két független  $[0, 1]$  intervallumon egyenletes eloszlású valószínűségi változó, akkor az  $(U, V)$  pár a  $[0, 1]^2$  egységnegyzet egy véletlen pontját adja. Függetlenül generálva  $n$  véletlen pontot az egységnegyzetben, jelölje  $X_n$  azon pontok számát, amelyek az  $f$  függvény grafikonja alá estek, vagyis amelyekre  $V < f(U)$ . Ekkor  $I$  becslését az  $X_n/n$  hányados adja. Mekkora legyen  $n$  értékét, ha azt szeretnénk, hogy az  $f(x) = x^2$  függvényre alkalmazva a Monte Carlo-integrálás módszerét, legfeljebb 0.02 valószínűséggel kapjunk 0.1-nél nagyobb hibát?

- 7.15 Van két egyforma biztosítótársaság egyenként tízezer ügyféllel. A 2007-es év elején minden ügyfél befizet a biztosítójának ötvenezer forintot, és az év folyamán minden ügyfél egymástól függetlenül  $\frac{1}{3}$  valószínűséggel nyújt be kárigényt, amely minden esetben 150 ezer forintos. Mindkét biztosítótársaságnak van ezen felül

5 millió forint félretett pénze az előző évről. Egy biztosítótársaság csődbe megy, ha nem tudja kifizetni a beérkező kárigényeket. Érdemes-e egyesülnie a két biztosítótársaságnak? Legyen  $p_1$  annak a valószínűsége, hogy a két biztosítótársaság közül legalább egy tönkremegy, és  $p_2$  annak a valószínűsége, hogy az egyesült biztosítótársaság tönkremegy. Határozzuk meg  $p_1$  és  $p_2$  (közelítő) értékét, és vonjuk le a következtetést!

Bónusz: (A Poisson eloszlás normális approximációja.) Bizonyítsuk be, hogy  $\lambda \rightarrow \infty$ -re

$$\sqrt{\lambda} \cdot p_{\text{Poi}(\lambda)}(\lfloor \lambda + x\sqrt{\lambda} \rfloor) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-x^2/2) + \mathcal{O}(\lambda^{-1/2}),$$

és a hibát egyenletesen kicsi, ha  $x$  egy korlátos halmazban marad. Következésképpen lássuk be, hogy

$$\sum_{\lambda + \alpha\sqrt{\lambda} < k < \lambda + \beta\sqrt{\lambda}} p_{\text{Poi}(\lambda)}(k) \rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(y) dy = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha)$$

amint  $\lambda \rightarrow \infty$ .

7.16 •• A menzai poharak kirakásuktól számított törési ideje exponenciális eloszlást követ 6 hónap várható értékkel. Számítsuk ki annak valószínűségét, hogy

- a) 5 kirakott pohárból legfeljebb 3 törik el egy éve alatt;
- b) 500 kirakott pohárból legfeljebb 300 törik el egy éve alatt! (Adjuk meg a numerikus értéket is!)

7.17 A valszámium radioaktív bomló részecske átlagos élettartama 1 év. Mennyi ennek a részecskefajtának a felezési ideje?

7.18 A „Fény az éjszakában” típusú villanykörte élettartama exponenciális eloszlású. A gyártó mérései szerint a körték 90 százaléka bírja legalább egy évig. Mennyi időre vállalhat a gyártó garanciát a körték működésére, ha azt akarja, hogy a vevőknek legfeljebb 1 százaléka reklamáljon?

7.19 Reggel a földalatti szerelvények követési ideje exponenciális eloszlású valószínűségi változó 2 perc várható értékkel. Az egyik szerelvényt pont lekéstem.

- a) Mennyi a valószínűsége, hogy legalább 5 percet várnom kell a következőre?
- b) Már 3 perce várok hiába. Mennyi a valószínűsége, hogy még további 5 percig várnom kell?

7.20 (Veszélyráta.) Egy pozitív abszolút folytonos valószínűségi változó kockázati rátafüggvényének a  $\lambda(t) = \frac{f(t)}{1-F(t)}$  függvényt nevezzük.

- a) Mi a kockázati rátafüggvény szemléletes jelentése?
- b) Lássuk be, hogy ekkor

$$F(t) = 1 - \exp \left\{ - \int_0^t \lambda(s) ds \right\}!$$

- c) Mi a  $\lambda$  paraméterű exponenciális eloszlás rátafüggvénye?
- d) És egy  $[0, a]$  intervallumon egyenletes eloszlásé?

7.21 Gyakran hallani, hogy a dohányosok halálozási rátája (azaz a kockázati rátája a halál időpontjára vonatkozólag) minden életkorban kétszerakkora, mint az azonos korú nemdohányzóké. Igaza van-e annak a nemdohányzóknak, aki erre azzal jön, hogy ő akkor kétszer akkora valószínűséggel fog még  $x$  évig élni, mint a dohányos osztálytársa? Ha nem, mi a két valószínűség viszonya? (Tipp: előző feladat.)

7.22 Egy nagyon gyors számítógépen futó program, miután elindult, minden órajel hatására (vagyis nagyon gyakran) megpróbál lefagyni – feltéve, hogy ez korábban nem sikerült neki – és valamilyen nagyon kicsi valószínűséggel le is fagy. A tapasztalat szerint ez a program az indítás után átlagosan 1 órával fagy le. Mi a lefagyásig eltelt (órában mért) idő eloszlása?

7.23 Pistike nyári estéken csillaghullást néz. Egy-egy nyári estén nagyon sok meteor éri el a Földet, ezek mind egyikének egymástól függetlenül, nagyon kis valószínűséggel sikerül Pistike szemé elé kerülni – vagyis pont akkor és ott esni le, amikor és ahol Pistike látja. Így ő fél óra alatt átlagosan hármát lát lehullani. Augusztus 19-én este 22:00-kor kezdi nézni az eget.

- a) Mi a valószínűsége, hogy 22:00 és 22:25 között egyetlen hullócsillagot sem lát?

- b) Mi a valószínűsége, hogy  $T$  perc alatt egyetlen hullócsillagot sem lát, ahol  $T \in \mathbb{R}^+$ ?
- c) Az  $X$  valószínűségi változó legyen az az idő (percben mérve), amennyit Pistikének az első hullócsillag megpillantására várnia kell. Számoljuk ki  $X$  eloszlásfüggvényét és sűrűségfüggvényét!
- d) Fogalmazzuk meg szépen a tanulságot!
- 7.24 •• A HOMÁLY cég kétféle kompakt fénycsövet forgalmaz, az A és B típusok várható élettartama rendre 4000, illetve 8000 óra, mindkét esetben exponenciális eloszlással.
- a) Egy egyetemi előadóterem két lámpájában egyszerre cserélik a fénycsöveket, tehát ha az egyik fénycső kiég, mindkettőt lecserélik. A legutóbbi csere alkalmával az egyik lámpába A, a másikba B típusú fénycső került. Mi a valószínűsége, hogy a következő cserére kevesebb, mint 4000 óra elteltével lesz szükség? És ha tudjuk, hogy a legutóbbi csere óta 2000 óra telt el, mi a valószínűsége, hogy további 4000 óráig nem lesz szükség cserére? (Az egyes fénycsövek élettartama függetlennek tekinthető.)
- b) A takarékoság jegyében a doktorandusz szobába egy olcsó boltból szerzik be a fénycsövet, ahol azokat csomagolás nélkül, a rendetlenség miatt jól összekeveredve tárolják. A kupac 10%-a "selejtes", be se kapcsol, a maradék egyenlő arányban A, illetve B típusú. Vaktában választva, mi lesz a doktorandusz szobába kerülő fénycső élettartamának eloszlásfüggvénye?
- c) Mi a valószínűsége, hogy a doktorandusz szobába kerülő fénycső több, mint 4000 óráig bírja? És ha ez a fénycső már kibírt 2000 órát, mi a valószínűsége, hogy még további 4000 óráig bírni fogja?