

Matematika 2 építésmérnököknek

5. gyakorlat (2004. 03. 31. illetve április 1.)

Többváltozós függvények I.

(gyak. vez.: Rudas Anna)

Elsőrendű parciális deriváltak:

Határozzuk meg az alábbi függvények elsőrendű parciális deriváltjait:

Tipp: nem kell mást tenni, mint hogy x szerinti deriváláskor konstansnak tekintjük y -t, és x -et tekintjük változónak, y szerinti deriváláskor pedig épp fordítva: y a változó és x a konstans.

1. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$

Megoldás: $f'_x(x, y) = 3x^2 - 3y$

$f'_y(x, y) = 3y^2 - 3x$

2. $f(x, y) = x^y$

Megoldás: $f'_x(x, y) = yx^{y-1}$

$f'_y(x, y) = x^y \ln x$

3. $f(x, y) = \arcsin \frac{y}{x}$

Megoldás: $f'_x(x, y) = \frac{-y}{x^2 \sqrt{1 - (\frac{y}{x})^2}}$

$f'_y(x, y) = \frac{1}{x \sqrt{1 - (\frac{y}{x})^2}}$

4. $f(x, y) = y^2 \ln \sqrt{xy}$

Megoldás: $f'_x(x, y) = \frac{y^3}{2xy}$

$f'_y(x, y) = 2y \ln \sqrt{xy} + \frac{xy^2}{2xy}$

5. $f(x, y) = \frac{x^3 e^y}{1 + \sin x + y^2}$

Megoldás: $f'_x(x, y) = \frac{3x^2 e^y (1 + \sin x + y^2) - x^3 e^y \cos x}{(1 + \sin x + y^2)^2}$

$f'_y(x, y) = \frac{x^3 e^y (1 + \sin x + y^2) - x^3 e^y 2y}{(1 + \sin x + y^2)^2}$

Másodrendű parciális deriváltak:

Határozzuk meg az alábbi függvények másodrendű parciális deriváltjait, ellenőrizve, hogy valóban $f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$:

Tipp: ehhez azt kell csak tudni, hogy például f''_{xy} azt jelenti, hogy a függvényt először x szerint deriváljuk, majd amit így kaptunk, azt y szerint deriváljuk. Hasonlóan f''_{xx} azt jelenti, hogy mind a kétszer x szerint deriválunk.

1. $f(x, y) = \ln(x + e^y)$

Megoldás: Ehhez kellenek az elsőrendűek előszor:

$f'_x(x, y) = \frac{1}{x + e^y}$

$f'_y(x, y) = \frac{e^y}{x + e^y}$

Ezekből a másodrendűek: $f''_{xx}(x, y) = -\frac{1}{(x + e^y)^2}$

$f''_{xy}(x, y) = -\frac{e^y}{(x + e^y)^2}$

$f''_{yx}(x, y) = -\frac{e^y}{(x + e^y)^2}$

$f''_{yy}(x, y) = \frac{e^y(x + e^y) + e^{2y}}{(x + e^y)^2}$

2. $f(x, y) = x^y$

Megoldás: Az elsőrendűeket már egyszer kiszámoltuk feljebb:

$f'_x(x, y) = yx^{y-1}$

$f'_y(x, y) = x^y \ln x$

Ezekből a másodrendűek: $f''_{xx}(x, y) = y(y-1)x^{y-2}$

$f''_{xy}(x, y) = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x$

$f''_{yx}(x, y) = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x$

$f''_{yy}(x, y) = x^y \ln^2 x$

Iránymenti deriváltak:

Az $f(x, y)$ függvény (x_0, y_0) pontbeli, $\underline{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ irány menti deriváltját a következő képlet adja meg:
 $f'_\alpha(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f'_y(x_0, y_0) \sin \alpha$

1. Határozza meg az $f(x, y) = (x - y)^2$ függvény $\alpha = \frac{P_i}{3}$ irányú iránymenti deriváltját a $P(2, 3)$ pontban!

Megoldás: $\cos \alpha = \frac{1}{2}, \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}, f'_x(x, y) = 2(x - y), f'_y(x, y) = -2(x - y)$, ebből $f'_{\frac{P_i}{3}}(2, 3) = \sqrt{3} - 1$.

2. Határozza meg, mely irány esetén nulla az $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy + e^y$ függvény $P(2, 0)$ pontbeli iránymenti deriváltja!

Megoldás: $f'_x(x, y) = 3x^2 - 3y, f'_y(x, y) = 3y^2 - 3x + e^y, f'_{\alpha}(x, y) = (3x^2 - 3y) \cos \alpha + (3y^2 - 3x + e^y) \sin \alpha$
 $f'_{\alpha}(2, 0) = 12 \cos \alpha - 5 \sin \alpha = 0$, ebből $\alpha = \arctan \frac{12}{5}$.

Érintősík egyenlete:

Az érintősík képlete $f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$, amit úgy kell érteni, hogy minden adott egy (x_0, y_0) pont, és az f'_x illetve f'_y parciális deriváltakat abban a pontban kell nézni (ld. a feladatokban).

1. Írja fel az $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 2xy + 4x - 2y + 5$ görbe $P(1, 2)$ pontbeli érintősíkjának egyenletét!

Megoldás: $f'_x(x, y) = 4x - 2y + 4, f'_x(1, 2) = 4$ és $f'_y(x, y) = 2y - 2x - 2, f'_y(1, 2) = 0$, valamint $f(1, 2) = 7$, ezekből tehát az érintősík egyenlete $4(x - 1) - (z - 7) = 0$.

2. Írja fel az $f(x, y) = (x^2 - 6x)(y^2 - 4y)$ görbe $P(1, 2)$ pontbeli érintősíkjának egyenletét!

Megoldás: $f'_x(x, y) = (2x - 6)(y^2 - 4y), f'_x(1, 2) = 16$ és $f'_y(x, y) = (x^2 - 6x)(2y - 4), f'_y(1, 2) = 0$, valamint $f(1, 2) = 20$, ezekből tehát az érintősík egyenlete $16(x - 1) - (z - 20) = 0$.